









IOH. CHRIST. FABRICH

HIST. NAT. OECON. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. HAFN.

NORW. LVND. PETROP. OECON. ET PARIS.

AGVLT. MEMBR.

MANTISSA.

INSECTORVM

DIV. INS.

SISTENS U.S. NATL. MUS.

SPECIES NVPER DETECTAS

A D I E C T I S

SYNONYMIS, OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS,
EMENDATIONIBVS.



T O M. II.

H A F N I A E,

IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROFT,

M D C C L X X X V I I .



1522



CLASSIS VI.

G L O S S A T A.

147. PAPILIO. *Palpi* duo reflexi.
Lingua spiralis exserta.
Antennae extrorsum crassiores.
- * *Equites Troes.*
1. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis macula cyanea *Patis*.
ocelloque purpureo subtus lunulis septem.
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 1, 2.
2. P. E. T. alis caudatis subconcoloribus nigris: posticis *Bianor*.
lunulis quinque rufis.
3. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis macula alba lunulae duplice purpurea.
Papilio Seuerus Cram. Ins. 24. tab. 277. fig. A. B. C.
tab. 278. fig. A. B.
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 4.
4. P. E. T. alis caudatis concoloribus fuscis: posticis lunulis nouem rubris albo punctatis.
Iablonsk. Pap. 2. tab. 14. fig. 3.
5. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: posticis macula quintuplici alba lunulisque rubris, corpore nigro.
Cram. Ins. 23. tab. 265. fig. A. B. C.
Iablonsk. Pap. 2. tab. 15. fig. 2.
6. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: antica fascia alba, posticis maculis rubris.
Iablonsk. Pap. 2. tab. 13. fig. 2.

Ascanius. 7. P. E. T. alis caudatis concoloribus atris: fascia communis alba; posticarum rubro nebulosa

Antenor. 8. P. E. T. alis caudatis concoloribus atris albo maculatis: posticis lunulis marginalibus rubris.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 13. fig. 1.

Troilus. 9. P. E. T. alis caudatis nigris: anticis punctis marginalibus pallidis, posticis supra pallido subtus fulvo maculatis.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 17. fig. 3. 4.

Habitat in America boreali.

Palinus. 10. P. E. T. alis caudatis nigris atomis viridi aureis: fascia communis coeruleo viridi.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Medius. Corpus atomis viridi aureis nitentibus. Antennae nigrae. Alae atrae atomis numerosissimis viridibus. Fascia lata communis, continua, viride coerulea. Subtus omnes nigrae atomis albis, anticae apice cinereae, postice maculis marginalibus subocellaribus fuluis.

Deiphobus. 11. P. E. T. alis caudatis nigris: subtus basi rubro maculatis, posticis maculis septem rubris subannularibus.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 18. fig. 2. 3.

Pelaus. 12. P. E. T. alis caudatis atris: anticis fascia, posticis lunulis marginalibus albis punctisque duobus rubris.

Asterias. 13. P. E. T. alis caudatis atris: fasciis duabus macularibus flavis, angulo ani fulvo; puncto atro.

Papilio Polyxenes Sp. Inf. 2. 4. 13.

Papilio Asterias Cram. Inf. 35. tab. 385. fig. C. D.

Clerk. Icon. tab. 33. fig. 5. 6.

Drury Inf. 1. tab. 11. fig. 2.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 18. fig. 1.

Phorbas. 14. P. E. T. alis caudatis nigris coeruleo maculatis: posticarum fascia interrupta subtus alba.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 12. fig. 3.

Philenor. 15. P. E. T. alis caudatis nigris: posticis virescenti nitidis subtus maculis septem rubris subocellaribus.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 79. fig. 2. 3.

16. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris margine maculatis: posticis maculis septem albis. *Pammon.*

Iablonsk. Pap. 2. tab. 19. fig. 4.

Inuenitur rarius ecaudatus.

17. P. E. T. alis caudatis nigris: fascia communis alba, posticis subtus basi apiceque rubro maculatis. *Afius.*

18. P. E. T. alis caudatis concoloribus nebulosis: anticis *Glaucus.* macula flava, posticis macula ani fulua.

Iabl. Pap. 2. tab. 17. fig. 1. 2..

19. P. E. T. alis caudatis subconcoloribus nigris basi rufis, *Achates.* posticis macula octuplici alba.

Iablonsk. Pap. 2. tab. 15. fig. 1.

B. Papilio Alpheror alis caudatis concoloribus fuscis basi atris: maculis antistarum rufa, posticarum albis Sp. Inf. 2. 4. II.

Papilio Alcenor Cram. Inf. 14. tab. 166. fig. A.

Iabl. Pap. 2. tab. 16. fig. 1.

B. Vix distinctus videtur.

20. P. E. T. alis caudatis atris: anticis striga alba, posticis macula media lunulisque rubris. *Lysander.*

21. P. E. T. alis caudatis concoloribus nigris: posticis macula alba suturis sexfida lunulisque septem rubris. *Polydorus.*

Iabl. Pap. 2. tab. 15. fig. 3.

22. P. E. T. alis denticulatis holosericeis: anticis supra viridibus; macula atra, posticis maculis sex nigris. *Priamus.*

Iabl. Pap. 1. tab. 1. fig. 1. 2.

23. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis maculis, posticis disco flavis. *Amphrius.*

Papilio Amphrius Cram. Inf. 19. tab. 219. fig. A.

Iabl. Pap. 1. tab. 1. fig. 3.

Habitat in India orientali.

Maculae, alae anticae radiatae. Punctum nigrum ad angulum ani. Affinis videtur *P. Asteno.*

24. P. E. T. alis dentatis subconcoloribus nigris: posticis *Remus.* vtrinque maculis flavis marginalibus.

Papilio Antenor Jaqu. Misc. Austr. 2. tab. 23. fig. 4.

Iabl. Pap. 1. tab. 2. fig. 1. 2.

tab. 3. fig. 1.

Conf. Papilio Panthous mas Clerk. Icon. tab. 18.
Papilio Remus Cram. Inf. 12. tab. 135. fig. A.
 vti et tab. 136. fig. A. vix
 differunt.

Memnon. 25. P. E. T. alis dentatis omnibus subtus basi rubro no-
 tatis.

Iabl. Pap. 1. tab. 6. fig. 2. 3.

Protenor. 26. P. E. T. alis dentatis nigris: posticis subtus macula dif-
 formi rubra anguii ani.

Iabl. Pap. 2. tab. 7. fig. 1. 2.

Agenor. 27. P. E. T. alis dentatis nigris basi sanguineis: posticis
 disco albo; maculis nigris.

Iabl. Pap. 1. tab. 8. fig. 3.

Anchises. 28. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: posticis ma-
 culis septem coccineo ouatis.

Cram. Inf. 27. tab. 318. fig. A. B. C. D.

Iabl. Pap. 2. tab. 9. fig. 1. 2. 3.

Leucasta 257. *Altha*. 29. P. E. T. alis dentatis nigris: posticis limbo coerule-
 scente; fascia nigra, subtus fulvo maculatis.

*Sarpe-
 don.* 30. P. E. T. alis dentatis fuscis fascia viridi, posticis subtus
 linea baseos maculisque quinque rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 11. fig. 4. 5.

Roeß. Inf. 4. tab. 6. fig. 1.

Polyda-
mas. 31. P. E. T. alis dentatis nigro aeneis: fascia maculari fla-
 ua, posticis subtus lunulis fluxuosis rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 10. fig. 6. 7.

Andro-
geus. 32. P. E. T. alis dentatis nigro aeneis: posticis subtus lu-
 nulis rubris cyaneis flauisque.

Papilio Androgeus Cram. Inf. 29. tab. 350. fig. A. B.

Iabl. Pap. 2. tab. 11. fig. 2. 3.

Peran-
thus. 33. P. E. T. alis dentato caudatis nigris supra basi viridibus
 subtus apice pallidis: posticis lunulis septem fuluis.

Habitat in Cochin China Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae nigrae. Corpus supra viride nitidum ore albo. Alae omnes supra basi virides, nitidae apice nigrae maculis obsoletis viridibus. Sinus marginales albidi. Subtus basi nigrae atomis numerosis flauis, apice pallidae et ante hanc apicem in anticis lunula magna pallida et in posticis lunulae se- pte

ptem fuluae, quarum exterior linea media alba, re-
liquae lunula opposita coerulea.

34. P. E. T. alis dentatis concoloribus fuscis: anticis albo *Amphi-*
radiatis, posticis macula quinquefida rubra lunulis. *medon.*
que albis.

Iabl. Pap. 1. tab. 4. fig. 1.

35. P. E. T. alis dentatis nigris: anticis supra macula vi-
ridi, posticis macula palmata sanguinea. *Aeneas.*

Iabl. Pap. 2. tab. 9. fig. 5. 6.

36. P. E. T. alis dentatis virecentibus: posticis margine *Belus.*
interiori pallido, subtus fuscis: lunulis rubris.

Iabl. Pap. 2. tab. 11. fig. 1.

37. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: posticis ma- *Pompe-*
culis sanguineis. *ius.*

Papilio Panthous Cram. Inf. 24. tab. 278. fig. C. D.

Habitat Surinam.

Medius statura P. Aeneae. Thorax et pectus sanguineo
maculata. Alae omnes concolores, nigrae, anti-
tiae immaculatae, posticae striga e maculis sex san-
guineis, Margo posticus inter dentes sanguineo ma-
culatus.

38. P. E. T. alis dentatis subconcoloribus nigris: posticis *Polymne-*
disco coerulescentibus nigro maculatis. *stor.*

Iabl. Pap. 2. tab. 7. fig. 3. 4.

39. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis albo *Panthous*
maculatis, posticis maculis albis nigro foetis.

Iabl. Pap. 1. tab. 5. fig. 1. 2.

40. P. E. T. alis subdentatis concoloribus nigricantibus al- *Panda-*
bo maculatis, posticis flavis: ocellis septem nigris. *rusr.*

41. P. E. T. alis dentatis concoloribus nigris: anticis ma- *Attenous.*
cula radiata alba, posticis disco flavo.

Iabl. Pap. 1. tab. 2. fig. 3.

42. P. E. T. alis dentatis concoloribus atris: posticis disco *Helena.*
communi aurato.

Iabl. Pap. 1. tab. 3. fig. 2.

Habitat et in India orientali Mus. Dom. Banks.

In specimine Indiae Orientalis maculae aliquot atrae in
disco aureo.

** Equites Archiui.

- Rhipheus*, 43. P. E. A. alis sexdentato caudatis nigris viridi fasciatis; posticis subtus macula ani ferruginei nigro punctata.
Papilio Rhipheus Cram. Inf. 33. tab. 385. fig. A. B.
Papilio Rhipheus Drury Inf. 2. tab. 23. fig. 1. 2. at eaudatus.
 Habitat in Coromandel.
- Magnus*. Alae nigrae lineolis transuersis fascia media antice bifida, postice terminata macula magna ferruginea nigro maculata, postice maculis viridibus. Posticae sexdentato caudatae. Subtus virides, nigro maculatae, macula magna anguli ani ferruginea, nigro punctata.
- Ianus*. 44. P. E. A. alis bicaudatis fuscis postice lutescentibus subtus fascia characteribusque albis.
 Cram. Inf. 28. tab. 329. fig. A. B.
- Pyrrhus*. 45. P. E. A. alis bicaudatis fuscis; fascia communis alba auricularum dimidiata.
- Camillus*. 46. P. E. A. alis bicaudatis albis; fasciis fuluis nigro marginatis, posticis macula caudali atra.
- Tiridates* 47. P. E. A. alis dentato bicaudatis supra nigris coeruleo maculatis margineque albo punctato.
 Drury Inf. 3. tab. 23. fig. 1. 2.
- Castor*. 48. P. E. A. alis dentato bicaudatis fuluis margine nigris; subtus fascia maculisque albis nigra foetis.
Papilio Camillus Drury Inf. 3. tab. 30. fig. 1. 2.
 Conf. *Papilio Eudoxus* Drury Inf. 3. tab. 33. fig. 1. 2.
 Vix differre videtur.
- Pollux*. 49. P. E. A. alis dentato bicaudatis fuscis; fascia flava, subtus fascia maculisque albis nigra foetis.
- Aeclius*. 50. P. E. A. alis dentato bicaudatis supra nigris; subtus cinereis nigro vndatis; macula ocellari fulua.
Papilio Aeclius Cram. Inf. 27. tab. 317. fig. A. B.
 Habitat in Amboina.
 Alae supra nigrae anticis punctis aliquot albis, posticis immaculatis.
- Etheocles*. 51. P. E. A. alis bicaudatis coeruleo fuscis; vtrinque fascia alba, posticis margine viridi,

52. P. E. A. alis dentato bicaudatis fuscis flavo fasciatis: *Fabius.*
subtus basi nigro vndatis apice punctis fuluis.

53. P. E. A. alis subbicaudatis albo flauescenque strigosis: *Cacles.*
fascia media alba, posticis subtus striga punctorum
ocellatorum.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Medius, tenerrimus. Antennae nigrae albo annula-
tae. Corpus cinereum. Alae omnes albo flauescen-
ti fuscoque strigosae. In medio fascia lata, commu-
nis alba et versus marginem posticum striga atra
subtus omnes albidae strigis flauescensibus strigaque
marginali atra. Punctum unicum ocellare atrum ver-
sus marginem interiore alae anticae, et in posticis
et striga e punctis sex albis iride flauescente pupilla-
que atra, in quinque exterioribus oblonga, in inte-
riori orbiculata. Caudae duae exteriore acuta, in-
terior breuissima rotundata, supra lunulis coer-
leis, subtus macula atra.

54. P. E. A. alis caudatis concoloribus nigris: fascia stri- *Leilus.*
gisque viridibus nitentibus numerosis.

55. P. E. A. alis caudatis nigris viridi fasciatis: subtus ar- *Lauinia.*
gentatis: strigis fuluis.

56. P. E. A. alis caudatis albis: limbo nigro, posticis subtus *Brutus.*
fascia fusa.

Cram. Inf. 32. tab. 378. fig. D.E.

57. P. E. A. alis caudatis albis: limbo communis nigro, po- *Dolicus.*
sticis utrinque punctis marginalibus albis.

58. P. E. A. alis caudatis nigris: disco coeruleo radiante, *Vlysses.*
posticis subtus ocellis septem.

59. P. E. A. alis caudatis concoloribus fuscis: fascia linearis *Noctua.*
obliqua alba apicibusque albis. *Patroclus.*

60. P. E. A. alis caudatis nigris supra introrsum viridi- *Diomedes.*
bus: posticis lunulis cyaneis.

61. B. E. A. alis caudatis supra fuscis fulvo nigroque macu- *Varares.*
latis basi albis.

Cram. Inf. 33. tab. 388. fig. A.B.

62. P. E. A. alis caudatis subconcoloribus albis: fasciis fu- *Proteus.*
scis, unica subtus sanguinca, angulo ani rubro. *Ianus.*

- Antilo- 63. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis; fasciis
chus. marginaque nigris, caudis albis longitudine alae.
- Podali- 64. P. E. A. alis caudatis subconcoloribus flavescentibus;
rini. fasciis fuscis geminatis, posticis subtus linea san-
guinea,
- Alcibia- 65. P. E. A. alis caudatis albis: anticis margine nigro fa-
des. sciato, postice subtus apice ferrugineis nigro pun-
ctatis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
- Minor et similis P. Podalirio. Antennae nigrae. Ca-
put fuluum linea media lata atra. Thorax cinereo
tomentosus, maculis duabus anticis fuluis. Abdomen
albidum linea maculari laterali atra. Alae anticae
albae basi parum virescentes margine exteriori nigro
fasciato. Posticae albae macula anuli lunulique mar-
ginalibus atris. Cauda elongata, atra apice alba.
Subtus anticae subconcolores. Posticae basi virescen-
tes, nigro striatae, apice fuluae nigro punctatæ.
- Pampi- 66. P. E. A. alis caudatis albis: limbo nigro albo fasciato,
lius. posticis subtus maculis ferrugineis nigro notatis.
- Papilio Polycenes* Cram. Ins. 4. tab. 57. fig. A, B.
- Habitat in India Mus. Dr. Hunter.
- Statura et magnitudo omnino P. Sinon. Corpus supra
albidum linea dorsali nigra. Alae anticae albae mar-
gine exteriori, et postico nigro fasciis septem albis,
subtus concolores. Posticae supra albae marginé ni-
gro sinibus albis. Lunula analis rufescens. Cau-
da elongata nigra margine albo. Subtus basi vire-
scentes nigro fasciatae apice albidae maculis rufescen-
tibus nigro notatis lunulisque nigris.
- Sinon: 67. P. E. A. alis caudatis nigris viridi fasciatis maculatis-
que: posticis subtus linea sanguinea.
- Papilio Sinon* Cram. Ins. 27. Tab. 317. fig. C, D, E, F.
- Chiron: 68. P. E. A. alis caudatis nigris fusco fasciatis: subtus anti-
ce albis; strigis ferrugineis,
- Crithon: 69. P. E. A. alis caudatis supra fuscis subtus glaucis: fascia
vtrinque alba,
- Orfilo- 70. P. E. A. alis caudatis: anticis fasciis duabus posticis
chus. una albis; fascia fulua,

71. P. E. A. alis caudatis concoloribus atris: anticis fasciis *Curius*, duabus hyalinis, posticis vnicis alba.
 Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.
 Corpus paruum supra fuscum subtus albidum abdominis lateribus nigro punctatis. Alae anticae concolores, nigrae fasciis duabus hyalinis posteriori latiori venis nigris. Posticae atrae fascia abbreviata alba. Cauda longissima nigra margine exteriori apice que albis.
72. P. E. A. alis caudatis hyalinis: margine strigaque rubris. *Octauius*.
Papilio Faunus Sp. Inf. 2. 16. 63.
 Angulus ani ruber.
73. P. E. A. alis caudatis atris: fasciis duabus albis, angulo *Licarjis*. ani rubro bimaculato.
74. P. E. A. alis caudatis concoloribus albis flavo fasciatis *Perian-*
apice fuscis albo strigosis. *der.*
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
 Parvus. Corpus album antennis nigris. Alae anticae subangulatae albae fasciis quinque flavis, quarum prima baseos, tertia abbreviata, quarta extus duplicita, quinta macularis, apice fuscae strigis duabus albis. Posticae albae fasciis flavis, quarum posterior multo latior. Margo posticus fuscus strigis tribus flexuosis albis et ante marginem maculae aliquot albae lunula nigra.
75. P. E. A. alis caudatis fuscis: anticis striga, posticis *Meliboeus* duabus sanguineis, subtus cyaneo nitidissimis.
76. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis: margine fa- *Turnus*. sciisque abbreviatis nigris, angulo ani fuluo.
77. P. E. A. alis caudatis concoloribus flavis: limbo fuscō; *Machaon*. lunulis flavis, angulo ani fuluo.
Tentacula duo brevia lutea capitis Laruae odorem spar-
gunt tetrum, quo Ichneumones fugant.
78. P. E. A. alis caudatis flavis: limbo nigro, posticis lu- *Thersites*. nulis flavis.
79. P. E. A. alis caudatis supra atris subtus fuscis: anticis *Codrus*. vtrinque fascia maculari alba.
80. P. E. A. alis caudatis nigris: fasciis duabus maculari- *Chalcus*. bus flavis, posticis subtus vitta flava lunulisque rufis.

- Decius.* 81. P. E. A. alis caudatis fascia communi alba, posticis apice rufis, ocellis punctisque duobus albis.
- Sabinus.* 82. P. E. A. alis caudatis fuscis: fascia fulua, subtus griseis: fascia alba punctisque ocellaribus. Sp. Inf. App. 505.
- Doreus.* 83. P. E. A. alis caudatis: fascia supra viridi subtus alba.
- Palamedes.* 84. P. E. A. alis caudatis nigris: lunulis marginalibus flauis, anticis fascia flava, posticis maculari rufa.
- Menechus.* 85. P. E. A. alis caudatis nigris subtus albido striato maculatis, posticis lunulis rufis coerulescentibusque.
- Xanthus.* 86. P. E. A. alis caudatis nigris albo striato maculatis, posticis subtus ocellis coeruleis fuluisque subfasciatis. Faemina maculis obscurioribus.
- Thoas.* 87. p. E. A. alis caudatis nigris flavo fasciatis, posticis subtus flauis: fascia nigra; lunulis cyaneis.
- Cresphonites.* 88. P. E. A. alis caudatis atris fascia viridi, posticis subtus fascia coerulea.
- Polycaon.* 89. P. E. A. alis dentato caudatis nigris: fascia flava, posticis subtus lunulis fuluis coeruleis flauisque.
- Ajax.* 90. P. E. A. alis obtuse caudatis concoloribus fuscis: fasciis flauescensibus, angulo ani fuluo.
Papilio Marcellus Cram. Pap. tab. 98. fig. G. H.
Esp. Papil. I. tab. 51. fig. 1.
- Orontes.* 91. P. E. A. alis caudatis nigris: fasciis duabus virescentibus, caudis albis distantibus.
- Agamemnon.* 92. P. E. A. alis caudatis nigris viridi maculatis, posticis subtus lunulis tribus rufis.
- Aegisthus.* 93. P. E. A. alis caudatis fusco luteoque vndulatis, ocellis caudalibus subternis.
- Empedocles.* 94. P. E. A. alis caudatis fuscis: anticis fascia abbreviata maculari viridi, posticis subtus maculis duabus anguli ani.
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
Magnus. Antennae nigrae. Caput et thorax fusa. Corpus lana alba tectum. Alae anticae vtrinque fuscae fascia in medio abbreviata e maculis sex viridibus, quarum quarta et sexta minutissimae. Posticae caudatae supra fuscae basi pallidiores. Apex caudae albi.

bicat. Subtus fuscae angulo ani maculis duabus atris lunula rufa.

95. P. E. A. alis caudatis nigris: posticis ante marginem *Euryalus*. coeruleis; maculis nigris: pupilla alba.

96. P. E. A. alis caudatis nigris: anticis fascia fulua, posticis alba submarginali. *Nifus*.

97. P. E. A. alis subcaudatis fuscis: subtus fasciis albis biocellatis caudaeque ocellis geminis. *Phidippus*.

Faemina mare multo maior.

98. P. E. A. alis dentato caudatis nigris: anticis albo maculatis, posticis fascia flava. *Xiphares*

Papilio Xiphares Cram. Pap. 32. tab. 377. fig. A. B.

Habitat in Africa,

Statura P. Pyrrhi. Alae dentatae dente postico elongato, caudato. Corpus nigrum. Alae anticae nigrae maculis aliquot albis. Posticae nigrae fascia lata, dentata lunulisque marginalibus flavis. Subtus cinerascentes fascia alba striga vndata flava.

99. P. E. A. alis subcaudatis fuscis apice atris albo maculatis, posticis subtus ocellis duobus. *Aurelius*.

100. P. E. A. alis dentatis nigris flavo maculatis: posticis *Demeleus*. ocello coeruleo rufoque.

Cram. Inf. 20. tab. 231. fig. A. B.

Papilio Erithonius Cram. Inf. 20. tab. 232. fig. A. B. vix differre videtur.

101. P. E. A. alis dentatis supra nigris fascia coerulea, subtus *Achilles*. fuscis ocellis tribus quiniseue.

102. P. E. A. alis supra nigris: anticis fascia lutea apice que albis, posticis disco coerulecentibus. *Medon*.

103. P. E. A. alis nigris: posticis fascia coerulea, subtus *Erithonius*. viridibus: striga punctorum alborum.

Habitat in Africa Mus. Dr. Hunter.

Statura omnino P. Medon. Alae omnes supra fuscae anticis apice albis posticis fascia coerulea versus angulum ani dilatata. Subtus omnes virescentes punctis baseos nigris strigaeque media alba e punctis anticarum tribus, posticarum sex.

104. P. E. A. alis dentatis nigris: anticis fascia alba, posticis disco coerulecente; puncto atro. *Ceres*.

Papi.

Papilio Ceres Sp. Inf. 2. 90. 396.

Papilio Lucilla Cram. Inf. 13. tab. 156. fig. A. C.

Cato. 105. P. E. A. alis dentatis nigris: disco communi virescente, subtus nigro punctatis, posticis macula baseos rufa.

Papilio Cyparissa Sp. Inf. 2. 33. 137.

Philofte- 106. P. E. A. alis dentatis fuscis: posticis ocellis duobus, pupilla nigra punctisque tribus albis.

Faemina alis anticis subtus fasciculo pilorum elongatorum diuergentium.

Lucretius. 107. P. E. A. alis dentatis atris fuluo fasciatis, subtus maculis atris linea coerulea cinctis.

Stelenes. 108. P. E. A. alis dentatis fuscis: fasciis duabus viridibus, altera posticarum integra.

Nireus. 109. P. E. A. alis dentatis nigris: fascia inaurata viridi, subtus nigris antibus.

Cram. Inf. 32. tab. 378. fig. F. G.

Amphi- 110. P. E. A. alis dentatis atris: fascia coerulea nitida subtus machus antice albis postice cinereis.

Odius. 111. P. E. A. alis falcatis subdentatis fuscis: anticis disco Orion. 154. 170. flauo.

Amphi- 112. P. E. A. alis dentatis nigris: fascia inaequali flava, posticis subtus striga e punctis flavis lunulisque cyaneis.

Gambri- 113. P. E. A. alis dentatis supra nigris viridi maculatis stria- sius. tisque: anticis fascia maculari niuea.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae extorris crassiores, atrae. Caput atrum, albo punctatum. Thorax ater fasciis tribus cinereis. Abdomen atrum segmentorum marginibus albidis. Alae anticae fuscae basi viridi striatae, in medio maculae tres albohyalinae, pone has fascia magna, macularis albohyalina. Posticae fuscae viridi maculatae striataeque. Subtus anticae basi cinerascentes maculis fasciisque hyalino albis apice fuscis, posticae virescentes basi lineola medioque striga atris, apice fasciae indistinctae e maculis albis.

Demo- 114. P. E. A. alis dentatis supra nigris, fascia viridi, sub- phon. tus griseis albo strigosis.

Habitat Cajennae.

115. P. E. A. alis dentatis supra fuscis albo maculatis disco- *Nestor.*
que coeruleo: subtus ocellis tribus quatuorue.
116. P. E. A. alis dentatis pallido coeruleis apice atris fer- *Perseus.*
ragineo maculatis, subtus vndatis: ocellis tribus quatuorue.
117. P. E. A. alis dentatis fuscis: area communi coerulea *Telemachus.*
radiata, singulis subtus ocellis.
Papilio Telemachus Cram. Inf. 32. tab. 373. fig. A. B. C.
118. P. E. A. alis dentatis coeruleis nitidissimis subtus ne- *Menelaus.*
bulosis: punctis fuscis.
119. P. E. A. alis subrepandis liuidiusculis subtus nebulo- *Teucer.*
sis: posticis ocellis tribus: postremo maximo.
120. P. E. A. alis angulato repandis fuscis subtus liuidiuscu- *Automedon.*
culis, ocello anguli ani.
Cram. Inf. 33. tab. 389. fig. A. B.
121. P. E. A. alis dentatis: anticis rubris, posticis nigris, *Hecuba.*
subtus vtrinque ocellatis.
Cram. Inf. 19. tab. 217. fig. A. B.
122. P. E. A. alis dentatis fuluis postice atris: subtus anti- *Metellus.*
cis ocellis tribus, posticis quinque. Sp. Inf. App. 505.
123. P. E. A. alis subcrenatis fascis basi cyaneis subtus ne- *Idome-*
bulosis: posticis ocello magno flauescente. *neus.*
Cram. Inf. tab. 390. fig. A. B.
124. P. E. A. alis dentatis concoloribus nigris: fascia inter- *Eurypy-*
rupta maculisque viridibus, posticis subtus rubro *lus.*
maculatis.

*** *Heliconii.*

125. P. H. alis oblongis integerrimis luteis: anticis striis *Calliope.*
tribus, posticis fasciis tribus nigris.
Gram. Inf. 21. tab. 246. fig. C.
126. P. H. alis oblongis integerrimis flavis: anticis supra *Melite.*
nigris; lineis duabus fasciisque flavis.
127. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus luteis *Mopsa.*
nigrisque: margine albo punctato.
128. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis nigro macula- *Mneme.*
tis: anticis apice atris flavo maculatis.

Lybia.

129. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis atris; fasciis duabus fuluis, posticis fuluis: fascia marginali atra.

Vesta.

130. P. H. alis oblongis integerrimis flavescentibus: margine nigro albo punctato.

Habitat in China Dr. Pfug.

Affinis *P. Violae* at distinctus et alius. Corpus nigrum abdome cinereo collarique paruo fuluo. Alae anticae flavescentes maculis aliquot fuscis margineque postico fuso albo punctato. Posticae itidem flavescentes immaculatae margine solo nigro punctis triangularibus albis. Subtus fere concolores.

Violae.

131. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis nigro punctatis: posticis margine nigro punctis albis.

Papilio Cepheus Cram. Pap. 20. tab. 298. fig. D. E.

Conf. *Papilio Hypetia* Drury Ins. 3. tab. 13. fig. 1. 2.

Terpsichore.

132. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis: posticis nigro punctatis.

Serena.

133. P. H. alis oblongis integerrimis fuluis: posticis subtus basi nigro punctatis.

Papilio Eponina Cram. Pap. 33. tab. 268. fig. A. B.

Polymnia

134. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis fascia flava, posticis fasculis tribus nigris.

Hippodamia.

135. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis nigris; fasciis tribus hyalinis, posticis hyalinis.

Vrania.

136. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis disco albis, posticis ocellis vtrinque binis.

Doris.

137. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis flavo maculatis, posticis supra basi coeruleis.

Papilio Doris Cram. Pap. 29. tab. 337. fig. 6.

Hecale.

138. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis fascia, posticis subtus punctis marginalibus albis.

Ricini.

139. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis vtrinque fasciis duabus flaviis, posticis basi radiatis.

Papilio Ricini Cram. Pap. 32. tab. 378. fig. A. B.

Brassolis.

140. P. H. alis oblongis integris fuscis: anticis flavo maculatis, posticis subtus sanguineo radiatis.

Thales.

141. P. H. alis oblongis subintegratis subconcoloribus atris basi rubro radiatis, anticis flavo maculatis,

142. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fasciis *Myrti.*
duabus flauis, posticis disco rufo.
143. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia *Cepha.*
abbreviata albida, posticis basi fuluis: subtus radiatis.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Parvus. Corpus fuscum. Alae anticae supra atrae fascia media lata albida, quae tamen margines haud attingit. Ad marginem tenuorem macula communis fulua. Posticae basi fuluae apice atrae. Subtus omnes fuscae, anticae fascia albida inaculaque baseos fulua, posticae basi fuluo radiatae apice maculis aliquot obsoletis albis.
144. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis fasciis *Psidii.*
tribus, posticis duabus hyalinis.
- Cram. Inf. 22. tab. 257. fig. F.
145. P. H. alis oblongis integerrimis atris hyalino striato *Aspasia.*
maculatis, posticis basi flauis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
- Medius. Caput et thorax atra albo punctata. Corpus fuscum. Alae anticae atrae basi hyalino striatae apice maculatae. Posticae basi fluae nervis nigris, apice nigrae hyalino punctatae.
146. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis maculis, posticis disco hyalinis. *Aegle.*
147. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus atris: anticis fasciis flauis tribus, posticis duabus. *Charitonia.*
148. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia rubra, posticis basi subtus punctis sanguineis. *Melpomene.*
149. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis fascia rubra, posticis flava. *Phyllis.*
150. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis albo maculatis, posticis fascia alba. *Clio.*
- Cram. Pap. 22. tab. 257. fig. D. E.
151. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: anticis flavo maculatis, posticis striatis. *Thalia.*
- Cram. Pap. 21. tab. 246. fig. A.
152. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuluis: anticis malula flava, posticis strigis duabus nigris Sp. Inf. App. 505. *Rosalia.*

- Euryta. 153. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuscis: fascia alba, posticis striatis basi nigro punctatis.
Cram. Pap. 20. tab. 233. fig. A.B.C.
- Aeeda. 154. P. H. alis oblongis integerrimis albo maculatis: anticus virescentibus, posticis fascia flava.
- Thallò. 155. P. H. alis oblongis integerrimis nigris anticis fasciis duabus, posticis vnicis flavis.
- Antiocha. 156. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis fasciis duabus albis.
- Camoena. 157. P. H. alis subintegris fuscis nigro punctatis: posticis fascia rubra.
- Gea. 158. P. H. alis oblongis integerrimis nigris: anticis maculis duabus, posticis disco fulvo nigro striato, subtus basi nigro striatis.
- Lycia. 159. P. H. alis integerrinis concoloribus fuscis albo maculatis: posticis disco albo; punctis nigris.
- Pyrrha. 160. P. H. alis oblongis integerrimis concoloribus fuscis flavo maculatis: posticis disco ferrugineo nigro striato.
- Pasiphæ. 161. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis albo variis: maculis margineque atris.
- Murcia. 162. P. H. alis oblongis integerrimis: anticis fuscis immaculatis, posticis flavescentibus nigro punctatis.
- Caecilia. 163. P. H. alis oblongis medio albis nigro punctatis: posticis margine nigro subtus albo punctato.
- Bonasia. 164. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: fascia communis fulva, posticis basi nigro punctatis.
- Euterpe. 165. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo punctatis: fascia fulva.
- Susanna. 166. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo punctatis: macula baseos fasciaque postica fuluis.
Habitat in Africa. Mus. Dr. Hunter.
Corpus nigrum punctis albis abdominisque lateribus fuluis. Alae anticae nigrae macula magna baseos fasciaque postica marginis haud attingente fuluis. Inter fasciam puncta tria aut quatuor alba. Margo albo punctatus. Subtus concolores at striga punctorum alborum ante marginem. Posticae nigrae macula baseos ad marginem exteriorem lobata fascia que

que postica abbreviata sinuata fuluis. Puncta pauca in disco et plura ad marginem tenuiorem. Margo posticus albo punctatus. Subtus concolores at puncta plura alba sparsa.

167. P. H. alis oblongis atris: anticis rubro fasciatis, posticis striatis. *Eritrea.*
168. P. H. alis oblongis integerrimis atris: anticis flavo maculatis basi rubris, posticis rubro striatis. *Erato.*

**** *Parnassii.*

169. P. P. alis rotundatis integerrimis albis nigro maculatis: posticis supra ocellis quatuor subtus sex. *Apollo.*

Puppa subfolliculata ouata.

170. P. P. alis rotundatis integerrimis albo nigro neruosis: anticis maculis duabus nigris marginalibus. *Mnemosyne.*

171. P. P. alis rotundatis integerrimis albis: venis nigris. *Crataegi.*

Pluuiam sanguineam saepe caussat.

172. P. P. alis rotundatis integerrimis concoloribus nigro punctatis: anticis denudatis, posticis flavescentibus. *Andromacha.*

173. P. P. alis rotundatis integerrimis rubris: anticis apice hyalinis, posticis subtus albidis nigro punctatis. *Horta.*

Cram. Pap. 25. tab. 298. fig. F. G.

174. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalinis: posticis disco fuluo nigro punctato. *Quirina.*

175. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalino diaphanis: posticis ocellis binis marginalibus. *Piera.*

Cram. Pap. 25. tab. 291. fig. C. D.

Habitat in Americae Anacardio.

Larua alba pilosa: pilis longis deflexis.

Puppa brunnea.

176. P. P. alis rotundatis nigris albo subradiatis: puncto centrali albo, posticis subtus luteis basi cruentatis. *Pasithoe.*

Papilio Porfenn. Cram. Inf. 30. tab. 342. fig. A. B.

177. P. P. alis angulato caudatis fusco hyalinis: posticis apice nigris coeruleo variis subtus ocellis duobus. *Anacardii.*

Habitat in America meridionali.

178. P. P. alis dentatis anticis hyalinis: maculis duabus nigris, posticis nigris: macula alba. *Cressida.*

Fabr. Insect. T. II.

B

179. P.

Rhea.

179. P. P. alis rotundatis integerrimis fusco hyalinis: posticis puncto quinque ocellaribus albis.
Habitat Cajennae. *Rhea var. p. s. 334.*

Andromeda.

180. P. P. alis rotundatis integerrimis hyalino albis: posticis ocello vtrinque unico.

Diaphanus.

181. P. P. alis rotundatis integerrimis albohyalinis: marginibus fuscis.

Idea.

182. P. P. alis rotundatis integerrimis denudato albis: venis maculisque nigris.

Cram. Pap. 31. tab. 362. fig. D.

**** *Danai Candidi.*

Brassicae.

183. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis maculis duabus apicibusque nigris maior. Oua aggregata, erecta, obtusa.

Rapae.

184. P. D. C. alis integerrimis; anticis maculis duabus apicibusque nigris minor.

Napi.

185. P. D. C. alis integerrimis albis: subtus venis dilatatis virescentibus.

Sinapis.

186. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: apicibus fuscescensibus.

Raphani.

187. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice nigris albo maculatis: posticis subtus nigro venosis flauo puluerulentis.

Papilio Raphani Esp. Pap. tab. 84. fig. 3.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura et magnitudo omnino P. Sinapis. Antennae nigrae, albo annulatae. Caput et thorax fusca. Abdomen album dorso fusco. Alae anticae conclores, albae macula pone medium margineque nigris. Margo maculis tribus albis. Alae posticae supra albae punctis marginalibus fere obsoletis fuscis. Subtus nigro venosae puluere flauicante adspersae.

Poppea.

188. P. D. C. alis rotundatis integerrimis concoloribus albis: margine nigro maculato, anticis macula baseos ferruginea.

Sylvia.

189. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis apice fuscis subtus macula baseos fulua.

190. P. D. C. alis integerrimis rotundatis fuluis; subtus Argante. ferrugineo irroratis.
191. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis margine Monuste. fuscis.
192. P. D. C. alis subintegratis rotundatis albis: anticis puncto apiceque nigris. Argia.
Margo interior alae anticae basi pilis plurimis elongatis, fasciculatis, erectis albis. An varietas sexus.
193. P. D. C. alis rotundatis albis apice nigris: posticis Ama-thonte. subtus margine brunneo.
194. P. D. C. alis rotundatis integerrimis griseis: anticis Philetä. supra albis apice fuscis.
195. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis costa baseos apiceque fuscis. Libythea.
196. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: anticis puncto apiceque nigris, posticis subtus flauescentibus: margine nigro punctato. Calypso.
197. P. D. C. alis rotundatis integratis albis margine fuscis, Daplidice subtus griseo virescentibus albo maculatis.
Habitat in Europae, Africæ Brassica, Reseda.
Larua pilosa, coerulea, nigro punctata flaueque striata.
198. P. D. C. alis integratis rotundatis albis: margine nigro; Creona. striga punctorum.
199. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: margine Nerissa. nigro, subtus nigro venosis.
200. P. D. C. alis rotundatis albis: fasciis duabus marginique fuscis, posticis subtus subincarnatis. Demonphile.
201. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flavis extimo nigro, subtus fusco punctatis. Hecabe.
202. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flavis: anticis Agave. apice supra nigris subtus brunneis.

Papilio Agave Cram. Pap. 2. tab. 20. fig. H. I.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Alae supra flauissimæ anticis apice nigris posticis immaculatis, subtus itidem fluae macula brunnea apicis alae anticae et minor alae posticæ.

- Cardami. 203. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: posticis nes. subtus viridi marmoratis.
- Xiphia. 204. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis macula apiceque nigris, posticis subtus viridi irroratis.
- Nisia. 205. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: anticis apice fuluis margine nigro, posticis immaculatis.
- Eucharis. 206. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis: posticis subtus fuscis; puncto albo lunulisque sex flavis.
- Chloris. 207. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice nigris: posticis subtus fuluis: margine late nigro.
Papilio Chloris Drury. Ins. 3. tab. 32. fig. 3. 4.
- Rhodope. 208. P. D. C. alis rotundatis integerrimis subconcoloribus externe nigris: anticis flavis, posticis albis.
- Elathea. 209. P. D. C. alis rotundatis integerrimis extimo nigris anticis flavis posticis albis subtus cinereis.
- Licea. 210. P. D. C. alis rotundatis integerrimis concoloribus extimo nigris: anticis albis posticis flavis. *Quelle*.
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks. *F. S. S. 63*
Statura omnino praecedentium. Corpus nigro villosum. Alae anticae albae apice nigrae, posticae fluae margine tenuissime nigro et ante marginem parum fuluae. Subtus concolores at margo posticis alae posticae latus niger.
- Alcmeone. 211. P. D. C. alis rotundatis concoloribus basi flavis apice albis.
- Phryne. 212. P. D. C. alis integerrimis albis: margine nigro posticis subtus flavis.
Alium e Cap. B. spei vidimus in Mus. Dom. Banks. simillimum at subtus haud nigro venosum.
- Pyranthe. 213. P. D. C. alis rotundatis albis puncto apiceque nigris, subtus cinereo vndatis: puncto fuluo.
- Leucippe. 214. P. D. C. alis integerrimis: anticis rubris, margine nigro, posticis flavis.
Alae omnes subtus nebulosae.
- Callirhoe. 215. P. D. C. alis integris albis: anticis apice, posticis margine punctisque sex nigris.
alter Sorcus P. Glaucope *F. S. S. 618*.

216. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: anticis apice nigris, posticis subtus cinereis fusco vndatis. *Glaucippe*
Variat rarius punctis marginalibus alae posticae nigris.
217. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauescentibus: anticis apice nigris, posticis subtus albis. *Eupipe*.
218. P. D. C. alis integerrimis nigro venosis supra albis *Coronnis*.
subtus virescentibus.
219. P. D. C. alis integerrimis albis nigro venosis: posticis *Hyparete*
subtus flauis; margine rubro maculato.
220. P. D. C. alis integerrimis albis apice atris: posticis *Iphigenia*
subtus flauescentibus: fascia media atra: striga ab-
breuiata fulua.
221. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: posticis *Teutonia*.
subtus nigro venosis flauo maculatis.
222. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis: posticis *Mysis*.
subtus margine atro: fascia sanguinea.
223. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis apice nigris, *Nigrina*.
subtus nigris: posticis striga flexuosa sanguinea.
224. P. D. C. alis rotundatis integerrimis nigris: fascia *Saba*.
communi alba.
225. P. D. C. alis integerrimis albis: posticis subtus atris;
striga flaua rubraque fasciaque alba. *Pyrrha*.
226. P. D. C. alis integerrimis albis margine nigris: subtus atris basi fuluo radiatis.
Crani. Inf. 31. tab. 361. fig. G. H.
227. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albidis apice ni- *Melania*.
gris; posticis subtus obscure glaucis.
228. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: anticis *Scylla*.
supra albis; limbo nigro, subtus omnibus nebulosis.
229. P. D. C. alis rotundatis integerrimis fuluis: anticis *Cornelia*.
supra albis; margine nigro. var. *Scylla*. S. S. 630.
- Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
- Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae. Corpus cinereum. Alae anticae supra albae margine exteriori nigro. Posticae laete fuluae punctis marginalibus fuscis. Subtus omnes fuluae puncto medio ocellari atomisque aliquot fuscis.

- Judith.* 230. P. D. C. alis integerrimis subconcoloribus: anticis albis venis margineque nigris, posticis fuluis margine nigro.
Habitat in Pulicandor Mus. Dom. Banks.
Statura et magnitudo praecedentium. *Corpus* hirtum, cinereum antennis nigris albo annulatis. *Alae omnes subconcoires*, anticae albae venis margineque nigris, posticae fuluae margine nigro et in hoc margine nigro maculae aliquot fuluae.
- Amata.* 231. P. D. C. alis rotundatis fuluis: limbo nigro, subtus virescentibus.
- Cypræta.* 232. P. D. C. alis integerrimis fuluis: margine nigro fuluo maculato: subtus virescentibus, puncto strigaque moniliformi fuluis.
Habitat in India.
Statura et summa affinitas P. Amata. *Differt* tamen alis subtus puncto strigaque moniliformi fuluis.
- Danae.* 233. P. D. C. alis rotundatis albis: anticis apice croceis margine fasciaque nigris, subtus striga moniliformia abbreviata.
- Sesia.* 234. P. D. C. alis rotundatis flauis apice (medio fuluo) nigris: posticis subtus maculis septem ocellaribus albis.
Papilio Mariannae Cram. Ins. 19. tab. 217. fig. D. E.
- Rahel.* 235. P. D. C. alis rotundatis integerrimis flauis supra margine nigris subtus immaculatis.
Habitat in India Dom. Boeber.
Minuta in hac familia. *Caput et thorax* fusca. *Abdomen* albidum dorso fusco. *Alae flauissimæ* anticis margine exteriori et postico late nigris, posticis margine tantum postico. *Subtus* omnes immaculatae.
- Messalina.* 236. P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis apice nigris, subtus flauis: macula marginali brunnea.
Habitat in India Dom. Boeber.
Statura parua praecedentis. *Alae* anticae albae apice nigræ, posticae albae macula tantum marginali nigra. *Subtus* flauæ, anticis macula apicis, posticis atomis maculaque marginali brunneis.
- Aenippe.* 237. P. D. C. alis rotundatis flauis; omnibus subtus punctis ocellaribus: anticis sex posticis septem.

238. P. D. C. alis rotundatis integerrimis albis apice (me-*Rhexia*.
dio fuluis) nigris, singulis subtus puncto medio atro.

239. P. D. C. alis integerrimis flauis: anticis supra margini-*Trite*.
nem nigris: singulis subtus striga ferruginea.

240. P. D. C. alis integerrimis fuluis: puncto margine-*Eausa*.
que nigris subtus virescentibus: anticis puncto ni-
gro, posticis argenteo.

Papilio Hyale Esp. Pap. I. tab. 4. fig. 4.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Nimis affinis P. Hyale at alae supra fuluae puncto anti-
carum medio apicibusque atris. Antennae fuluae.

Mas margine nigro immaculato. *Faemina* flauo
maculato.

241. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: anticis *Eupheno*.
apice (medio fuluis) nigris, posticis subtus strigis tri-
bus fuscis. Linn. Syst. Nat. 2. 726. 88.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura omnino praecedentis.

242. P. D. C. alis integerrimis flauis apice nigris margine-*Palaeno*.
que fuluis: posticis subtus puncto argenteo.

Papilio Europome Esp. Pap. I. tab. 4. fig. 2. *Heöff. id.*

Cram. Ins. 29. tab. 340. fig. A. B.

Habitat in Coronilla varia.

Larua subuillofa, viridis, flauo lineata nigroque pun-
ctata.

Variat rarius alis albidis.

243. P. D. C. alis rotundatis flauis: posticis macula fulua, *Hyale*.
subtus puncto sesqualtero argenteo.

Papilio Palaeno Esp. Pap. I. tab. 4. fig. 2. *Heöff.*

Cram. Ins. 30. tab. 351. fig. E. F. G. H.

Mas margine alarum nigro immaculato, *faemina* ma-
culato.

Variat puncto paruo ferrugineo loco argentei.

Larua holosericea viridis: linea laterali alba flauo
punctata.

Puppa viridis linea laterali flaua.

244. P. D. C. alis integerrimis fuluis: anticis subtus puncto *Aurora*.
ocellari, posticis sequialtero argenteis.

Papilio Aurora Esp. Pap. I. tab. 83. fig. 3. *Heöff. Heöff.*

Habitat in Sibiria Dom. Boeber.

Mera varietas praecedentis videtur. Differt tantum colore supra fuluo. Vix distingui meretur.

Lesbia. 245. P. D. C. alis integerrimis fuluis: anticis puncto fusco, omnibus subtus pallidis: puncto nivio.

Sennae. 246. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: singulis subtus puncto gemino ferrugineo.

Marcellina. 247. P. D. C. alis integris rotundatis flauis: singulis subtus puncto genuino argenteo.

Eubule. 248. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis: margine punctis nigris, posticis subtus puncto gemino ferrugineo argenteo.

Proterapia. 249. P. D. C. alis integerrimis angulatis fuluis: anticis margine exteriori nigro.

Gnoma. 250. P. D. C. alis integris rotundatis albis: anticis puncto atro, subtus omnibus puncto argenteo.

Papilio Philippina Cram. Inf. 30. tab. 361. fig. C. D.

Drya. 251. P. D. C. alis integerrimis rotundatis flauis subtus anticis puncto ferrugineo, posticis argenteo.

Phasius eclipsis. 252. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: anticis punctis duobus maculaque nigris, posticis ocello coeruleo.

Rhamni. 253. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: singulis puncto ferrugineo.

Prouenit Imago mense Augusti, saepius hybernat primo vere volitans.

Philea. 254. P. D. C. alis integerrimis angulatis flauis: anticis macula, posticis limbo luteis.

Maerula. 255. P. D. C. alis integris angulatis flauis: anticis supra macula atra, reliquis ferruginea.

Pomona. 256. P. D. C. alis subangulatis albis: anticis puncto nigro, subtus flauis: posticis punctis duobus argenteis.

Florella. 257. P. D. C. alis subangulatis albis: anticis puncto fusco, posticis subtus punctis tribus argenteis.

Cleopatra 258. P. D. C. alis integerrimis anticis supra disco fuluo, reliquis puncto ferrugineo.

* *Danai festivii.*

259. P. D. F. alis integerrimis nigris: fasciis duabus albis: *Cyparisias*.
anticarum obliquis, posticarum punctatis.
260. P. D. F. alis integerrimis nigris albo punctatis: anti. *Midamus*
cis supra coerulecentibus, posticis supra punctorum
alborum striga.
- Papilio Midamus* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. A. B.
Papilio Eleusina Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. D.
Papilio Cora Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. E.
261. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis coeruleo mi- *Claudius*.
cantibus albo punctatis, posticis lineatis.
- Papilio Basilissa* Cram. Inf. 23. tab. 266. fig. C.
Habitat Tranquebaria Dom. Lund.
Nunis omnino affinis *P. Midamus*. Corpus nigrum al-
bo punctatum. Alae anticae fuscae coeruleo mican-
tes, albo punctatae. Posticae fuscae lineis variis in-
terdum bifidis niueis. Striga e punctis albis versus
marginem subtus subconcolores.
262. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis fascia alba, *Niavices*.
posticis macula communis baseos alba.
263. P. D. F. alis integerrimis concoloribus atris: fascia *Cochrus*.
maculari alba, abdomine sanguineo - cingulis atris.
Habitat - - - - - Mus. Dr. Hunter.
Magnus et crassus. Antennae clavatae nigrae clava
apice acuminata. Thorax et pectus atra rubro
maculata. Abdomen basi atrum apice rufum cingu-
lis quatuor atris albo marginatis. Anus ater. Alae
omnes concolores, atrae fascia abbreviata maculari
alba. Pedes atri geniculis rufis.
264. P. D. F. alis integerrimis plumbeis: subtus anticis vi- *Liberius*.
ridibus posticis fuluis.
265. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis maculis tribus, *Zoilus*.
posticis disco albis.
266. P. D. F. alis integerrimis atris coeruleo maculatis: *Arethu-*
posticis subtus punctis sanguineis. *sus*.
Drury Inf. 3. tab. 8. fig. 1. 2.
267. P. D. F. alis integris nigris albo maculatis: posticis *Egialea*.
subtus disco flavo fasciaque baseos sanguinea. *leus*.
Papilio Egialea Cram. Inf. 16. tab. 189. fig. D. E.

P. Papilio var. Dr. Dr. 555

Pa-

Papilio Dio Drury Inf. 2. tab. 8. fig. 3. 4. i

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae mihi defunt. Corpus hirtum, fuscum. Alae anticae nigrae striis maculisque albis punctoque medio distincto. Posticae nigrae margine interiori albo. Subtus anticae concolores, posticae nigrae disco flavo nigro venoso et fascia lata baseos sanguinea.

Clymen-

268. P. D. F. alis integris: fascia cyanea, subtus anticis sanguineis, posticis albis annulis punctisque atris.

Lassus.

269. P. D. F. alis integerrimis fuscis: strigis nigris anticis macula marginali alba, subtus pallidis: strigis fuscis. Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo P. Clymeni. Corpus supra fuscum, subtus cinereum. Alae omnes supra fuscae strigis plurimis obscurioribus. Praeterea macula alba ad marginem exteriorem alae anticae. Subtus omnes pallidae strigis plurimis fasciaque postica fuscis. Anticae margine fusco macula punctisque albis.

Antio-

270. P. D. F. alis integerrimis rotundatis nigris: supra fascia communi fulua.

Drury Inf. 2. tab. 7. fig. 3. 4.

Syphax.

271. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis fascia alba, posticis rubra marginali.

Papilio Harmodius Cram. Inf. 19. tab. 223. fig. C. D.

Eccalthe.

272. P. D. F. alis integerrimis nigris: anticis fasciis duabus, posticis mica flavis maculisque rubris, subtus rubris: fascia maculari flava.

Licas.

273. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis fasciis duabus, posticis unica albis maculisque rubris subtus cinereis albo fasciatis.

Papilio Licas Cram. Inf. 19. tab. 223. fig. A. B.

Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Antennae fuscae clava apice acuminata, ferruginea.

Pelasgus.

274. P. D. F. alis integerrimis concoloribus: anticis virentibus; fascia fulua, posticis nigris immaculatis.

Phaeton.

275. P. D. F. alis integerrimis nigris albo rufoque maculatis.

276. P. D. F. alis integerriuis supra atris sanguineo fasciatis: anticis punctis duobus apicis albis. *Galanthis*
277. P. D. L. alis integerrimis subfuscis: posticis subtus orbe macularum nouem rubro. *Cinaeus.*
278. P. D. F. alis integerrimis fuscis albo maculatis: anticis punctis quatuor ocellaribus atris. *Tytius.*
279. P. D. F. alis integerrimis fuscis; posticis fascia coerulea, subtus viridibus: punto atro. *Eupalus.*
280. P. D. F. alis integerrimis fuscis concoloribus: anticis maculis tribus flavis, posticis dimidiato albis. *Pin-thaeus.*
281. P. D. F. alis integerrimis fuluis: venis nigris dilatatis, margine nigro: punctis albis. *Plexippus.*
282. P. D. F. alis integerrimis obscure testaceis: margine nigro albo punctato: posticarum disco immaculato subtus nigro venosi: punctis albis. *Errippus.*

Papilio Berenice Cram. Pap. 18. tab. 205. fig. E.F.

Habitat in China Mus. Dr. Hunter.

Nirnia affinitas P. *Plexippi.* Alae omnes supra obscure testaceae limbo omni nigro punctis paucis albis. Discus anticarum punctis aliquot albis ante apicem, posticarum omnino immaculatus. Subtus anticae concolores, posticae nigro marginatae punctis plurimis albis. Discus nigro venosus punctis lineolisque albis.

283. P. D. F. alis subintegris fuluis: margine nigro albo punctato, posticis arcu nigro. *Misippus.*
284. P. D. F. alis integerrimis fuluis, margine nigro; punctis albis, posticis disco punctis nigris. *Chrysippus.*
285. P. D. F. alis integerrimis fuluis: margine nigro; punctis albis, posticis disco albo: punctis nigris. *Alcippus.*
286. P. D. F. alis integerrimis concoloribus fuluis albo maculatis: margine atro: punctis albis. *Gilippus.*
287. P. D. F. alis integerrimis concoloribus nigris albo maculatis: anticis basi fuluo, posticis albo lineatis. *Hegeippus.*
288. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis albo maculatis; posticis subtus arcu nigro. *Darius.*
289. P. D. F. alis integerrimis fuscis albo maculatis, subtus brunneis. *Daedalus*

- Nicaeus. 290. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocello, posticis supra fascia rubra marginali punctisque nigris ocellaribus.
- Numilius. 291. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis maculis duabus, posticis vniuersitate fuluis.
- Codoman. 292. P. D. F. alis integerrimis atris sanguineo fasciatis, posticis subtus lineis annularibus flauis punctisque coeruleis.
- Hyda-
spes. 293. P. D. F. alis integerrimis fuscis coeruleo micantibus: posticis subtus flauis; lineis annularibus nigris punctisque tribus coeruleis.
- Griphus. 294. P. D. F. alis integerrimis subfuscis: subtus striga punctorum alborum.
Habitat in China.
Striga e punctis quinque albis in singula ala.
- Sophorae. 295. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia ferruginea, posticis subtus brunneis; ocellis tribus.
Cram. Pap. 21. tab. 213. fig. A. B. C.
- Xanthus. 296. P. D. F. alis integerrimis fuscis; fascia ferruginea, posticis subtus griseo marmoratis: ocellis duobus.
Conf. Papilio Quiteria Cram. Pap. 27. tab. 313. fig. A. B. C. D. at alae dentatae.
- Cassiae. 297. P. D. F. alis subintegris fuscis: fascia ferruginea apice bifida, posticis subtus cinereis: ocellis duobus.
- Berecyn-
thus. 298. P. D. F. alis integerrimis supra atris: fascia marginali flava, subtus posticis maculis sex ocellaribus.
- Oethon. 299. P. D. F. alis integerrimis fuscis: striga marginali fulua, posticis subtus subundatis: ocellis septem.
- Pirithous 300. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis: anticis fascia, posticis disco omnibusque subtus albis.
- Polixenes 301. P. D. F. alis integris fuscis: posticis subtus griseo fuscoque nebulosis.
- Cupauius 302. P. D. F. alis integris atris albo maculatis: posticis subtus griseis: fascia vtrinque alba.
- Marthe-
fus. 304. P. D. F. alis integris atris: anticis disco fuluo, posticis striga punctorum alborum.
- Arceſi-
laus. 305. P. D. F. alis integerrimis supra ferrugineis immaculatis subtus fuscis: strigis duabus obscurioribus.

Habi-

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Magnitudo P. Hyperanthi. Antennae mihi desunt.
Alae omnes supra ferrugineae omnino immaculatae,
subtus fuscae strigis tantum duabus obscurioribus.

306. P. D. F. alis integerrimis supra nigris, subtus brun- *Polyclar-*
neis immaculatis. *mes.*

Papilio Odilla Cram. Pap. 28. tab. 329. fig. C. D.

Habitat Surinami.

307. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis falcatis; fa- *Chori-*
scia fulua, posticis caudatis. *naeus.*

Papilio Arceſilaus Cram. Pap. 25. tab. 294. fig. A. B. Seb.
Mus. 4. tab. 41. fig. 15. 16.

308. P. D. F. alis integerrimis subcaudatis fuluis basi coe- *Eribotes:*
ruleſcentibus, subtus griseis.

309. P. D. F. alis subcaudatis fuluis apice flavo nigris, sub- *Itys.*
tus variegatis: posticis basi coeruleis.

310. P. D. F. alis caudatis fuscis basi coeruleis posticis su- *Laertes.*
pra punctis quinque albis, subtus quatuor ocellaribus.

311. P. D. F. alis integris caudatis supra fuscis basi coe- *Moruus.*
reis, subtus griseo virescentibus.

312. P. D. F. alis subcaudatis fuscis: anticis fascia lutescen- *Aetorion:*
te exteriore maculaque coerulea postica subtusque
ocello.

313. P. D. F. alis subcaudatis fuscis basi coeruleo nitidis: *Cymodoce*
posticis ocello vtrinque vnico.

314. P. D. F. alis subcaudatis fuluis apice nigris: subtus *Bifaltide.*
punctis ocellaribus anticis duobus, posticis tribus.

315. P. D. F. alis integerrimis: anticis falcatis rufis apice *Orion.*
nigris; macula marginali alba.

316. P. D. F. alis integerrimis falcatis supra nigris: margi- *Cocytus.*
ne postico cinereis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Medius. Alae anticae falcatae nigrae margine posti-
co cinereo. Punctum marginale apicis late cine-
reo. Subtus omnes cinerascentes anticis striga po-
stica fusca.

Simillimum ex India orientali misit Dom. Lund. at alis
dentatis margineque alarum postico coeruleſcente,
vix tamen distinctum.

- Obrinus. 317. P. D. F. alis integerrimis atris: anticis falcatis rufis apice nigris: macula marginali alba.
- Papilio Ancaea* Cram. Pap. 29. tab. 338. fig. C. D.
- Ancaeus. 318. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis: fascia coerulea inaculaque ferruginea, subtus viridibus: fascia albicans.
- Lucindus. 319. P. C. F. alis integerrimis nigro fasciatis supra coeruleis subtus fuluis.
- Thymetus. 320. P. D. F. alis oblongis integerrimis fuscis: limbo communis fusco.
- Habitat - - - - Mus. Dr. Hunter.
- Paruus.. Antennae nigro alboque annulatae clava nigra apice fulua. Corpus flavescentis thorace nigricante. Alae flavescentes limbo omni nigro. Subtus flavescentes fuluo vndulatae.
- Morpheus. 321. P. D. F. alis integerrimis fuluis nigro maculatis: posticis vtrinque striga punctorum nigrorum.
- Lysidice. 322. P. D. F. alis integerrimis coeruleis supra limbo subtus fasciis atris.
- Eumeus. 323. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia alba posticarum vtrinque terminata macula fulua.
- Dardus. 324. P. D. alis integerrimis fuscis: anticis vtrinque ocello medio cyaneo, omnibus subtus strigis duabus ocellaribus.
- Habitat Surinami Dr. Schulz.
- Medius. Corpus fuscum. Alae omnes supra fuscae versus apicem strigis duabus macularibus obsoletis griseis posteriori subocellari. In medio alae anticae ocellus magnus cyaneus iride fulua absque pupilla, pone hunc puncta duo parua alba. Subtus omnes cinereae versus apicem strigis duabus macularibus albidis posteriori subocellari. In medio alae anticae ocellus magnus vti in pagina superiori.
- Iairus. 325. P. D. F. alis integerrimis fuscis: posticis disco albo, supra ocello, subtus duobus.
- Arcas. 326. P. D. F. alis integerrimis coeruleis: anticis albo maculatis, posticis macula atra albaque marginali.
- Clytus. 327. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis fascia flava ocelloque subtripupillato, posticis ocellis quinque.
328. P.

328. P. D. F. alis integerrimis fuscis area rufa: anticis ocello bipupillato, posticis subtus coecis. *Hyperbius.*
Papilio Caffus alis integerrimis fuscis: umbra rufescente, primoribus ocello didymo; posticis ocellis tribus Linn. Syst. Nat. 2. 768. 125. Mus. Lud. Vlr. 269.
329. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocello tripupillato, posticis lineis transuersis vndatis. *Philocles.*
330. P. D. F. alis integerrimis concoloribus nigris: fascia communis alba: anticis ocello tripupillato. *Renatus.*
Papilio Renata Cram. Pap. 28. tab. 326. fig. B.
 Habitat Surinami.
 Alae basi fulcae apice atrae fascia media alba. Ocellus ante fasciam ater punctis tribus albis. Nimis affinis videtur *P. Philocles*.
331. P. D. F. alis integerrimis cyaneis: strigis atris numerofosis, anticis supra macula ocellari tripupillata. *Croesus.*
332. P. D. F. alis integerrimis fuscis: fascia lutea, anticis subtus basi ocello mico. *Aeropus.*
333. P. D. F. alis nigris supra fuscis immaculatis: posticis subtus ocellis sex. *Canthus.*
334. P. D. F. alis integerrimis fuscis subtus anticis ocellis tribus, posticis duobus tribusque. *Hyperanthus.*
Larua solitaria villosa cinerea: linea postica nigra, ano bidentata.
- Puppa* gibba brunnea flavo maculata.
335. P. D. F. alis integerrimis supra nigris immaculatis subtus fuscis: anticis ocellis subtribus, posticis quinque. *Oedippus.*
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber:
 Statura omnino *P. Hyperanthi*. Antennae albo nigroque annulatae clava ferruginea. Alae omnes supra nigrae immaculatae, subtus fulcae ocellis subtribus, posticis quinque pupilla argentea, unico remoto. Striga marginalis argentea fere obsoleta.
336. P. D. F. alis integerrimis fuscis: omnibus subtus ocello unico: anticarum bipupillato. *Zangis.*
Papilio Agnes Cram. Pap. 28. tab. 325. fig. A. B.

Eurytus.

337. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis ocellis vtrinque duobus, posticis supra vnico, subtus quatuor, omnibus pupilla gemina.

Tarpeius.

338. P. D. F. alis integris fuluis: omnibus ocellis quatuor coccis.

Papilio Celamine Cram. Pap. 32. tab. 375. fig. E. F.

Papilio Tarpeia Esp. Pap. 2. tab. 83. fig. 1. 2.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Alae omnes supra fuluae margine fusco ocellisque quatuor, rarius quinque nigris coecis. Subtus anticae fuluae, posticae fuscae strigis fasciaque albis.

Hermes.

339. P. D. F. alis integerrimis supra fuscis immaculatis, posticis subtus ocellis sex; tribus coecis.

Irius.

340. P. D. F. alis integerrimis disco flavo, posticis ocello supra vnico, subtus duobus.

Mineus.

341. P. D. F. alis integerrimis fascis: anticis supra ocello vnico, posticis subtus septem fasciaque alba.

Medus.

342. P. D. F. alis integerrimis fuscis: subtus striga niuea ocellisque antifarum duobus postifarum tribus.

Perseus.

343. P. D. F. alis integerrimis fuscis: subtus punctis ocellaribus; anticis tribus, posticis septem.

Terminus.

344. P. D. F. alis integris fuscis: area rufa, supra anticis ocello vnico, posticis quatuor.

Sirius.

345. P. D. F. alis integerrimis obscurae rufis: supra anticis ocellis duobus, posticis quatuor.

Druſius.

346. P. D. F. alis integerrimis fuluis apice nigris posticis subtus punctis albis ocellisque duobus.

Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae clavatae nigrae clava apice ferruginea. Alae anticae fuluae apice nigrae fascia puncto que fuluis, posticae fuluae margine postico nigro puncto que uno altero que ocellari ante marginem nigro. Subtus omnes ferrugineo variae, anticis in medio macula flexuosa punctisque apicis albis, posticis punctis duobus albis baseos, striga nigra in medio ocellisque duobus ante marginem pupilla nigra albaque. Ocelli praeterea duo obsoleti vix distincti in eadem linea.

347. P. D. F. alis integerrimis fuluis: anticis ocello sub- *Dauus*.
tus albo fasciatis: posticis ocellis sex.
Papilio Iphis Wien. Verz. 321. 25.
Papilio Typhon Naturf. 10. tab. fig.
Papilio Philoxenes Esp. Pap. tab. 54. fig. 3.
Papilio Tullia Myll. Faun. Friedrichsd.
Mas alis supra ocellis obsoletis.
348. P. D. F. alis integerrimis flavis: subtus anticis ocello *Pamphi-*
vnico, posticis cinereis: fascia ocellisque quatuor *lus*.
oblitteratis.
Puppa viridis.
349. P. D. F. alis integerrimis ferrugineis: subtus anticis *Arcanius*
ocello vnico, posticis quinis: priuno fascia remoto.
Habitat in Europa Melica.
Larua viridis lineis dorsalibus obscurioribus laterali-
bus flavis, cauda bidentata.
350. P. D. F. alis integerrimis fuscescentibus (fuluis) po- *Leander*.
sticis subtus cinereis apice fuluis; ocellis sex.
Papilio Leander Esp. Pap. tab. 89. fig. 5.
Habitat in Europa australiori Dom. Boeber.
Statura omnino P. Arcanii. Mas alis fuscis, faemi-
na anticis fuluis, posticis fuscis, ocello vno alte-
roue aut nullo in alis anticis et quatuor aut quin-
que in posticis. Subtus posticae cinereae ocellis sex
omnibus approximatis pupilla argentea.
351. P. D. F. alis integerrimis fuscis: posticis supra ocellis *Sabaeus*.
quatuor coecis, subtus sex pupillatis.
Papilio Hero Esp. Pap. tab. 22. fig. 4.
Omnino distinctus. Alae posticae apice fuluae fascia-
dentata alba, tunc ocelli sex atri pupilla alba et de-
nique striga argentea.
352. P. D. F. alis integerrimis fuluis: subtus anticis ocel- *Hero*.
lo posticis senis.
Papilio Hero Wien. Verz. 168. 13.
Papilio Typhon. Esp. pap. tab. 35. fig. 3. 4.
353. P. D. F. alis integerrimis fuscis: anticis vtrinque ocel- *Artous*.
lo bipupillato, posticis supra subcoecis.
354. P. D. F. alis integerrimis supra albis subtus fuscis al- *Phryneus*
bo venosis: ocellis quinque.
Papilio Phryne Esp. pap. tab. 89. fig. 3. 4.
- Fabr. Insect. T. II.* C Habi-

Habitat in Russiae australioris desertis Dom. Boeber.

Parus, tener. Corpus album. Alae omnes supra albae, immaculatae, subtus fuscae venis albis. Versus marginem ocelli quinque pupilla alba.

Hypheus. 355. P.D.F. alis integerrimis concoloribus albis fusco fasciatis: anticis ocello atro posticis coecis.

Baldus. 356. P.D.F. alis integerrimis fuscis: anticis vtrinque ocello; pupilla gemina posticis supra ocellis quatuor, subtus sex.

Eumenes. 357. P.D.F. alis integerrimis dimidiato fuscis: anticis vtrinque ocello atro tripupillato.

Ephyne. 358. P.D.F. alis integerrimis coeruleis purpureo fasciatis: anticis vtrinque ocello; inferiori tripupillato.

Tullius. 359. P.D.F. alis integerrimis obscure cinereis: anticis apice fuscis vtrinque ocello tripupillato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parus. Alae anticae obscure cinereae apice obscuriores strigis vndatis flavescentibus ocelloque magno atro pupillis tribus coerulescentibus. Subtus concolores. Posticae obscure lutescentibus apiceque strigis fuscis.

* *Nymphales gemmati.*

Io. 360. P.N.G. alis angulato dentatis fuluis nigro maculatis: singulis ocello coeruleo.

Polynice. 361. P.N.G. alis angulato dentatis fuluis apice nigris, subtus fuscis: strigis coeruleis ocellisque anticarum sex, posticarum quinque.

Almana. 362. P.N.G. alis angulatis fuluis nigro maculatis posticis ocello maiori: pupilla gemina, omnibus subtus brunneis.

Asterie. 363. P.N.G. alis dentato luteis variis: posticis ocello maiori; pupilla gemina, subtus pallidis ocellis subtribus.

Oenone. 364. P.N.G. alis denticulatis luteis margine nigris, posticis basi cyaneis.

Lemonias. 365. P.N.G. alis dentatis fuscis flavo punctatis: omnibus ocello unico.

366. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia postica fulua; ocel. Villida.
lis duobus.

Habitat in Insula Amsterdam, in Pulicander Mus. Dom.
Banks.

Paruus. Antennae pallidae clava fusca. Corpus supra
fuscum. Alae anticae supra fuscae maculis duabus
fuluis, duabusque flavescentibus. Versus marginem
posticum fascia lata fulua ocellis duobus atris pupilla
coerulea, anteriore minore. Posticae fuliae lunula
media et fascia postica fuluis ocellis duobus atris pu-
pilla coerulea. Subtus pallido fuluoque variegatae
fascia postica fulua, anticarum ocello uno, posti-
carum plerumque duobus.

367. P. N. G. alis dentatis fuscis: omnibus supra ocellis Orithya.
duobus, anticis subtus uno.

Plures huius sunt aut species aut varietates nondum rite
determinatae.

368. P. N. G. alis dentatis supra fuscis, subtus omnibus Penelea.
ocellis duobus.

369. P. N. G. alis repandis supra fuscis: anticis ocellis Attaea.
duobus punctisque duobus albis, posticis subtus mar-
moratis.

Papilio Attaea Esp. pap. tab. 85. fig. 4. t. 57. f. 1. 2. 6.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Fidiae et Faunae, at alae vix dentatae
et alae posticae subtus marmoratae puncto uno alte-
roue atro ad angulum ani.

370. P. N. G. alis dentatis supra fuscis: anticis ocellis duo-
bus punctisque duobus albis, posticis subtus striga
angulata atra. *Epr. 49. 2.*

Alae posticae subtus fusco alboque variae striga sesqui
altera angulata atra.

371. P. N. G. alis dentatis supra fuscis: anaicis ocellis duo-
bus punctisque duobus albis, posticis subtus griseis. Fauna.

Papilio Fauna Esp. pap. tab. 63. fig. 1.

Habitat in Germaniae Pinetis Mus. Dom. Romani.

Nimis affinis P. Fidia at duplo minor. Alae supra omnes
fuscae, anticis ocellis duobus minoribus iride flave-
scente, saepe coecis et inter ocellos puncta duo alba,
posticis puncto uno alteroue obsoleto albo puncto-

que distinctiori atro. Subtus ocelli anteriorum maiores. Posticae griseae.

- Feronia.* 372. P. N. G. alis dentatis supra coeruleo fusco alboque marmoratis, omnibus ocellis sex.

Cram. Inf. 31. tab. 362. fig. A. B.

- Maera.* 373. P. N. G. alis dentatis fuscis vtrinque anticus sesqui ocello, posticis ocellis supra tribus subtus sex.

Varietas Petropolitana duplo minor alis anticus supra absque disco fulvo tempore vernali volitans. Dom. Boeber.

- Roxelana* 374. P. N. G. alis dentatis fuscis supra coecis, posticis subtus vndatis ocellis septem: interiori pupilla gemina.

- Zelima.* 375. P. N. G. alis angulatis flavis fusco subfasciatis, posticis vtrinque ocellis sex, subtus striga alba.

- Terea.* 376. P. N. G. alis angulatis dentatis supra fuscis: fascia fulua, anticusque striga punctorum alborum, posticis ocellorum.

- Laodice.* 377. P. N. G. alis angulatis supra nigris: fascia vtrinque virescente: striga punctorum ocellatorum.

- Lampetia* 378. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticus fascia fulua; posticis ocellis sex coecis Linn. Syst. Nat. 2. 775. 160. Mus. Lind. Nr. 104.

Clerk. Icon. tab. 39. fig. 2.

Cram. Inf. 30. tab. 349. fig. A. B.

Habitat in India orientali.

- Glycerie.* 379. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticus fascia fulua, subtus anticus ocello, posticis duobus coecis.

Habitat in India orientali. Dom. Boeber.

Magnus fuscus: Alae anticae fuscae apice obscuriores fascia fulua punctisque duobus albis. Posticae fuscae maculis aliquot marginalibus fuluis. Subtus omnes marmoratae, anticus fascia flavescente obsoleta ocellaque magno atro coeco apicis. Posticae ocellis duabus distinctioribus griseis coecis.

- Megaera.* 380. P. N. G. alis dentatis luteis fusco fasciatis: anticus ocello, posticis supra quinis subtus sex.

Larua villosa viridis pallido striata: cauda bifida.

381. P. N. G. alis dentatis fuscis luteo maculatis vtrinque *Aegeria*.
anticis ocello, posticis supra ocellis subtus punctis
quatuor.
- Larua* cauda bifida.
382. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo maculatis vtrinque *Xiphia*.
anticis ocello posticisque supra tribus subtus quatuor.
383. P. N. G. alis dentatis fuluis apice nigris albo macu- *Minerua*.
latis, posticis ocellis supra quinque coecis, subtus
septem pupillatis.
384. P. N. G. alis dentatis supra fuscis immaculatis sub- *Ocypete*.
tus glaucis: strigis tribus obscuris, posticis ocellis
quinque.
385. P. N. G. alis dentatis supra albis apice fuscis, subtus *Ocirrhoë*.
fuscis: fasciis duabus albis, posticis ocellis quinque.
386. P. N. G. alis subdentatis fuscis ocello vnico: posticis *Penelope*.
subtus duobus.
387. P. N. G. alis subdentatis fuscis: posticis coerulescenti- *Arnaea*.
bus: subtus ocellis quinque.
388. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus: sub- *Atlita*.
tus fuluis: strigis vndatis glaucis, posticis ocellis
quinque coecis.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Medius. Alae omnes supra fuscae coeruleo colore mi-
cantes. Posticae maculis tribus submarginalibus
fuluis. Subtus omnes obscure fulvae strigis pluri-
mis vndatis glaucis. Punctum distinctum glaucum
versus apicem alae anticae. Ocelli quinque coeci in
posticis, quae ante marginem glaucescunt.

389. P. N. G. alis angulatis pallidis: strigis vndatis fuscis *Iatro-*
anticis ocello vnico, posticis duobus. *phæ.*
390. P. N. G. alis dentatis cinerascentibus: supra anticis *Saome-*
ocellis sex, posticis quinque: quibusdam coecis. *dia.*
391. P. N. G. alis dentatis fuscis subtus fasciatis: posticis *Libye*.
ocellis sex; pupilla argentea.
392. P. N. G. alis dentatis concoloribus griseis: singulis *Hedonia*.
ocellis sex ferrugineis.

Cram. Inf. 32. tab. 374. fig. E, F.

- Deganira 393. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis ocellis vtrinque quinque, posticis sex fasciaque alba repanda.
Larua villoſa viridis pallido lineata: cauda bifida.
- Tullia. 394. P. N. G. alis dentatis fuscis: maculis ocellaribus, subtus fascia violacea, posticarum ocellis duobus.
- Pegala. 395. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis fascia rufa ocello uno, posticis supra ocello, subtus sex.
- Briseis. 396. P. N. G. alis dentatis fuscis viridi micantibus: fascia alba, anticis ocellis duobus, posticis coecis.
 Esp. pap. I. tab. 26. fig. 1. 2.
Papilio Ianthe Pall. Itin.
- Manto. 397. P. N. G. alis integris fuscis: punctis ocellaribus antecarum quatuor, posticarum tribus, posticis subtus cinereis fusco vndatis.
Papilio Manto Wien. Verz. 169. 15.
 Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
 Medius. Antennae supra fuscae subtus albidae clava ferruginea. Alae supra fuscae coeruleo micantes punctis ocellaribus atris iride ferruginea. Subtus anticae disco ferrugineo, posticae cinereae strigis duabus vndatis punctisque duobus fuscis.
- Autonoe. 398. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo subfasciatis ocellisque duobus pupillatis, anticis subtus basi fuscis.
Papilio Autonoe Esp. pap. tab. 86. fig. I. 2. 3.
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.
 Nemis affinis P. Semele. Alae supra fuscae anticis fascia maculari flavescente, posticis striga albida. Ocelli duo distincti nigri pupilla alba. Alae anticae subtus fuscae fascia lata flava ocellis duobus anteriore maiore pupillato.
- Alcyone. 399. P. N. G. alis dentatis fuscis flavo fasciatis: anticis vtrinque ocellis duobus, posticis subtus marmoratis.
Papilio Agave Esp. pap. tab. 84. fig. 4.
 Habitat in Russia australioris montosis Dom. Boeber.
 Nemis affinis P. Semele at fascia alarum distinctior, maior striga nigra terminata. Alae minus dentatae ciliis albidiioribus, et alae anticae subtus haud disco rufo baseos ut in P. Semele, sed totae flavescentes strigis nigris.

400. P. N. G. alis dentatis fascia maculari fulua ocellisque Semele.
duobus: anticis subtus disco baseos fuluo.
Alae anticae subtus basi fuluae. Ocelli paginae superioris saepius coeci.

401. P. N. G. alis dentatis supra fuscis: fascia maculari Arethusa.
rufa: anticis vtrinque ocello vnico.
Papilio Arethusa Esp. pap. tab. 69. fig. 3. 4.
Wien. Verz. 169. 16.

Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.

Simillimus P. Semele. Alae omnes supra fuscae fascia communi e maculis quatuor fuluis. Dentes albo nigroque varii. Oculus parvus coecus alae anticae. Subtus anticae fuscae disco ferrugineo ocello maiori pupillato. Posticae griseae.

402. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia pallida, anticis Hermione
ocellis supra duobus, subtus vnico.

Papilio Hermione Wien. Verz. 169. 22.

Confer. *Papilio Alyone* Wien. Verz. 169. 21.

Esp. pap. 1. tab. 8. fig. 2.

vix distinctus quamvis minor.

Metamorphosis sub terra.

Larua grisea linea dorsali atra, cauda bifida.

403. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia vtrinque alba, anticis ocello vnico. Circe.

Esp. pap. tab. 39. fig. 2.

Metamorphosis sub terra.

404. P. N. G. alis dentatis concoloribus: anticis ocellis duobus violaceis. Phaedra.

Wien. Verz. 169. 19.

Habitat in Auena elatiore.

Metamorphosis sub terra.

Larua grisea lineis duabus dorsalibus macularum nigrarum, cauda bifida.

405. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis ocello obsoleto, subtus striga flauescente, posticis punctis ocellariis atris. Periboca.

406. P. N. G. alis caudato dentatis fuluis nigro maculatis, posticis ocellis vtrinque duobus. Arfinoe.

407. P. N. G. alis caudato dentatis fuscis subtus vndatis: posticis ocellis duobus disci, quinque marginalibus coerulescentibus. Panthera.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Medius. Corpus fuscum. Alae dentato caudatae supra nigrae margine fusco, subtus vndatae. Posticae ocellis duobus paruis disci pupilla coerulecente, apice cinereo fuscescentes ocellis quinque nigris pupilla coerulecente.

Merope. 408. P. N. G. alis dentatis fuluis apice nigris: ocello unico, posticis subtus cinereis: ocellis tribus minutissimis.

Ligea. 409. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia rufa vtrinque anticis ocellis quatuor, posticis tribus, subtus albo maculatis.

Papilio Alexis Esp. pap. tab. 44. fig. 1. 2.

Naturf. 8. tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europae Gramine.

Distinctus maculis albis in pagina inferiore alae posticace. Variat rarius fascia cinerea loco fuluae.

Larua villosa viridis linea dorsali nigra, capite flavo, cauda bifida.

Medusa. 410. P. N. G. alis subdentatis concoloribus fuscis omnibus fascia maculari flava; ocellis subquatuor.

Papilio Medusa Wien. Verz. 167. 10.

Papilio Ligea Esp. Pap. 1. tab. 7. fig. 2.

Alb. Inf. tab. 5. fig. 1.

Schaeff. Ikon. tab. 183. fig. 2. 3.

Naturf. 8. 113. 1.

Habitat in Austriae Punica Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentie. Alae omnes fuscae, immaculatae, at ante marginem fascia macularis, et in hac ocelli iride atra pupilla alba. Numerus eorum variat. Corpus atrum, immaculatum.

Epiphron 411. P. N. G. alis integris nigris: fascia rubra: anticis supra ocellis duobus subtus tribus, posticis supra tribus, subtus quinque.

Papilio Epiphron Knoch Beytr. 3. tab. 6. fig. 7.

Habitat in Germaniae montosis Dom. Boeber.

Statura omnino et summa affinitas P. Medusae, at duplo fere minor. Corpus atrum antennis subtus albis. Alae supra nigricantes fascia fulua antecarum imprimis valde abbreviata, ocellis duobus approximatis, posticae ocellis tribus omnibus pupillatis.

Subtus

Subtus concolores at anticis ocellis tribus, posticis ocellis quinque. Numerus ocellorum alae anticae variat.

412. P. N. G: alis dentatis fuscis: fascia rufa ocellata, posticis subtus fuscis: fascia cinerea. *Blandina* ✓

Papilio Medea Wien. Verz. 167. 7.

Papilio Ligaea Scop. carn. 436.

Papilio Aethiops Esp. pap. tab. 25. fig. 3. ♂
tab. 63. fig. 1. ♀

Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.

Nimis affinis P. Ligae. Differt tamen alis posticis vix ocellatis fuscis fascia cinerea absque maculis albis.

413. P. N. G. alis integris fuscis: ocellis sex, posticis cinereo venosis. *Afra*.

Papilio Afer Esp. pap. tab. 83. fig. 4. 5.

Habitat in Russiae australioris desertis Dom. Boeber.

Statura et magnitudo omnino P. Blandinae. Antennarum clava subtus excavata. Alae omnes supra nigrae ocellis circiter sex. Subtus anticae nigrae basi litura ferruginea ocellisque 5-6 duobus maioribus, posticae fuscae cinereo venosae ocellis sex vel septem.

414. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia maculari fulua; punctis ocellaribus nigris. *Erina*. ✓

Papilio Erina Wien. Verz. 169. 15.

Papilio Manto Esp. pap. tab. 70. fig. 2. 3.

Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.

Affinis P. Ligaea at distinctius corpore minore ocellisque coecis vel potius punctis ocellaribus.

415. P. N. G. alis integris atris: anticis vtrinque fascia rufa; ocellis duobus, posticis subtus fascia dentata cinerea. *Arachne*.

Papilio Arachne Wien. Verz. 169. 18.

Habitat in Austria Dom. Schieffernyller.

Statura omnino P. Erinae. Alae omnes atrae coeruleomicantes. Anticae vtrinque fascia abbreviata rufa et in hac ocelli duo approximati pupilla alba. Posticae supra atrae fascia parua maculari rubra, interdum puncto uno alteroue ocellari. Subtus atrae fascia dentata cinerea. Antennae supra nigrae, subtus albae.

Pyrrha. 416. P. N. G. alis integris fuscis: fascia rubra; anticarum nigro punctata, posticarum maculari.

Papilio Pyrrha Wien. Verz. 167. 9.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Nimis praecedentibus affinis. P. *Ligea paullo minor*. Antennae supra nigrae, subtus albae. Alae omnes supra fuscae fascia rufa, quae tamen margines haud attingit. In hac fascia alae anticae puncta aliquot nigra, posticae macularis, immaculata. Corpus immaculatum.

Cassiope. 417. P. N. G. alis integris fuscis: fascia rufa; punctis tribus ocellaribus nigris, posticis subtus punctis solis.

Habitat in Austriae Gramine Dom. Schieffermyller.

Praecedenti affinis at paullo minor. Corpus nigrum. Antennae supra nigrae, subtus pallidae. Alae omnes supra nigrae fascia marginis haud attingente, in posticis in primis maculari rufa et in hac puncta tria nigra. Subtus anticae concolores, posticae punctis tribus at absque fascia rufa.

Arete. 418. P. H. G. alis integris fuscis: fascia rufa, posticis vtrisque striga punctorum alborum.

Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis. Corpus nigrum abdome subtus griseo. Alae supra nigrae anticis fascia lata rufa, quae tamen margines haud attingit et in fascia puncta subtria ocellaria alba. Posticae nigrae fascia obsoleta rufa et in hoc puncta quatuor distincta alba. Subtus anticae disco ferrugineo punctis tribus ocellaribus albis, posticae griseo virescentes striga e punctis septem albis.

Salome. 419. P. N. G. alis anticis fuscis: fascia rufa: anticis ocello posticis tribus, subtus striga dentata alba ocellisque quinque.

Papilio Pasiphiae Esp. pap. tab. 67, fig. 4.

Habitat in Gibraltar Dom. Boeber.

Statura praecedentium at distinctus alis posticis subtus nigris striga videntata alba et pone hanc ocelli quinque parui pupilla alba. Ocellus alae anticae in nostris pupilla simplici.

Zole. 420. P. N. G. alis dentatis fuluis nigro punctatis: posticis subtus ocellis quinque, ultimo bipupillato:

421. P. N. G. alis dentatis albo nigroque variis; subtus anticus ocello unico, posticus quinque. *Galathea.*
 Numerus ocellorum variat.
Varietas fusca albo varia in Russia australiori Dom. Boeber.
Puppa nigro bimaculata.
422. P. N. G. alis dentatis albis nigro strigosis: anticus ocello unico, posticus quinque. *Arge.*
Papilio Arge Esp. pap. tab. 84. fig. 1. 2.
 Habitat in Russia australioris desertis Dom. Boeber.
 Statura et summa affinitas *P. Galathea*. Alae omnes albae strigis plurimis undatis nigris. Alae anticae vtrinque ocello parvo superiori coeco. Posticae vtrinque quinque pupillatis.
423. P. N. G. alis dentatis fuscis: subtus striga obliqua alba, anticus ocellis duobus, posticus sesquitertiis. *Hesione.*
424. P. N. G. alis dentatis supra nigris: fascia communis *Egaea.* alba, posticus subtus ocellis duobus.
426. P. N. G. alis subdentatis supra viridibus, posticus *Serina.* subtus disco albo; ocellis duobus.
426. P. N. G. alis dentatis fuscis: subtus coeruleis nigro *Doris.* fasciatis; ocellis trium parium.
427. P. N. G. alis dentatis supra fuscis albo subfasciat, *Ianthe.* posticus subtus ocellis quinque coecis.
428. P. N. G. alis dentatis fuscis: disco fulvo, anticus vtrinque ocello nigro: pupilla gemina, posticus subtus punctis ocellaribus niueis. *Pilosellae* *Tiburonis Lin.*
Pupilla Herse Wien. Verz. 320. 24. *Macha Cr.*
429. P. N. G. alis subdentatis fuscis: disco fulvo: anticus vtrinque ocello nigro bipupillato, posticus subtus griseo variis: *Ida.*
Papilio Ida Esp. pap. tab. 92. fig. 2. at alae magis dentatae.
 Habitat in Gibraltar Dom. Boeber.
 Nimis affinis *P. Pilosellae* at minor alis subintegris at omnino absque punctis albis in pagina inferiori alae posticae.
430. P. N. G. alis dentatis fuscis: disco albido, subtus albido; anticus ocellis duobus, posticus septem. *Melusina.*

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Paruus. Antennæ supra nigrae, subtus cinereæ. Alae supra fuscae limbo obscure albo. Subtus anticae albidae margine exteriori fuscō ocellisque duobus, altero ad marginem exteriorem, altero maiore ad interiorem. Posticae albae margine postico strigoso ocellisque septem, tertio quintoque maioribus.

Cadma. 431. P. N. G. alis dentatis fuluis: posticis subtus disco albo: ocellis duobus: pupilla didyma coerulea.

Laothoë. 432. P. N. G. alis angulato dentatis: posticis supra fuscis; puncto albo, subtus ocellis sex coeruleis.

Ianira. 433. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis subtus luteis; ocello vtrinque vnico, posticis subtus punctis tribus.

Papilio Iurtina alis dentatis fuscis: anticis supra litura flava, ocello vtrinque vnico, posticis coecis. Sp. Inf. 2. 81. 359. pura sexus varietas.

Clymene. 434. P. N. G. alis dentatis fuscis: litura ferruginea, posticis ocellis supra subtribus, subtus subseptem.

Papilio Clymene Esp. pap. tab. 85. fig. 1. 2. ♂
fig. 3. ♀

Habitat in Russiae australioris sylvaticis Dom. Boeber. Statura et magnitudo omnino P. Iurtinae. Alae anticae fuscae disco rufo vtrinque ocello subtus pupillato. Posticae fuscae maculis quatuor fuluis et in his ocelli duo aut tres coeci, subtus fuscescentes ocellis septem coecis, e quibus 2. 3. saepe minutissimi vix apparent, vltimi duo connati.

Eudora. 435. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis vtrinque disco ferrugineo: ocello maris vnico, faeminae duobus.

Papilio Eudora Esp. pap. tab. 69. fig. 1. 2.

Habitat in Germaniae sylvis Dom. Boeber.

Nimis affinis P. Ianiræ at paullo minor. Differt disco alae anticae vtrinque ferrugineo. Posticae subtus obscure griseæ, immaculatae.

Tisiphone. 436. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis vtrinque ocellis duobus, posticis sex: pupilla violacea.

Ocelli alae anticae connati. Alae posticae strigis angularatis.

Generilia. 437. P. N. G. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi rufa, posticis ocellis quatuor.

438. P. N. G. alis dentatis nigris: anticis fascia punctisque Itea.
flavis, posticis disco rufo: ocellis quatuor.
439. P. N. G. alis dentatis fuscis: posticis supra ocellis Portlan-
quinque coecis, subtus septem pupillatis. dia.
440. P. N. G. alis dentatis fuluis albo nigroque variega- Cardui.
tis: posticis subtus ocellis quatuor.
441. P. N. G. alis subangulatis fuluis albo nigroque variis, Huntera.
posticis subtus albo reticulatis ocellisque duobus.
442. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis subtus ocellis Allionia.
duobus; posteriori coeco.
443. P. N. G. alis dentatis subconcoloribus fuscescensibus: Tulba-
fascia lutea posticis ocellis quinque. ghia.
444. P. N. G. alis crenatis nigris concoloribus: posticis Pipleis.
disco fulvo; ocellis septem.
445. P. N. G. alis crenatis nigris: area sanguinea, posticis Claudia.
subtus marmoratis: ocellis septem.
446. P. N. G. alis caudato dentatis fuscis: anticis fascia Rohria.
alba, posticis subtus ocellis septem; plurimis albo
punctatis.

Habitat in India Dom. Vahl.

Medius. Alae omnes supra fuscae. Anticae fascia alba, quae tamen marginem posticum haud attingit, maculisque duabus apicis. Margo albo maculatus. Posticae fere caudatae margine tenuissime albo. Subtus fuscae; glauco vndatae, anticae fascia alba ocellis tribus atris coecis, posticae ocellis septem anteriori maiori atro pupilla alba, tunc tribus oblongis punctis nigris albo foedis, denique quinto maiori, coeco et tandem ultimis duobus connatis albo punctatis. Antennae clava fusca apice ferruginea.

447. P. N. G. alis dentatis flavis apice nigris: posticis sub- Bloomfi-
tus fuscis albo vndatis; ocellis quatuor intermediis dia.
coecis.
448. P. N. G. alis angulatis supra fuscis: anticis disco fla- Bankia.
uescente: ocello atro; pupilla gemina.
449. P. N. G. alis angulatis fuscis: anticis ocello sesquial- Solandra
tero, posticis supra duobus, subtus quatuor.

- Polydecta 450. P. N. G. alis dentatis fuscis: anticis ocello, posticis supra duobus, subtus septem.
- Tolumnia 451. P. N. G. alis dentatis atris: posticis subtus strigis ferrugineis coeruleisque, ocellis quinque: postico maiori.
- Morna. 452. P. N. G. alis dentatis dentatis fuscis: posticis ocellis vtrinque duobus punctisque tribus albis.
- Juliana. 453. P. N. G. alis dentatis fuscis albo maculatis: posticis vtrinque ocellis duobus Sp. Inf. App. 503.
- Leda. 454. P. N. G. alis angulatis fuscis: anticis supra ocello geminato, subtus griseo reticulatis, posticis ocellis sex.
Papilio Leda Cram. pap. 25. tab. 292. fig. A.
- Lena. 455. P. N. G. alis subdentatis fuscis: posticis postice atris albo coeruleoque punctatis, subtus biocellatis.
Cram. Inf. 25. tab. 291. fig. A. B. ♂
Alae maris caudatae vti in *P. Philoctete*, forte ad Equites emendandus.
- Dyndi-
mene. 456. P. N. G. alis dentatis fuscis: posticis supra violaceis; punctis quatuor albis.
- Iphita. 457. P. N. G. alis angulato dentatis fuscis obscurius fasciatis: omnibus subtus ocellis quinque.
- Europa. 458. P. N. G. alis angulatis fuscis: posticis subtus fascia ocellari albida.
- Callisto. 459. P. N. G. alis dentatis atris: posticis fascia sanguinea, ocellis supra quinque subtus septem.
- Iris. 460. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus vtrinque fascia albida interrupta ocelloque unico, anticis supra coecis.
Papilio Iris Wien. Verz. 171. 1.
Papilio susppirans Pod. Mus.
Fascia posticae alba, abbreviata, videntata. Ocellus unicus, coerulescens, semiclausus.
- Ilia. 461. P. N. G. alis dentatis coeruleo micantibus vtrinque fascia alba interrupta: omnibus ocello unico.
Papilio Ilia Wien. Verz. 172. 2.
Papilio Iris Esp. Pap. tab. 37. fig. 1.
tab. 43. fig. 1.
Habitat in Germaniae Salice Dom. Sehieser myller.

Differre a P. Iris videtur. Differt ocello distincto in pagina inferiori alae posticae minus distinctis fasciaque haud dentata, nec ocello compresso sed sesqui altero. Variat colore nigro albo fasciato et flavo fusoque vario, semper tamen coeruleo micante. Faeminae magis vnicolores minus micant.

462. P. N. G. alis dentatis fuscis coeruleo micantibus: posticis ocello vnico, subtus brunneis: margine rubente. *Iole*. *P. Norveg. f. s. s. 341.*

Papilio Iole Wien. Verz. 172. 3.

Papilio Iole Esp. Pap. tab. 46. fig. 1. at pagina inferior alarum differt.

Habitat in Austria Dom. Schiefermyller.

Statura et summa affinitas praecedentis. Alae omnes supra fuscae, coeruleo micantes. Maculae duas distinctae albae versus apicem alae anticae et ocellus parvus iride ferruginea versus angulum ani. Subtus omnes basi apiceque rubentes in medio brunneae. Maculae duas magnae nigrae albae innatae versus marginem crassiorem alae anticae.

* *Nymphales phalerati.*

463. P. N. P. alis dentato caudatis: anticis basi rubris apice nigris albo maculatis. *Acheronta*.

464. P. N. P. alis dentato caudatis rufis: striga marginaque postico fuscis. *Troglo-dita*.

465. P. N. P. alis bicaudato dentatis fuluis: strigis nigris, posticis subtus glaucis nigro punctatis. *Thetys*.

466. P. N. P. alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque, subtus luteis albo fasciatis: maculis coerulescentibus. *Populi*.

Papilio Populi Wien. Verz. 172. 1.

Faemina fascia alba maiore distinctiore.

In Russia frequentissimus fascia etiam marum distinctiore.

467. P. N. P. alis dentatis nigris: area communi rufa, posticis subtus fuscis atro maculatis. *Chrysippa*

468. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis: area communi rufa, subtus basi testaceis nigro coeruleo que variis. *Cydippe*.

469. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia strigaque angulari dentatis albis. *Althea*.

Penthesi-lea. 470. P. N. P. alis dentatis atris albo maculatis: area communis rufa, posticis subtus fasciis flavis albaque nigro maculatis.

Berenice. 471. P. N. P. alis dentato caudatis nigris: fascia communis rubra, posticis subtus nigro albo ferrugineo flavo-que variis.

Papilio Berenice Drury Inf. 3. tab. 11. fig. 1. 2.

Papilio Zingha Cram. Inf. 27. tab. 375. fig. B.C.

Habitat in Sierra Leon Africæ-Mus. Dom. Banks.

Antennæ extrorsum crassiores nigrae. Palpi subtus albi apice nigri. Thorax niger apice albo punctatus. Alae omnes nigrae fascia lata rufa, quae in anticis marginem haud attingit. Puncta aliquot nigra in fascia rubra alae anticae. Lunulae aliquot rubrae punctaque alba ad marginem posticum alae posticae. Alae anticae subtus subrufescentes, nigro maculatae, apice fuscae albo striatae. Posticae variegatae basi albidae nigro punctatae.

Semire. 472. P. N. P. alis dentatis subconcoloribus fascia viridi fulvoque maculatis basi fulvis nigro punctatis.

Cyane. 473. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis fascia, posticis disco nigro punctato albis.

Conf. *Papilio Cyane* Cram. Inf. 25. tab. 295. fig. C.D.

Vitellia. 474. P. N. P. alis dentatis nigris subtus albo maculatis.

Papilio Vitellia Cram. Inf. 30. tab. 349. fig. E.F.

Habitat in Amboina.

Magnus. Corpus nigrum antennis extrorsum crassioribus. Alae omnes supra nigrae margine postico fusco, immaculato, subtus nigrae punctis numerosis albis, quibusdam iride coerulea cinctis. Margo albo strigosus.

Zenobia. 475. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia communis alba, posticis subtus basi flavis nigro striatis.

Antiopa. 476. P. N. P. alis angulatis nigris: limbo albido.

Vere protuentientes limbo albo, aestate limbo flavo.

Zingha. 477. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis apice nigris: strigis coeruleis macularique fulua.

Habitat in Sierra Leon Dr. Pflug.

Magnitudo et statura P. Atalantæ. Alae omnes basi fuscae apice nigrae et in hac fascia coerulea, tunc ma-

macularis fulua puncto atro foeta, quae in anticis punctis duobus albis terminatur. Strigae denique duae coeruleae in anticis maculares, in posticis vndatae. Praeterea macula fulua coeruleae innata ad medium marginis crassioris alae anticae subtus omnes fusco cinereoque vndatae fascia fere obsoleta ferruginea punctis ocellaribus.

478. P. N. P. alis dentatis fuluis: limbo nigro albo inaculato. *Protegénia.*

479. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi purpurea anticarum vtrinque posticarum marginali. *Atalanta.*

480. P. N. G. alis dentatis fuscis: fascia communi fulua, *Archesia.* anticarum dimidiato coeruleo. Sp. Inf. App. 524.

481. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia coerulecente. *Charonia.*

482. P. N. P. alis dentatis concoloribus atris: posticis fascia maculari sanguinea.

Papilio Hyperia Cram. Pap. 20. tab. 236. fig. E. F.

483. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia communi fulua, *Grosope.* anticarum punctis duobus nigris.

484. P. N. P. alis dentatis fuscis: omnibus subtus striga *Echo.* punctorum alborum.

485. P. N. P. alis dentatis fuscis: disco angulato fuluo nigro punctato, subtus maculis baseos flavis. *Ottavia.*

486. P. N. P. alis dentatis obscure virescentibus albo nigro rufoque maculatis. *Lubentia.*

487. P. N. P. alis repandis viridi aeneis: anticis punctis nigris, subtus flavescentibus punctis baseos nigris. *Ianassia.*

Habitat in Africa Mus. Dr. Hunter.

Corpus medium fuscum palpis ferrugineis. Alae omnes supra virides nitidae margine obscuriore et praeterea punctis tribus baseos alae anticae. Apex alae terminatur puncto albo. Subtus omnes flavescentes punctis tribus baseos ferrigaeque postica nigris.

Potius forte ad Trojanos emendandus.

488. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: anticis *polychilos.* supra punctis quatuor nigris. *ros.*

Alae posticae subtus nigrantes puncto centrali albo.

- Valbum. 489. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: omnibus supra macula alba, posticis subtus lunula alba.
Papilio valbum Wien. Verz. 176. 7.
Papilio valbum Esp. pap. tab. 62. fig. 3.
 Habitat in Salice Helix Mus. Dom. Romani.
 Nimis affinis praecedenti et forte mera eius varietas.
 Dissert tamen alis magis angulatis macula alba et absque maculis coeruleis marginalibus. Alae subtus variegatae lunula centrali alba.
Larua spinosa lineis longitudinalibus flauis atrisque interruptis, capite nigro.
- Vrticae. 490. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: anticis supra punctis nigris tribus.
- Clytemnestra. 491. P. N. P. alis angulatis nigris subtus albo maculatis: anticis vtrinque fascia flava.
 Cram. Pap. 31. tab. 364. fig. A. B.
- Dirce. 492. P. N. P. alis angulatis fuscis: fascia anticarum flavescente, subtus nigro vndulatis.
 Habitat Cajennae.
- Ergone. 493. P. N. P. alis dentatis fuluis: punctis margineque albo punctato nigris, subtus griseis.
 Margo posticus alae anticae flauus.
- C. album. 494. P. N. P. alis angulatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus C. albo notatis.
- C. aureum 495. P. N. P. alis dentato caudatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus C. aureo notatis.
- Merione. 496. P. N. P. alis angulatis fuluis: margine fusco, posticis subtus fuscis: maculis strigisque albis coeruleisque.
- Ariadne. 497. P. N. P. alis angulatis fuluis: strigis nigris vndulatis, anticis puncto marginali albo.
- Portia. 498. P. N. P. alis dentato caudatis, subtus griseis nigro irroratis.
- Bolina. 499. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis maculis duobus, posticis solitaria albo coeruleis.
- Clytia. 500. P. N. P. alis dentatis nigris: anticis margine exteriori albo maculatis, posticis albo luteoque triplici ordine.

501. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: posticis apice ferrugineis, subtus puncto albo. Sp. Inf. App. 504. *vndularis*

Alae anticae apice cyaneo maculatae.

502. P. N. P. alis dentatis fuscis: posticis brunneis; angulo ani coerulecente: striga nigra. *Monina.*

Habitat in India orientali Doni. Lund.

Statura omnino P. *vndularis* at duplo minor. Alae anticae fuscae maculis aliquot baseos obsoletis ferrugineis. Ad angulum ani litura coerulescens. Posticae basi fuscae, apice brunneae angulo ani late coerulecente striga vndata nigra. Subtus omnes cinereae lunula baseos strigaque postica nigris.

503. P. N. P. alis angulato dentatis supra fuscis albo punctatis: fascia rubra; linea vndata nigra. *Amathea.*

Habitat Cajennae, Surinami.

504. P. N. P. alis dentatis flavis nigro variis apice radialis: posticis punctis septem rubris. *Hypsipyle*

Papilio Rumina Esp. Pap. tab. 15. fig. 1.

tab. 53. fig. 2.

Roef. Inf. 4. tab. 7. fig. 1. 2.

Schaeff. Icon. tab. 120. fig. 1. 2.

Larua flava nigro punctata: spinis carnosis verticellatis rubris, apice nigris.

Puppa pallida, capite obtuso.

505. P. N. P. alis dentatis variegatis: supra anticis punctis sex, posticis quatuor rubris. *Ramina.*

Papilio Rumina australis Esp. Pap. tab. 72. fig. 4.

506. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis punctis septem posticis tribus rubris, subtus anticis punctis tribus argenteis. *Erosine.*

Hespania *Rumina*. S. 1. 26.

Papilio Rumina Drury Inf. 1. tab. 2. fig. 1.

Papilio Salmoneus Cram. Inf. 29. tab. 341. fig. D. E. at bicaudatus.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Minor P. *Rumina*. Alae omnes supra fuscae maculis rubris. Subtus anticae fuscae disco fulvo nigro maculato maculis tribus pupilla alba, posticae fuscae albo maculatae.

507. P. N. P. alis dentatis concoloribus fuluis: punctis numerosis fuscis. *Flegia.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Alae omnes supra fuluae punctis numerosissimis fuscis, subtus concolores at paulo pallidiores.

- Melea- 508. P. N. P. alis subdentatis albo punctatis supra fuscis subtus flavescentibus.

Papilio Meleagris Drury Inf. 3. tab. 27. fig. 3. 4.

- Melantha 509. P. N. P. alis dentatis supra fuscis albo punctatis, subtus brunneis.

- Allica. 510. P. N. P. alis dentatis subconcoloribus obscure fuluis: punctis nigris numerosis albo foetis.

Papilio Fleggus Cram. Inf. 24. tab. 280. fig. E. F.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Parua. Antennae nigrae albo annulatae clava nigra apice fulua. Corpus fuscum. Alae omnes obscure fuluae maculis numerosis nigris puncto albo notatis.

- Leucothoe 511. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: fasciis tribus albis, subtus luteis: fasciis tribus albis nigro notatis.

- Medea. 512. P. N. P. alis dentatis falcatis nigris: fasciis tribus macularibus flavis, angulo ani rubro.

- Melicerta 513. P. N. P. alis dentatis concoloribus atris albo punctatis fasciaque communi alba anticarum interrupta.

Papilio Agatha Cram. Pap. 28. tab. 327. fig. A. B.

Papilio Blandina Cram. Pap. 28. tab. 327. fig. E. F.

- Aceris. 514. P. N. P. alis dentatis albo fasciatis supra nigris subtus fuluis.

Papilio Aceris Esp. pap. tab. 82. fig. 1. Mus. ex India.

tab. 81. fig. 3. 4. minor ex Hungaria.

Habitat in Acere Europaë, Asiae.

Maior a minore vix distinctus.

- Nauplia. 515. P. N. P. alis subdentatis subconcoloribus nigris: antecis supra maculis quatuor, posticis fascia albis Linn. Syst. Nat. 2. 783. 197. Mus. Lond. Vlr. 309.

Clerk. lun. tab. 46. fig. 1. 2.

Cram. Pap. 27. tab. 316. fig. D. E. F. G.

Habitat in America meridionali.

- Heliodore 516. P. N. P. alis dentatis fulvis: fasciis tribus nigris.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium at parvus. Corpus cum antennis nigrum. Alae omnes fuluae fasciis tribus nigris marginem nigrum haud attingentibus, prima in margine alae anticae, secunda communis, tertia in medio alae posticae. Margo niger striga fulua. Subtus pallide fuluae strigis nigris.

517. P. N. P. alis dentatis albis: margine flavo, posticis *Dorcas*. subtus flavis: fasciis duabus albis.
518. P. N. P. alis dentatis fuscis albo maculatis, subtus maculatis ocellaribus numerosis. *Ophionea*.
519. P. N. P. alis dentatis fulvis nigro fasciatis; posticis *Ilithuia*. subtus fasciis albis nigro inaculatis.
- Papilio Polonice* Cram. pap. 82. tab. 375. fig. G. H.
520. P. N. P. alis dentatis nigris coeruleo nebulosis: anticis fascia vtrinque alba, posticis subtus rubro radiatis. *Amphi nome*.
521. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis flavo reticulatis, *Opis*. posticis fasciatis.
522. P. N. P. alis dentatis fuscis: maculis ocellaribus, posticis subtus cinereis: punctis duobus strigaque fuscis. *Crithea*.
523. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis maculis sagittatis *Pelea*. albis nigrisque, subtus cinereis: lunulis nigris.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Medius. Antennae nigrae extrorsum crassiores. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae lunulis aliquot basenos nigris, versus apicem fuscia lata e maculis sagittatis albis nigrisque. Posticae fuscae lunulis nigris et versus marginem interiorem litura alba e fascia alarum antistarum. Subtus omnes cinereae lunulis inprimis posticarum plurimis nigris. Fascia alac anticae e maculis albis obsoletior,

524. P. N. P. alis dentatis atris: fascia alba; antistarum *Nerina*. terminata macula rufa.
525. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia communi arcuata *Venilia*. alba marginibus coerulecente.
- Cram. Pap. 19. tab. 219. fig. B. C.
526. P. N. P. alis dentatis atris: fascia coerulea interrupta, *Alimena*. singulis punctis septem albis marginalibus.
- Cram. Pap. 19. tab. 221. fig. A. B. C.

- Phaerusa 527. P. N. P. alis dentatis fuluis: fasciis tribus fuscis, antecarum longitudinalibus, posticarum transuersis.
- Hippona, 528. P. N. P. alis dentato caudatis flavo nigroque variis: posticis punctis quatuor albis.
Drury Ins. 3. tab. 16. fig. 1. 2.
- Julia, 529. P. N. P. alis dentatis fuluis: anticis strigis duabus, posticis margine postico nigris.
- Agatha, 530. P. N. P. alis dentatis supra fuluis subtus glaucis: posticis puncto nigro supra vnico, subtus tribus.
Habitat in India Dom. Boeber.
Medius, tener. Corpus supra fuscum. Alae anticae supra fuluae apice fuscae, subtus flavescentes glauconitidulae. Posticae supra fuluae puncto paruo nigro, subtus glaucae lunulis tribus baseos albis punctisque tribus paruis nigris.
- Laura, 531. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis: fascia communis dimidiata fulua, posticis subtus argenteis: fascia nivea.
- Lydia, 532. P. N. P. alis dentatis flavis supra margine nigro, subtus striga punctorum nigrorum.
- Iphicla, 533. P. N. P. alis dentatis supra fuscis: fascia communis alba maculaque ferruginea anguli ani.
- Delila, 534. P. N. P. alis dentatis oblongis fuluis: anticis lunula nigra.
- Dido, 535. P. N. P. alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis, posticis fascia maculisque septem transuersis coerulecentibus.
- Neaerea, 536. P. N. P. alis dentatis supra fuscis albo maculatis subtus maculis albis linea rubra cinctis.
- Aceste, 537. P. N. P. alis subdentatis: anticis nigris basi fasciaque flavis, posticis flavis: subtus fasciis fuscis.
- Eurino-
me, 538. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis, posticis basi albis.
- dissimilis, 539. P. N. P. alis dentatis dilatato venosis nigris: maculis albis sagittatis, posticis subtus maculis marginalibus luteis.
- assimilis, 540. P. N. P. alis subrepandis concoloribus nigris: punctis coerulecenti albis, posticis punctis coccineis.

541. P. N. P. alis subrepandis concoloribus: punctis coeruleo-similis, rulescenti albis versus basi lineatis.
542. P. N. P. alis dentatis nigris albo maculatis, posticis affinis. subtus limbo nigro flavo alboque maculato.
543. P. N. P. alis dentatis nigris coeruleo-similis striatis, subfuscis.
544. P. N. P. alis dentatis anticae atris maculis, posticis *Eycalea*. fascis disco albis. *P. Samocles* f. s. s. 121.
545. P. N. P. alis repandis virescenti albis: venis limbo-Hippia. que nigris.

Habitat in Pulicandor Dom. Banks.

Statura omnino praecedentium. Corpus cum antennis nigrum. Alae omnes subconcolores albo virescentes venis in margineque omni nigris. Apex alae anticae punctis albis.

546. P. N. P. alis dentatis fuscis concoloribus: margine Panope. exteriori albo maculato: angulo ani fulvo.

Cram. pap. 25. tab. 295. fig. E. F.

547. P. N. P. alis dentatis supra fuscis subtus ferrugineis Sibilla. nigro maculatis: fascia vtrinque maculari alba.

Wien. Verz. 172. 2.

548. P. N. P. alis dentatis atris coeruleo micantibus fascia Camilla: vtrinque maculari alba, posticis subtus basi argentea immaculata.

Papilio Camilla Wien. Verz. 172. 1.

Papilio Lucilla Esp. pap. tab. 38. fig. 2.

Papilio riularis Scop. Ent. 444.

Habitat in Austria Dom. Schieffernmyller.

Affinis certe P. Sibillae, a quo tamen differt alis supra colore magis atro coeruleo micante et striga punctorum nigrorum apicem. Subtus alae omnes fusco ferrugineoque variae basi argentea, immaculata et pone fasciam albam striga punctorum nigrorum.

Larua viridis spinis rubris.

549. P. N. P. alis dentatis supra fuscis subtus brunneis Lucilla. vtrinque fascia maculari alba.

Papilio Lucilla Wien. Verz. 173. 4.

Papilio Camilla Esp. pap. tab. 59. fig. 1.

Papilio Sapho Pall. Iter. 1. App. nr. 62.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura et summa affinitas praecedentium. Differt tamen alis anticis supra linea alba interrupta a basi ad fasciam ducta, posticis excepta fascia alba immaculatis. Subtus brunneae posticis basi litura tantum alba et pone fasciam striga lunularum albarum.

- Procris.* 550. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: fascia alba, subtus variegatis.

- Micalia.* 551. P. N. P. alis dentatis atris flavo maculatis: posticis medio fuluo nigro maculato.

- Maja.* 552. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis albo maculatis posticis immaculatis.

- Erymanthis.* 553. P. N. P. alis dentatis fuluis: anticis apice nigris; fascia flava, posticis supra lunulis, subtus striga punctorum ocellatorum.

Papilio Erymanthis Drury. Ins. I. tab. 15. fig. 3. 4.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Medius. Alae anticae basi fuluae, tunc fascia lata flava punctis aliquot nigris, apice nigrae maculis aliquot flavis. Posticae fuluae striga punctorum duabusque lunularum nigrarum. Subtus pallidiores flavo vndeatae, anticis punctis aliquot nigris, posticis striga punctorum nigrorum lunula violacea albaque.

- Carinenata.* 554. P. N. P. alis falcato dentatis fuscis flavo maculatis: anticis apice atris; maculis quatuor albis.

Fyesl. Arch. 2. tab. 2. fig. A: B.

- Martha.* 555. P. N. P. alis dentatis fuscō fuluoque variis: anticis lunulis ternatis, posticis fascia albis.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae nigra clava macula baseos alba. Corpus fuscum. Alae anticae fuscō fuluoque maculatae versus marginem posticum lunulis albis triplici serie, quarum interior communis. Posticae fuluae fuscō variae, fascia (interdum striga) in medio alba. Versus marginem posticum striga vndeata nigra albae adnata. Subtus pallidæ albo fasciatae basique lituris nigris.

- Celtis.* 556. P. N. P. alis angulato dentatis fuscis: maculis fuluis vnicaque alba, posticis subtus griseis.

Esp. pap. tab. 87. fig. 2. 3.

Fyesl. Arch. 2. tab. 2. fig. I; 2. 3.

3. tab. 2. fig.

Habi-

Habitat in Celti australi Europae australioris. Mus. Dom. Romani.

Affinis P. Carinenta paullo minor. Alae anticae valde angulatae, concolores maculis quatuor fuluis vnicaque pallidiore. Posticae supra fuscae macula vnicafulua, subtus griseae lineola parna centrali alba.

Larva viridis, nigro maculata lineolisque albis.

Puppa viridis albo lineata.

557. P. N. P. alis angulato dentatis fuluis fusco maculatis: *F. album*. posticis subtus linea nivea.

Papilio F. album Esp. Pap. tab. 87. fig. 1.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura et magnitudo P. Celtie. Alae anticae fuluae maculis in medio tribus magnis nigris. Margo fusca. Posticae fuluae macula magna media lituraque apicis nigris. Subtus fuscae lineola media nivea, quae ad basin incrassata puncto fusco, apice flavescentes.

558. P. N. P. alis falcato dentatis fuscis: fascia communis coerulecente nigro punctata, subtus brunneis: stria fusca.

559. P. N. P. alis dentatis nigris: fascia flava communis nigro punctata. *var. laotiae*. *P. E. S. 316.*

Papilio Petarga Drury Inf. 3. tab. 27. fig. 1. 2.

Variat fascia flava et rosea.

560. P. N. P. alis dentatis fuscis: posticis subtus griseo *Melissa*. marmoratis.

561. P. N. P. alis dentatis albis: limbo fulvo, posticis *Hersilia*. subtus fuluis: fasciis duabus puncto que medio albis.

562. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis fascia fulua, posticis alba.

Papilio Elea Cram. Inf. 21. tab. 242. fig. D. E.

Conf. *Papilio Cocala* Cram. Inf. 21. tab. 242. fig. F. G.

563. P. N. P. alis dentatis fuscis: disco communi cinereo *Amphicefusco* vndato, subtus apice griseis: lunulis nigris. da.

564. P. N. P. alis dentatis fuscis: anticis supra fascia fulua, subtus maculis centralibus coeruleis. *Mesenteria*.

565. P. N. P. alis dentatis luteis: anticis apice nigris; fascia albida, posticis subtus argentatis: ocellis quinque. *Niphe*.

- Lucina.* 566. P. N. P. alis dentatis fuscis testaceo maculatis: subtus fasciis duabus macularum albida rum.
- Cinxia.* 567. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus fasciis tribus albidis nigro maculatis.
Schaeff. Icon. tab. 204. fig. 1. 2.
Larua spinosa, nigricans: spinarum lineis alternis al bis rufisque.
Puppa viridis, nigro maculata.
Conf. *Papilio Triuia* Wien. Verz. 179. 8. in Verbusco vix distincta, quamvis duplo fere minor.
- Phoebe.* 568. P. N. P. alis dentatis nigro fuluoque variis: posticis subtus flavescentibus nigro vndatis basi quadripunctatis, fasciis duabus fuluis: posteriori maculari.
Papilio Phoebe Wien. Verz. 179. 1.
Papilio Cinxia Esp. Pap. tab. 25. fig. 2.
Papilio Corythallia Esp. Pap. tab. 61. fig. 4. 5. mal.
Habitat in Europae Centaurea Scabiosa. Mus. Dom. Schieffermyller.
Affinis praecedenti at paullo maior. Antennae albo nigroque annulatae clava ferruginea annulo fusco. Alae supra nigricantes maculis numerosis, mox pluribus mox paucioribus nigris. Margo albo macularibus. Subtus anticae fuluae nigro maculatae, apice flauae nigre vndulatae. Posticae basi flanae punctis quatuor nigris, tunc fascia fulua in medio bifida, nigro marginata, tunc flauae, nigro vndatae, denuin fascia fulua e punctis septem distinctis et denique flauae nigro vndatae.
Puppa brunnea albo maculata.
- didyma.* 569. P. N. P. alis dentatis fuluis (cinereis) nigro maculatis: posticis subtus flavis nigro punctatis; fasciis duabus fuluis continuis.
Papilio didyma Esp. pap. tab. 41.
tab. 61. fig. 1.
Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.
Magnitudo P. Phoebe. Abdominis latera nigro punctata. Fascia antica alae posticae subdidyma.
- Fascelis.* 570. P. N. P. alis dentatis fusco fuluoque variis: posticis subtus albis nigro punctatis: fasciis duabus fuluis: posteriore lunulata.
Papilio Fascelis Esp. Pap. tab. 88. fig. 3. 4. mal.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Nimis praecedenti affinis. Differt tamen alis supra obscurioribus, magis fuscis fasciaque posteriore alae posticae e lunulis fuluis conflata, quae tamen in faemina distinctiores.

571. P. N. P. alis repandis fuluis nigro punctatis: posticis *Athulia*
subtus albis nigro punctatis fasciisque duabus fuluis.

Papilio Phaebe Esp. Pap. tab. 88. fig. 5. 6.

Habitat in Russia boreali Dom. Boeber.

Minutus in hac familia. Alae supra omnes fuluae punctis numerosissimis nigris. Subtus anticae fuluae nigro maculatae apice albae nigro punctatae. Posticae albae strigis plurimis punctorum nigrorum fasciisque duabus fuluis, anteriore abbreviata e maculis tribus.

572. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro punctatis: posticis *Hylla*.
basi supra fuscis subtus albidis.

573. P. N. P. alis dentatis nigris fuluo maculatis: posticis *Dityna*
subtus fuluis; maculis baseos fascia media maculari lunulisque apicis flauis.

Papilio Dityna Esp. Pap. tab. 48. fig. 2.

Papilio Athulia minor Esp. Pap. tab. 89. fig. 1. 2.

Habitat in Russia Dom. Boeber.

Reliquis obscurior maculis minoribus fuluis. Posticae subtus maculis minoribus fuluis. Posticae subtus maculis quinque baseos flauis, fascia in medio lata maculari flava nigro marginata et lunulis flauis versus apicem.

574. P. N. P. alis dentatis nigris fuluo flavoque fasciat, *Cynthia*, v.
posticis subtus fuluis flavo fasciat.

Papilio Cynthia Wien. Verz. 179. 3.

Papilio Cynthia Esp. pap. tab. 37. fig. 3.

Naturforsch. 12. tab. 2. fig. 1-4.

Habitat in Austriae Populo Mus. Dom. Schieffermyller.

Maior P. Cinxia. Alae anticae supra fuscae fasciis plurimis nigris, subtus pallide fuluae vndis aliquot nigris. Posticae nigrae rarius fuluo maculatae, pone medium fascia e maculis sex fuluis, quarum quatuor aut quinque puncto nigro notatae, subtus fuluae fascia baseos interrupta media nervis diuisa, apicis macularis. Inter has ultimas fascias striga e punctis quinque distinctis.

Mas supra obscurior maculisque albis notatus.

Larua spinosa atra: lineis duabus dorsalibus flauis, capite coerulecente.

Puppa pallida nigro flauoque maculata.

Maturna. 575. P. N. P. alis dentatis fuluo nigroque variis; posticis subtus fasciis flauis: strigis vndatis nigris, basi im- punctatis. *Epp. T. 16. f. 2. mas. 61. f. 3. juv.*

Habitat in Europae Plantagine.

Larua spinosa nigra albo punctata: spinis flauescen- tibus.

Puppa virescens nigro maculata.

Delia. 576. P. N. P. alis dentatis fuluo nigroque variis: posticis supra punctis quatuor ocellaribus, subtus albis: fa- sciis duabus fuluis; posteriore nigro punctata.

Glossia var. *Epp. 579.* *Papilio Delia* Wien. Verz. 179. 6. *Pilosella. Epp. 47. 3.*
Roef. Inf. 4. tab. 13. fig. 4. 5. Laru. Pupp.
tab. 18. fig. 4. Imago.

Habitat in Germaniae australioris Plantagine Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae supra fuluo nigroque variae margine ciliis albidis.

In posticis ante marginem puncta 3-4 nigra annulo fuluo cincta. Subtus anticae fuluae, apice flauae, ni- gro punctatae. Posticae basi flauae punctis quatuor nigris, tunc fascia fulua interne bifida, nigro mar- ginata, tunc fascia alba nigro punctata, demum fa- scia fulua nigro marginata punctataque. Margo fla- uus, nigro punctatus.

Larua spinosa atra: lateribus albo punctatis.

Puppa liuida fuluo punctata.

Arduin- na. 577. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis; posticis subtus albis; fasciis duabus fuluis; posteriore nigro punctata.

Papilio Arduinna Esp. Pap. tab. 87. fig. 4.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Affinis P. Deliae at alae supra fuluae inaculis rarioribus nigris. Punctaque alae posticae simplicia. Margo alae niger ciliis albis.

Hecate. 578. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: omnibus apice strigis duabus punctorum nigrorum.

Papilio Hecate Wien. Verz. 179. 4. *Epp. 1. 76. 3. a. 6.*

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae omnes supra fuluae nigro maculatae et ante marginem strigae doae punctorum nigrorum. Margo ipse niger lineolis fuluis ciliisque albis. Subtus anticae fuluae nigro vndatae strigis iisdem. Posticæ basi flauae fascia fulua nigro marginata, tunc fuluo flauoque variegatae strigis duabus punctorum nigrorum distinctorum.

579. P. N. P. alis dentatis fulvis nigro variis: posticis utrinque striga punctorum nigrorum.

Papilio Artemis Wien. Verz. 322. 10.

Habitat in Austriae montosis Mus. Dom. Schieffermyller. *Artemis.*

Alae supra fuluae nigro vndatae. Ante marginem posticum alae posticae striga e punctis septem nigris distinctis. Subtus pallidiores. Posticae fuluae fasciis duabus flauis anteriore extrorsum bifida. Ante marginem striga e punctis septem nigris. Margo flauus.

580. P. N. P. alis dentatis fulvis: maculis strigaque punctata nigris, posticis subtus variegatis: basi puncto apice striga punctorum. *Amathusia.*

Papilio Amathusia Esp. Pap. tab. 88. fig. 1. 2.

Habitat in Ruliâ Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Distinctus striga punctorum distinctorum in omni ala. Subtus posticae flauo fuluo fuscoque variegatae. Punctum distinctum nigrum, subocellatum ad basin et striga e punctis sex subtus ocellaribus versus apicem.

581. P. N. P. alis fulvis nigro maculatis: posticis subtus purpureis basi flavo argenteoque maculatis fasciaque media argentea obsoleta. *Epp. T. 16. 4.* *Dia.*

Habitat in Europæ Viola.

Alae posticae subtus versus apicem striga e punctis sex atris: intermediis duobus subpupillatis.

582. P. N. P. alis dentatis fuscis rufo maculatis apice fulvis: subtus maculis rufis albo cinctis. *Dryope.*

583. P. N. P. alis denticulatis variegatis subtus reticulatis: anticis supra maculis aliquot albis. *Leuana.*

Schæff. Icon. tab. 217. fig. 3. 4.

584. P. N. P. alis dentatis fuscis: fascia utrinque alba antecarum interrupta, subtus albo reticulatis. *Proteria.*

Schæff. Icon. tab. 132. fig. 1. 2.

- Paphia.* 585. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus fasciis argenteis.
Varietas cinerea nigro maculata. Esp. Pap. tab. 60. fig. 4. in Russia meridionali et Sibiria frequens.
- Cynara.* 586. P. N. P. alis dentatis viridibus nigro maculatis: posticis subtus viridibus; maculis tribus fasciisque duabus argenteis.
Papilio Pandera Wien. Verz. 176. 1.
Esp. Pap. tab. 58. fig. 1. 2. 3.
Puncta interdum quinque argentea inter fascias.
- Cethoferia* f. 5. 440. *Laodicea.* 587. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice fuscis glauco nitentibus: fascia argentea interrupta terminante.
Papilio Laodice Pall. Iter. 1. App. n. 61.
Papilio Laodice Schneid. Pap. Europ. tab. 1. fig. 1. 2.
Habitat in Borussia, Muscovia Dom. Boeber.
Statura et magnitudo fere P. Paphiae. Punctum album versus apicom alae anticae. Subtus anticae flavescentes nigro maculatae strigaque e punctis argenteis obsoletis. Posticae basi flavescentes striga sesqui altera brunnea, in medio striga interrupta, inaequalis argentea et pone hunc alae fuscae argenteo nitidulae strigis duabus e punctis obscurioribus.
- Cytherea.* 588. P. N. P. alis crenatis flavis: fascia communi argentea, subtus fascia argentea lanceolata.
Papilio Cytherea Cram. Ins. 32. tab. 376. fig. C.D.
- Aglaja.* 589. P. H. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 21 argenteis.
- Aphrodite.* 590. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus fuscis: maculis 24 argenteis.
Habitat in America meridionali Dom. Boeber.
Medius. Antennae ferrugineae clava nigra apice ferruginea. Alae supra fuluae, nigro maculatae. Subtus anticae fuluae nigro maculatae punctisque quatuor apicis argenteis. Posticae fuscae fascia apicis flavescente maculisque 24 argenteis.
- Myrina.* 591. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 30 argenteis.
- Cybele.* 592. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 34 argenteis.

593. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Idalia*.
maculis 37 argenteis, posticis supra coeruleis albo
punctatis.
594. P. N. P. alis dentatis fuscis: disco communi nigro, *Diana*.
posticis subtus 9 argenteis.
595. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Adippe*.
maculis 28 argenteis.
- Fyesl. Arch. Ins. monogr. cum fig.
Habitat in Europae *Viola odorata* et tricolor.
Variat rarius punctis argenteis in flava transcurrentibus.
Puncta ocellaria vero constantia.
Larua cinerea vel fusca: spinis numerosis rufis, linea-
que dorsali nigra albæ innata.
Puppa fusca punctis argenteis.
596. P. N. P. alis dentatis luteis nigro maculatis: subtus *Lathonia*.
maculis 37 argenteis.
597. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Euphyra-*
maculis 9 argenteis.
Syne.
Punctum nigrum distinctum subtus ad basin alae po-
sticæ.
Larua spinosa nigra macularum pari dorsalium auran-
tiarum in singulo segmento.
598. P. N. P. alis subintegris fuluis basi maculisque nigris, *Pales*.
posticis subtus brunneis flavo argenteoque variis.
Papilio Pales Wien. Verz. 177. 8.
Papilio Arsilache Esp. Pap. tab. 56. fig. 4. 5.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Magnitudo et affinitas P. Dia. Alae supra omnes ful-
uae at basi maculisque plurimis nigris. Subtus an-
ticeae fuluae lunulis punctisque aliquot nigris macu-
lisque duabus flavis apicis. Posticæ basi maculis ar-
genteis, tunc brunneae puncto paruo argenteo, tunc
fascia magna, sinuata, obsolete flava, et in hac ma-
culæ duæ argenteæ, altera in medio altera ad mar-
ginem exteriorem, deum brunneæ maculis aliquot
fere obsoletis argenteis et denique margo flavo va-
rius punctis sex vel septem argenteis.
599. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus *Niobe*.
maculis pallidis punctisque quatuor argenteis ocellatis.
Habitat in Europæ *Viola tricolor*.

Variat

Variat interdum maculis argenteis loco pallidarum.

Affinis P. Adippe at minor magisque coloratus.

Larua spinolissima fusca maculis flavis lineata spinis-que albidis.

Bellona.

600. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice argenteis; maculis ocellaribus fuluis sex.

Thais.

601. P. N. P. alis dentatis fuluis: margine nigro strigoso, subtus glaucis: posticis fascia argentea punctisque ocellaribus.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Statura omnino P. Phalanta. Corpus fuscum. Alae omnes fuluae purpureo colore nitentes margine nigro strigoso punctisque ante marginem nigris. Subtus omnes glaucae posticis fascia media argentea postice obliterata. Pone fasciam striga punctorum ocellatorum.

Daphne.

602. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus flavis rufo venosis apice ferrugineo argentatis.

Papilio Daphne Wien. Verz. 177. 10.

Habitat in Rubo Idaeo Austriae Dom. Schiefermyller.

Affinis videtur P. Bellona: Alae omnes vti et anticae subtus fuluae nigro maculatae. Posticae subtus basi flauac ferrugineo fere reticulatae, apice brunneae argento nitidae punctis aliquot ocellaribus fuscis.

Larua spinosa fusca albido lineata: spinis flavis.

Puppa virescens subtus multi dentata. *an Chionis* Epp. 4

Conf. *Papilio Distynna* Wien. Verz. 179. vix differt.

Phalanta

603. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus apice glaucis: punctis ocellaribus fuluis tribus.

Papilio Columbina Cram. Ins. 29. tab. 337. fig. D. E.

Vanillae.

604. P. N. P. alis dentatis fuluis nigro maculatis: subtus maculis 30 argenteis.

Iuno.

605. P. N. P. alis angulato dentatis oblongis fuluis: limbo atro, posticis subtus atris: maculis fuluis argenteisque.

* *Plebeii Rurales.*

Cupido.

606. P. P. R. alis posticis sexdentato caudatis: subtus albidis; maculis argenteis.

Gnidus.

607. P. P. R. alis sexdentato caudatis albo limbo atro, posticis subtus maculis argenteis. Sp. Ins. App. 504.

608. P.

608. P.P.R. alis tricaudatis: anticis nigris, posticis coeruleis, subtus cinereis: strigis duabus brunneis ocellisque duobus anguli ani. *Helius.*

Papilio Euritus Cram. Ins. 19. tab. 224. fig. D. E.

609. P.P.R. alis tricaudatis coeruleis: limbo atro, subtus viridibus. *Ianias.*

610. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus disco variegato strigaque postica aurea. *Anior.*

611. P.P.R. alis tricaudatis fuscis basi virescentibus, subtus albis: posticis fascia abbreviata sanguinea. *Timon.*

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Statura praecedentium. Alae anticae supra fuscae basi virescentes, subtus albae apice obscuriores. Posticae virescentes apice obscurae albo maculatae. Caudae tres exteriori parua, obtusa, nigra albo ciliata, intermedia longiori alba, ante apicem nigra, interiori longissima alba. Subtus albae ad angulum ani striga abbreviata fusca fasciaque sanguinea maculis duabus atris.

612. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus niueis nigro *Moncus.* subfasciatis: posticis ocellis duobus auratis.

613. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus albis strigis duabus fuluis. *Faunus.*

614. P.P.R. alis tricaudatis coerulecentibus apice nigris: subtus aureis; atomis nigris. *N. Venus.* var. 5. 37.

615. P.P.R. alis tricaudatis: anticis fuscis; macula fulua, posticis subtus albis nigro maculatis. *Lisias.*

Habitat in Pulicandor Mus. Dom. Banks.

Palpi porrecti, compressi basi albi apice nigri. Corpus fuscum. Alae anticae supra fuscae macula magna fulua, subtus flavescentes strigis fuluis, postica fusca. Posticae fuscae, interdum coeruleo nitidae, semper margine postico coeruleo maculatae. Caudae tres nigrae albo marginatae: media maiori. Subtus albae maculis plurimis magnis nigris sparsis.

616. P.P.R. alis tricaudatis fuscis: subtus albo maculatis, *Hymen.* posticis supra albis.

617. P.P.R. alis subtricaudatis coeruleis nitidissimis: posticis subtus fuscis ante apicem albo fasciatis. *Gabriell.*

- Pelion. 618. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis auro punctatis: limbo fusco.
- Aunus. 619. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis: limbo atro subtus nigris albo fasciatis.
- Etolus. 620. P. P. R. alis bicaudatis: anticis nigris, posticis coerulentibus, subtus albidis: puncto baseos duobusque apicis atris.
- Habitat in Indiis.
- Statura praecedentium. Alae anticae nigrae margine interiori parum coerulecente. Posticae coerulentes, nitidae puncto apicis nigro. Caudae duae elongatae albae. Subtus anticae fusco testaceae strigis duabus obscurioribus. Posticae albidae puncto baseos distincto atro. Ante apicem strigae duae, interruptae, obscurae et in apice puncta duo magna atra. Caudae albae linea media atra. Pedes albo nigroque annulati.
- Getus. 621. P. P. R. alis subtricaudatis coeruleis: limbo atro, subtus fuscis basi rufis albo punctatis.
- Papilio Pelops* Cram. pap. 29. tab. 341. fig. A.
- Habitat Surinami.
- Magnus in hac familia. Antennae nigrae clava alba. Alae omnes subtus basi rufae albo punctatae.
- Vulcanus 622. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis fulvo maculatis, subtus strigis flavis fulvis argenteisque variegatis.
- Ganymedes. 623. P. P. R. alis bicaudatis coerulentibus: limbo fusco, subtus basi virescentibus: punctis aureis.
- Mars. 624. P. P. R. alis bicaudatis fuscis: posticis macula rufa, subtus punctis duobus fasciaque obliqua albis.
- Celerio. 625. P. P. R. alis bicaudatis albis: subtus fasciis fuscis alisque alternis, angulo ani ocello triplici rufo.
- Ema-
thon. 626. P. P. R. alis bicaudatis coeruleo nitidis: subtus atris coeruleo irroratis.
- Didy-
naon. 627. P. P. R. alis bicaudatis fuscis: subtus basi rubris; punctis ocellaribus albis.
- Pholeus. 628. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: subtus atris viridi coeruleoque fasciatis.

629. P. P. R. alis bicaudatis subtus viridibus auro rufoqué *Endymion.*
irroratis; posticis striga atra fasciaque sanguinea.
630. P. P. R. alis bicandatis: subtus anticus viridibus auro *Venus.*
irroratis, posticis aureis viridi atroque maculatis.
631. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis subtus pallescenti-*Echion.*
bus: fascia rufa ocelloque terminali rubro.
632. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis nitidis: posticis sub-*Telemus.*
tus striga marginali angulata atra.
633. P. P. R. alis bicaudatis supra fuscis immaculatis: po-*Hemon.*
sticis subtus angulo ani fasciis tribus coeruleis.
634. P. P. R. alis bicandatis coerulescentibus subtus cine-*Sphinx.*
reis: angulo ani macula gemina atra.
635. P. P. R. alis bicaudatis supra coeruleis subtus coeru-*Marsyas.*
lescentibus: punctis atris.
Cram. Inf. 28. tab. 332. fig. A. B.
635. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: ocello atro, subtus *Bathis.*
fuscis albo fasciatis: angulo ani rufo.
636. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis nitidis: subtus disco *Cyanus.*
albo.
637. P. P. R. alis bicaudatis coeruleo nitidis: posticis sub-*Hyacinthus.*
tus medio atro; fascia alba.
638. P. P. R. alis bicaudatis coeruleis: margine nigro, po-*Halesius.*
sticis vtrinque auro maculatis.
639. P. P. R. alis bicaudatis fuscis subtus flauescentibus san-*Formosus*
guineo auroque maculatis.
640. P. P. R. alis bicaudatis albis: limbo fuscō, anticus *Meton.*
macula ocellari aurea.
641. P. P. R. alis bicaudatis albis apice nigris: subtus fu-*Liger.*
scis; strigis lunulisque albis Sp. Inf. App. 504.
642. P. P. R. alis dentatis subbicaudatis nigricantibus: ma-*Thero.*
culis fulvis, subtus maculis argenteis.
643. P. P. R. alis caudatis fulvis nigro maculatis, subtus *Harpax.*
cinereis: punctis aureis.
644. P. P. R. alis caudatis fuscis: subtus flauescentibus: *Valens.*
maculis rubris auro foctis.
Papilio Croesus Sp. Inf. 2. 117. 522.

- Perion.* 645. P. P. R. alis caudatis fuluis: supra limbo fasciisque fuscis subtus auro punctatis.
Papilio Perion Cram. Ins. 32. tab. 379. fig. B.C.
 Habitat Surinami.
 Statura omnino praecedentium. Cauda elongata nigra terminatur puncto albo. Antennae nigrae.
- Centaurus.* 646. P. P. R. alis caudatis coerulescentibus: limbo fusco subtus cinereis: maculis bascos ocellaribus.
- Gerontes.* 647. P. P. R. alis caudatis nigris: macula communi transuersa alba, anticis ocello posticis geminato.
- Iarbus.* 648. P. P. R. alis caudatis fuluis: limbo fusco, subtus cinereis: striga alba, posticis punctis duobus atris.
 Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.
 Magnitudo P. Pruni. Antennae nigrae albo annulatae clava nigra apice fulua. Corpus fuscum. Alae omnes fuluae anticis margine antico posticoque late fuscis, posticis margine postico tenuissime fusco. Cauda tenuis nigra apice alba. Subtus omnes cinereae striga vndata alba posticis apice punctis duobus atris exteriori puncto fuluo.
- Betulae.* 649. P. P. R. alis subcaudatis fuscis subtus luteis, posticis strigis duabus albis.
- Pruni* 650. P. P. R. alis caudatis supra fuscis: posticis subtus fascia marginali fulua nigro punctata.
Puppa dorsum dentatum.
- Spini.* 651. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cinereis: lunulis marginalibus fuluis maculaque anuli coerulescente.
Papilio Spini Wien. Verz. 186. 5. *Eryceus* Ep. 39. 3
 Habitat in Germaniae Pruno spinosa Dom. Schieffermyller.
 Nimis affinis P. Pruni. Alae supra omnes fuscae posticis apice maculis aliquot rufis. Cauda apice alba. Subtus cinereae strigae alba ad angulum ani parum angulata. Versus marginem posticum lunulae aliquot fuluae nigro notatae, et ad angulum ani macula magna coerulescens puncto terminali atro.
Larua viridis: lineis dorsalibus macularibus flavis, capite nigro. Adultior rufescens evadit.
Puppa supra fusca subtus cinereo yillosa.

652. P. P. R. alis subcaudatis coerulecentibus: subtus ci- *Quercus.*
nereis; striga alba puncto que ani gemino fuluo.

653. P. P. R. alis caudatis fuscis immaculatis: posticis sub- *Linceus.*
tus striga lunulata alba rufaque.

Papilio Linceus Esp. Pap. tab. 37 fig. 1-6.

Habitat in Russiae borealioris sylvaticis Dom. Boeber.

Statura et summa affinitas P. Spini. Alae omnes supra
fuscæ maris immaculatae, maris macula disci fulua.
Cauda alae posticae parua, obtusa. Subtus alae anti-
cae fuscae striga abbreviata e lunulis quinque albi-
dis. Posticae fuscae nitidulae striga e lunulis pluri-
mis albis et pone has lunulae aliquot rubrae.

654. P. P. R. alis caudatis fuscis immaculatis subtus striga *Cerasi.*
alba, posticis lunulis fuluis, puncto nigro notatis.

Habitat in Austriae Ceraso.

Statura omnino et summa affinitas P. Pruni. Alae omnes
supra fuscae, immaculatae. Subtus anticae fuscae
striga vnicæ alba, posticae fuscae striga alba et ad
angulum ani lunulae duæ vel tres fuluae puncto
atro. Cauda apice alba.

655. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cineraceous: *Acaciae.*
striga alba lunulisque analibus fuluis.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Praecedentibus paullo minor. Alae anticae supra fuscae,
immaculatae, subtus cinerascentes striga alba. Po-
sticae supra fuscae maculis duabus marginalibus ful-
uis. Subtus cinerascentes striga alba lunulisque ana-
libus fuluis puncto uno alteroue atro.

656. P. P. R. alis subcaudatis fuscis: macula disci alba, an- *Symethus*
ticis apice atris.

657. P. P. R. alis caudatis coerulecentibus subtus cinereis *Boeticus.*
albo vndatis: angulo ani ocello gemino aurato.

658. P. P. R. alis caudatis coeruleis: posticis subtus fuscis *Apidanus.*
coeruleo variis: angulo ani macula gemina aurata.

659. P. P. R. alis caudatis fuscis disco coerulecentibus sub- *Strephon*
tus cinereis: fascia alba angulo que ani ocello gemit-
no rufo.

660. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus cinereis: anticis *Cleon.*
striga, posticis fascia sanguineis, angulo ani ocello
gemino rufo.

- Alcides. 661. P. P. R. alis caudatis nigris coeruleo nitidis subtus ferrugineis: striga flauescente.
- Atymnus. 662. P. P. R. alis caudatis fuluis: anticis apice nigris.
Papilio Atymnus Cram. Inf. 28. tab. 33. fig. D. E.
 Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.
 Medius. Alae omnes supra fuluae, anticae apice nigrae, posticae valde caudatae cauda apice alba. Subtus pallidiores, immaculatae.
- Eryx. 663. P. P. R. alis caudatis nigris subtus viridibus: posticis margine subdentato maculatoque.
- Aeolus. 664. P. P. R. alis caudatis cyaneis: anticis macula nigra, omnibus subtus fascia alba nigro striata.
- Acmon. 665. P. P. R. alis caudatis coeruleis: posticis subtus atris, apice strigis viridi aureis.
- Amyntas. 666. P. P. R. alis caudatis cyaneis: margine nigro, subtus cinereis: punctis nigris posticisque duobus ferrugineis anguli ani.
Papilio Amyntas Wien. Verz. 185. 18.
Papilio Tirefias Esp. pap. tab. 49. fig. 2. 34. 1. 8.
 Habitat in Austria Dom. Schieffernmyller.
- Paruus. Alae omnes cyaneae, nitidae margine nigro ciliis albis. Anticae lunula nigra, posticae cauda parua alba. Subtus omnes cinereae, anticis lunula media strigaque postica punctorum nigrorum. Margo punctis obsoletioribus. Posticae punctis duobus baseos strigaque valde vndata punctorum. Praeterea margo strigis duabus punctorum obsoletiorum, inter quas maculae duae fuluae superne inferneque puncto atro.
- Timeus. 667. P. P. R. alis caudatis fuluo fuscoque variis: anticis subtus punctis ocellaribus atris.
- Simaethis 668. P. P. R. alis caudatis fuscis subtus viridibus: striga argentea.
 Habitat in Americae Insulis.
 Striga in aliis posticis dentata.
- Sedi. 669. P. P. R. alis caudatis coeruleis: margine albo maculato, subtus albis: maculis quadratis nigris fascia que rufa.

670. P. P. R. alis subcaudatis supra fuscis subtus viridibus. *Rubi.* ✓
Papilio Rubi Wien. Verz. 186. I.
 Habitat in Cytiso.
Sexus alter striga punctorum alborum in pagina inferiori alae posticæ.
Larua viridis flavo variegata, capite nigro. *H. Mars. var. f. s. q.*
671. P. P. R. alis caudatis? fuscis subtus striga obliqua nivula, posticis fascia submarginali rufa. *Ixion.*
672. P. P. R. alis caudatis albis supra limbo punctisque disci nigris, subtus nigro punctatis; angulo ani punctis tribus aureis. *Rosimon.*
673. P. P. R. alis caudatis albis apice fuscis subtus albo *Linus.* atroque fasciatis; angulo ani punctis tribus albis.
674. P. P. R. alis dentato caudatis atris: basi macula fulua *Amyntor* apice fascia flava.
675. P. P. R. alis dentatis fuscis: disco coerulescente, subtus fasciis maculisque sanguineis argenteo marginatis. *Narcissus*
676. P. P. R. alis dentatis fuluis: limbo fusco, posticis *Apelles.* subtus fasciis rufis argenteo marginatis.
677. P. P. R. alis denticulatis subcaudatis fuluis nigro maculatis: posticis subtus striatis aureoque maculatis. *Thysbe.*
678. P. P. R. alis dentato subcaudatis basi argenteis aureo *Nais.* striatis.
679. P. P. R. alis dentatis coeruleis: limbo nigro, subtus *Meleager.* canis: punctis ocellaribus nigris.
Papilio Meleager Esp. pap. tab. 45. fig. 2. ♀
 tab. 62. fig. 1. ♂
Papilio Endymion Wien. Verz. 182. I. ♀
Papilio Daphnis Wien. Verz. 182. 2. ♂
 Habitat in Germania Mus. Dom. Romani.
 Statura omnino P. Arion. Mas alis minus dentatis coeruleis margine tenuissime nigro, faemina alis magis dentatis obscurioribus limbo nigro lunulis albis puncto nigro.
680. P. P. R. alis integerrimis fuscis fuluo maculatis subtus variegatis. *Egulus.*
681. P. P. R. alis ecaudatis supra fuscis: disco coerulco; *Arion.* maculis atris, subtus canis: punctis ocellaribus.
 Faemina punctis maioribus.

Erebus.

682. P. P. R. alis integerrimis fuscis: omnibus subtus stri-
ga punctorum ocellatorum.

Papilio Erebus Knoch Beytr. 2. tab. 6. fig. 6. 7.

Habitat in Germania Dom. Boeber.

Magnus. Antennae albo nigroque annulatae clava ni-
gra. Alae supra fuscae, immaculatae, subtus fuscae
striga flexuosa e punctis septem atris subocellatis.

Alcon.

683. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: margine fusco,
subtus fusco cinereis: punctis numerosis ocellaribus.

Papilio Alcon Wien. Verz. 182. 4.

Papilio Arcas Esp. pap. tab. 34. fig. 4. 5.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura P. Arion. Mas alis omnino coeruleis margine
tantum nigrante ciliisque albis. Faemina obscurior
punctis obsoletis obscurioribus. Subtus omnes fusca
cinereae punctis atris numerosis annulo pallido cinctis,

Damon.

684. P. P. R. alis integerrimis coeruleis subtus fusco cine-
reis: punctis numerosis, posticis vitta alba.

Papilio Damon Wien. Verz. 182. 6.

Papilio Bilon Esp. pap. tab. 33. fig. 5.

Habitat in Hedyasaro Onobrychis Austriae Dom. Schieff-
ermüller.

Statura praecedentis. Alae supra coeruleae nitidae.
Anticae lunula media margineque fuscis, posticae
margine radiato fusco. (Faemina alis supra totis
fuscis.) Subtus omnes fusco cinereae lunula media
punctisque 5-6 approximatis atris annulo albo cinctis.
Posticae punctis septem ocellaribus minoribus
et praeterea vitta lata albida, quae tamen marginem
posticum haud attingit.

Larua obscure viridis: linea laterali obscuriore, ca-
pite nigro.

Cyllarus. 685. P. P. R. alis integris coeruleis: margine nigro, subtus
fusco cinereis: striga punctorum ocellorum, posti-
cis basi coeruleis.

Papilio Damoetas Wien. Verz. 183. 7.

Papilio Alexis Pod. Mus. Graec.

Papilio Cyllarus Esp. pap. tab. 33. fig. 1. 2.

Roeßl. Inf. 5. tab. 37. fig. 4. 5.

Papilio alis rotundatis coeruleis subtus ocellorum fa-
scia solitaria Geoff. Inf. 2. 63. 31.

Habi-

Habitat in Astragali, Meliloti floribus Dom. Schiefermyller.

Statura praecedentium. Alae coeruleae, nitidae margine postico fusco. Faemina alis fuscis coeruleo minoribus. Subtus omnes cinereae striga incurva punctorum nigrorum ocellatorum punctis alae anticae ad marginem interioremaioribus. Basis alae posticae coerulescens, nitida.

Larua pallida: stria dorsali rufa lineis lateralibus obliquis viridiibus, capite nigro.

Puppa fusca nigro maculata.

686. P. P. R. alis ecaudatis supra coeruleis margine nigris *Argiolus.* ✓
subtus fuscocinereis: striga punctorum ocellatorum.

Affinis certe *P. Cyllaro*, at basis alae posticae subtus concolor.

687. P. P. R. alis integris coeruleis subtus lacte canis: punctis oblongis nigris simplicibus. *Acis.* ✓

Papilio Acis Wien Verz. 182. 5.

Papilio Cleobis Esp. pap. tab. 40. fig. 3.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Mas alis coeruleis striga tantum marginali atra. Faemina disco tantum coeruleo lunula nigra. Subtus argenteo cinereae, anticis striga punctorum oblongorum nigrorum absque annulo, posticis punctis sparsis rotundioribus, simplicibus.

Simillimum at caudatum in Russia australiori inuenit Dom. Boeber.

688. P. P. R. alis integerrimis fuscis immaculatis subtus cinereis: striga punctorum ocellatorum. *Alfus.* ✓

Papilio Alfus Wien. Verz. 184. 9.

Papilio minimus Esp. pap. tab. 34. fig. 3.

Schaeff. Icon. 2. tab. 165. fig. 1. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus minor. Alae omnes supra fuscae nitidiae, subtus cinereae, anticis lunula media strigaque e punctis 7 nigris annulo albo cinctis, posticis punctis octo aut nouem.

689. P. P. R. alis integerrimis fuscis basi coeruleis subtus cinereis: anticis puncto medio strigaque posticis punctis numerosis ocellatis. *Otis.*

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura parua omnino P. Alfi. Antennae albo nigroque annulatae. Alae supra fuscae basi coeruleae nitidae. Subtus cinereae, anticis puncto medio ocellato strigaque postica e punctis ocellatis. Posticae punctis plurimis itidem ocellatis.

Argus.

690. P. P. R. alis ecaudatis: posticis subtus limbo ferrugineo ocellisque coeruleo argenteis.

Papilio Argus Wien. Verz. 184. 14.

Papilio Aegon Wien. Verz. 184. 15. vix differt, quamvis minor.

Habitat in Europae Genista Germanica.

Larua viridis: linea dorsali fusca, capite pedibusque antieis nigris.

Optilete.

691. P. P. R. alis integerrimis coerulescentibus, margine nigricante, posticis subtus cinereis: punctis ocellariibus atris lunulisque duabus fuluis.

Papilio Optilete Esp. pap. tab. 79. fig. 4. 5.

Knoch Beytr. I. tab. 5. fig. 5. 6.

Habitat in Russia boreali Dom. Boeber.

Affinis *P. Argo*. Alae supra immaculatae margine tenuissime nigro. Subtus anticae cinereae puncto medio strigaque postica punctorum ocellatorum, posticae punctis duobus baseos, uno in medio strigaque postica punctorum ocellatorum. Strigae praeterea duas marginales punctorum nigrorum et inter has lunulae duas fuluae.

Triton.

692. P. P. R. alis integerrimis coerulescentibus: subtus striga ferruginea punctisque numerosis nigris.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Medius. Alae omnes supra coerulescentes striga tenui marginali nigra. Subtus omnes cinereac. Anticae puncto medio plurimisque apicis vix ocellatis, nigris, ante apicem striga e lunulis ferrugineis. Posticae punctis plurimis nigris strigaque postica ferruginea.

Corydon.

693. P. P. R. alis integris coeruleo argenteis: margine nigro, subtus cinereis: punctis ocellariibus, posticis macula centrali alba.

Papilio Corydon Wien. Verz. 184. 10.

Papilio Corydon Esp. pap. tab. 33. fig. 4.

Papilio Tiphys Esp. pap. tab. 51. fig. 4. vix a Faemina huius distincta.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Mas. Antennae annulatae clava subtus ferruginea.

Aiae supra argenteae, nitidae margine fusco posticarum maculari. Subtus anticae albidae punctis numerosis nigris fere simplicibus, posticae obscuriores annulo e punctis duodecim ocellatis nigris. In medio huius annuli macula alba et pene annulum lunulae marginales fuluae nigro notatae.

Faemina antennarum clava subtus ferruginea. Alae fuscae coeruleo micantes, anticis lunula media atra, posticis lunulis marginalibus fuluis. Subtus punctis magis ocellatis lunulisque fuluis distinctioribus.

694. P. P. R. alis integris coeruleis: striga marginali *Adonis:* ✓
atra, subtus cinereis: punctis ocellaribus numerosis
posticis macula centrali alba.

Papilio Adonis Wien. Verz. 184. II.

Papilio Alexis Wien. Verz. 184. 12. vix differt.

Papilio Bellargus Esp. pap. tab. 32. fig. 3.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Nimis praecedenti affinis. Differt tamen alis supra non quam argentatis sola striga marginali atra. Subtus puncta magis ocellata.

Faemina magis coerulescens quam *Faemina Corydon*
et fascia rufa in omni ala distinctior solo oculo ad-
fuso distinguenda.

Larua viridis lineis dorsalibus macularum fuluarum.

695. P. P. R. alis integris coeruleis (fuscis) subtus cine-
reis: anticis puncto medio strigaque postica puncto.
rum ocellatorum. *Dorylas.*

Papilio Dorylas Wien. Verz. 322. 19.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Affinis nimis *P. Adonis* at paullo minor. *Mas* alis supra coeruleis nitidis striga marginali atra. *Faemina* alis fuscis lunulis marginalibus fuluis. Subtus cinereas, anticis macula magna centrali ocellari et pone hanc striga e punctis 6-7 ocellaribus. Margo albicat. Posticae puncto baseos striga incurua punctorum ocellatorum et in medio macula cuneata alba.

696. P. P. R. alis integris: lunula media punctisque mar- *Hylus.* ✓
ginalibus nigris, subtus cinereis: punctis ocellaribus.

Papi-

Papilio Hylus Wien. Verz. 185. 16.

Papilio Amphion Esp. pap. tab. 53. fig. 1.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus minor. Alae omnes coeruleae lunula media nigra. Margo terminatur striga atra et in posticis ante hanc strigam puncta aliquot atra. Faemina obscurior. Subtus cinereae punctis numerosis ocellaribus nigris et in posticis fascia e lunulis ferrugineis.

- Bathus.* 697. P. P. R. alis integris nigris coeruleo nitidis subtus albido: punctis atris numerosis, posticis fascia fulua continua.

Papilio Battus Wien. Verz. 185. 17.

Papilio Telephii Esp. pap. tab. 41. fig. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae omnes coeruleo nigrae. In medio alae anticae lunulae cyaneae. Margo ipse albo maculatus. Subtus albidae, anticis punctis tribus in medio, strigis quatuor pone medium punctorum atrorum simplicium, posticis punctis sparsis baseos strigisque quatuor apicis punctorum atrorum. Inter strigam 2 - 3 fascia lata continua fulua.

- Argiades* 698. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: margine nigricante, subtus fusco cinereis: lunula media strigisque duabus punctorum ocellatorum.

Habitat in Saxonia Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Alae omnes supra coeruleae margine nigro ciliis albis. Subtus omnes fusco cinereae lunula centrali strigisque duabus e punctis ocellatis, posteriore obsoletiore. In posticis praeterea puncta duo ocellata baseos.

- Acreon.* 699. P. P. R. alis integerrimis fuscis subtus nigro ocellatis: posticis fascia alba rubra strigaque punctorum aureorum.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Alae omnes fuscae maris basi coeruleo nitidae lunulisque marginalibus obsoletis fuluis. Subtus omnes fuscescentes, anticis puncto medio strigaque postica punctorum ocellatorum. Margo lunulis albis, nigris, fuluis, nigris albisque strigosus. Posticae fuscae

pun-

punctis nigris ocellatis. Margo albus fascia fulua ante lunulis nigris, postice punctis lacte aureis notata.

700. P. P. R. alis integris fuscis coeruleo variis: posticis Hebrus. coeruleis; margine interiori albo.

701. P. P. R. alis integris concoloribus fuscis: strigis duabus apicis coeruleis.

702. P. P. R. alis integerrimis fuscis immaculatis subtus Acanthus brunneis coeruleo fasciatis: limbo flauo.

Papilio Acanthus Cram. Inf. 32. tab. 380. fig. K. L.

Habitat Surinami.

Parvus. Antennae albo annulatae clava fusca. Alae omnes integerrimae supra fuscae, immaculatae. Subtus limbo brunneo fasciis quatuor communibus coeruleis, abbreviatis prima interne bifida apice cum ultima coeunte. Limbus omnis flauus.

703. P. P. R. alis integris atris coeruleo vndatis: margine Cineus. albo punctato.

704. P. P. R. alis integerrimis fuscis subtus cinereis: anticis angulo postico puncto gemino nigro. Erinus.

705. P. P. R. alis integris supra albis: fasciis fuscis subtus Icarus. fasciis albis nigrisque alternis.

706. P. P. R. alis integris fuscis subtus cinereis albo vndatis: posticis basi punctis ocellaribus nigris apice que ocello. Parsimon

707. P. P. R. alis integerrimis fuscis subtus cinereo vnda- Damoetes tis: posticis ocello gemino aurato.

708. P. P. R. alis integris fuscis: posticis subtus punctis Minereus ocellaribus rubris ocelloque anguli ani.

Habitat in America meridionali Dom. Lund.

Parvus. Antennae fuscae albo annulatae clava apice rufa. Alae omnes supra fuscae posticis maculis marginalibus ocellaribus atris. Subtus cinereae. Anticae apice maculatae, posticae punctis plurimi rubris annulo albo cinctis. Ocellus ater annulo fulvo cincto ad angulum ani.

709. P. P. R. alis integerrimiis supra fuscis immaculatis subtus Hylax. cinereis nigro punctatis.

- Tilephus. 710. P. P. R. alis integerrimis nigris: anticis albo punctatis, posticis supra basi rufis, subtus coeruleis nigro variis.
- Emylius. 711. P. P. R. alis integerrimis nigris albo punctatis: anticis fascia flava, omnibus subtus variegatis.
- Caricae. 712. P. P. R. alis integris fuscis; disco communi albo, limbo cinereo subocellato.
- Pelops. 713. P. P. R. alis integris albis: limbo communi fusco; maculis strigaque postica fuluis.
Papilio Pelops Cram. Inf. 15. tab. 170. fig. F.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Statura et magnitudo P. Caricae at distinctus et aliis.
 Alae omnes albae limbo communi fusco et in hoc limbo exteriori maculae quatuor et in posteriori fascia communis fuluae. Subtus concolores, at in limbo postico pone fasciam marginalis albæ.
- Lamis. 714. P. P. R. alis integris fuscis: fascia communi abbreviata alba fuluaque.
Papilio Lamis Cram. Inf. 28. tab. 335. fig. F. G.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Nimis praecedenti affinis. Alae omnes fuscae fascia in medio lata, abbreviata, alba, communi et posteriori fulua. Margo lunulis albidis subtus subconcolores, at limbis lineolis albidis punctisque nigris.
- Cachrus. 715. P. P. R. alis fluorescentibus: limbo communi fusco albo maculato.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Statura et magnitudo praecedentium. Alae fluorescentes limbo omni fusco et in hoc limbo postico supra striga fere obsoleta albida et in alis anticis maculae tres marginales niveae, subtus maculis plurimis limbi postici.
- Lagus. 716. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: anticis macula gemina alba, subtus cinereis nigro lineatis.
- Mantus. 717. P. P. R. alis oblongis integerrimis coeruleo fuscoque variis: fascia communi alba.
Papilio Mantus Cram. Inf. 4. tab. 47. fig. F. G.
 Habitat in Africa aquinoctiali Mus. Dom. Banks.
 Parvus. Alae valde oblongae limbo supra fusco cyaneo variegato, subtus fusco albo variegato.

718. P.P.R. alis subangulatis fuscis: macula albida, subtus basi albis strigaque rufa.
719. P.P.R. alis integerrimis supra fuscis: macula alba, subtus albis immaculatis. *Aesopus.*
720. P.P.R. alis integerrimis fuluis: margine fusco, subtus albis immaculatis. *Phaedrus.*
- Papilio Cingra* Cram. Inf. 20. tab. 238. fig. C.
721. P.P.R. alis integris nigris coeruleo nitidis subtus fuscis: margine postico albo. *Bias.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magnitudo et statura P. Phaedri. Alae omnes supra nigrae, coeruleo nitentes, immaculatae subtus fuscae, nitidae margine postico albo.
722. P.P.R. alis integerrimis subconcoloribus rubris: *Phareus.* limbo nigro.
Conf. *Papilio Epaphus* Cram. pap. 28. tab. 335. fig. D. E.
723. P.P.R. alis integris: margine albo, subtus cinereis: *Hippothoe.* punctis ocellaribus numerosis. Wien. Verz. 181. 2.
Esp. pap. tab. 38. fig. I.
Alae fuluae nitidae margine nigro tenuissime albo: maris lunula nigra, faeminæ maculis plurimis.
724. P.P.R. alis subangulatis fuluis: margine atro, subtus punctis nigris albisque. *Virginae.* Wien. Verz. 180. 1.
Habitat et in Rumice acuto.
Faemina supra maculis nigris.
Larua viridis: linea dorsali flauescente, lateraliter pallidore, capite nigro.
725. P.P.R. alis aureis margine coerulecente: posticis subdentatis, subtus obscure griseis: punctis ocellaribus numerosis. *Chryseis.*
Papilio Chryseis Wien. Verz. 181. 3.
Papilio Eurydice Esp. pap. tab. 37. fig. 5.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Nitris affinis P. Hippothoe. Mas alis aureis nitidis lunula nigra margineque coeruleo nitente tenuissime que albo. Subtus anticae obscure cinereae disco fulvo punctis ocellaribus numerosis, Posticae in angulum

lum excurrentes, cinereae itidem punctis numerosis posticeque fasciola rufa.

Faemina alis supra fuscis fuluo micantibus anticis punctis aliquot obscurioribus, posticis fasciola fulua nigro punctata. Subtus mari simillima.

Hiere.

726. P. P. R. alis fuscis nigro punctatis, subtus cinereis: punctis ocellaribus numerosis.

Papilio Lampehe Wien. Verz. 322. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo praecedentium. Mas alis fuscescensibus, anticis coeruleo, posticis fuluo micantibus, anticis punctis sparsis nigris, posticis lunula media nigra fasciaque postica fulua fere obsoleta.

Faemina fusca nigro punctata, posticis fasciola fusca distinctiore nigro punctata et ante hanc fasciam lunulae aliquot cyaneae. Subtus omnes cinereae punctis numerosis. Posticae fasciola postica fulua.

Phlaeas.

727. P. P. R. alis subintegris fuluis nigro punctatis, subtus canescensibus.

Arcas.

728. P. P. R. alis integerrimis fuluis: margine punctisque nigris, posticis subtus griseis immaculatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino P. Phlaeas. Alae anticae fuluae margine, punctis duobus in medio strigaque postica e punctis 5-6 nigris. Subtus concolores at punctis baseos tribus subocellatis. Posticae supra fuluae margine nigro maris striga e punctis nigris faeminae immaculatis, subtus griseae immaculatae.

Ballus.

729. P. P. R. alis integris fuluis (faeminae fuscis) margine fusco, subtus anticis nigro punctatis, posticis viridibus: margine fusco.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura omnino P. Phlaeas. Corpus fuscum. Alae omnes supra fuluae haud nitidae limbo fusco. Subtus anticae disco fuluo punctis numerosis subocellaribus atris. Posticae virides, nitidulae puncto medio subocellato margineque postico fuscis.

Faemina alis supra fuscis immaculatis.

Hille.

730. P. P. R. alis integris obscuris coeruleo micantibus: omnibus subtus punctis ocellaribus numerosis.

Papi-

Papilio Hille Wien. Verz. 181. 4:

Papilio Amphidamas Esp. pap. tab. 58. fig. 4.

Naturf. 6. tab. 5. fig. 2.

Habitat Lipsiae Mus. Dom. Romani.

Parvus. Alae supra omnes obscurae coeruleo micantes lunulisque aliquot apicis fulvis. Subtus anticae punctis nigris numerosis albo annulatis, posticae cinereae punctis itidem numerosis nigris albo annulatis et versus apicem fascia fulua.

731. P. P. R. alis subintegris fuscis nigro punctatis: fascia *Xanthe*: marginali fulua, subtus lutescentibus: punctis numerosis.

Papilio Xanthe Wien. Verz. 181. 6.

Papilio Phocas Esp. pap. tab. 35 fig. 2. *faem.*

Habitat in Rumanice Acetosa Dom. Schieffermyller.

Minor. Alae omnes fuscae nigro punctatae margine que tenuissime albò et ante marginem fasciola fulua nigro punctata. Subtus virescentes punctis numerosis ocellaribus nigris: anticis disco fuluo, posticis fasciola fulua, apice subemarginatis.

Faemina alis anticis supra disco fuluo nigro punctato.

732. P. P. R. alis fuscis nigro punctatis: margine albo, *Garbus*. subtus virescentibus: punctis numerosis.

Papilio Circé Wien. Verz. 181. 7. *Phocas Esp. 35 fig. 2. mas.*

Habitat in Austriae Acetosella Schieffermyller.

Nimis praecedenti affinis et forte mas in copula captus.

Alae omnes fuscae, obscurae, nigro punctatae margineque postico albido. Puncta aliquot fulua ante marginem alae posticae. Subtus nigro punctatae, anticae cinerascentes, posticae hand emarginatae, sed in angulum excurrentes, virescentes postice fasciola fulua.

733. P. P. R. alis subcaudatis fuluis: subtus punctis ocellaribus numerosis, anticis fuluis, posticis cinereis. *Tlterfanmon.*

Papilio Thersamon Esp. pap. tab. 89. fig. 6.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura praecedentium. Corpus fuscum. Maris alae anticae fuluae fere immaculatae margine nigro. Posticae obscuriores fascia postica fulua. Subtus anticae flavescentes punctis tribus strigaque pone medium e punctis ocellaribus atris. Pone hanc fascia fulua

punctis atris. Posticae cinereae punctis numerosis ocellaribus fasciaque postica fulua.

Faeminae alae supra nigro punctatae caudaque elongata.

Pentheus. 734. P. P. R. alis integris fuluis nigro maculatis; posticis apice albis nigro punctatis.

Vlricus. 735. P. P. R. alis integris coeruleo nitidis subtus basi brunneis: anticis ocello tripupillato,

Thyra. 736. P. P. R. alis integris: disco fuluo nigro punctato subtus purpurascenscentibus: maculis argenteis.

Zeuxo. 737. P. P. R. alis integris: disco fuluo nigro maculato; anticis subtus argenteo maculatis.

Iuba. 738. P. P. R. alis integerrimis nigris: disco fuluo, subtus fascia strigisque abbreuiatis albis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Parvus. Corpus nigrum antennarum clava apice ferruginea. Alae omnes supra nigrae disco fuluo et praeterea litura rufa ad marginem alae posticac. Subtus omnes nigrae striga baseos, fascia media strigaque postica abbreuiatis albis. Puncta duo nigraatos argenteis irrorata ad angulum ani.

Lara. 739. P. P. R. alis integerrimis subtestaceis, supra anticis vniocellatis, posticis biocellatis.

Cephus. 740. P. P. R. alis integris fuscis subtus coeruleo fasciatis anticis ocello vnico, posticis quatuor.

Phlegeus. 741. P. P. R. alis integerrimis atris albo punctatis maculaque baseos oblonga fulua.

Aetoris. 742. P. P. R. alis integerrimis concoloribus fuscis albo punctatis.

Cassius. 743. P. P. R. alis integerrimis supra alis: anticis limbo fusco, posticis fimbria punctata.

Haraldus 744. P. P. R. alis integerrimis coeruleis: limbo atro, subtus albis: margine atro punctato.

Habitat in India Orientali Dom. Lund.

Medius in hac familia. Antennae nigrae albo annulatae. Alae omnes supra coeruleae, nitidae margine atro, baseos tamen posticarum albo. Subtus omnes albae versus marginem striga e lunulis paruis nigris, tunc lunulae maiores puncto magno atro.

745. P. P. R. alis integerrimis fusco coeruleoque fascia- *Talus.*
tis: subtus fascia sanguinea abbreviata.
746. P. P. R. alis integerrimis concoloribus nigris: anticis *Neleus.*
punctis decem albis, posticis disco toto albo.
747. P. P. R. alis integerrimis subfuscis: disco communi *Athemon.*
albo; fascia postica dimidiata fusca.
748. P. P. R. alis integerrimis atris: fasciis tribus flauescen- *Hisbon.*
tibus: postica abbreviata.
749. P. P. R. alis integerrimis concoloribus atris: fascia *Iarbas.*
flaua puncto que apicis sanguineo.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura praecedentium. Alae omnes atrae fascia flaua,
anticarum abbreviata, posticarum marginali. Pun-
ctum baseos magnum, sanguineum.
750. P. P. R. alis integerrimis atris: macula communi trans- *Sagaris.*
uersali fulua.
751. P. P. R. alis integris atris: macula coerulea, subtus me- *Euriteus.*
dio rufis: fasciis albis.
752. P. P. R. alis integerrimis concoloribus atris: anticis *Phereclus*
fascia linearis rubra.
753. P. P. R. alis angulatis fuscis: omnibus striga rubra, *Lysippus.*
subtus cinereo punctatis.
754. P. P. R. alis integerrimis atris concoloribus: fascia *Thisbe.*
fulua.
- Papilio Iarbas* Drury. Inf. 3. tab. 8. fig. 2.
755. P. P. R. alis integerrimis fuscis coeruleo micantibus: *Pyramis.*
macula fulua, posticis subtus griseis.
756. P. P. R. alis integerrimis concoloribus nigris: anticis *Priassus.*
fascia dupli fulua.
757. P. P. R. alis integris fuscis subtus maculatis: posticis *Philassus.*
postice supra ocellis duobus, subtus unico.
758. P. P. R. alis integerrimis fuscis, subtus fuluis: strigis *Gyas.*
punctatis aureis.
759. P. P. R. alis integerrimis fuscis: fasciis plurimis ma- *Aegon.*
cularibus fuluis.

** *Pleleii Vrbicolae.*

Exclama. 760. P. P. V. alis integris diuaricatis fuscis: anticis lineola tioniis. punctoque flauescens.

Comma. 761. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis fuluis: lineola nigra, subtus punctis albis.

Papilio Comma Wien. Verz. 159. 4.

Larua rubro micans, capite nigro, collari striga alba.
Sexus alter absque lineola nigra.

Linea. 792. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis fuluis: margine nigro.

Papilio Linea Wien. Verz. 159. 5.

Papilio sylvestris Pod. Mus. Graec.

Papilio Thaumas Esp. Pap. tab. 36. fig. 2, 3.

Habitat in *Aira montana* Dom. Schieffermyller.

Affinis P. Comma at distinctus. Antennae supra nigrae, subtus flauescentes. Alae omnes fuluae, haud maculatae lineola parua in medio margineque nigris. Ciliae marginis tamen albidae. Alae subtus immaculatae.

Faemina absque linea alae anticae.

Larua solitaria, viridis, immaculata.

Puppa tenuissime folliculata, viridis.

Syluanus. 763. P. P. V. alis diuaricatis fuscis: maculis quadratis supra flauis subtus albis.

Papilio Syluanus Esp. pap. tab. 36. fig. 1.

Habitat in *Russia boreali* Dom. Boeber.

Statura omnino P. Comma. Alae omnes supra fuscae maculis plurimis quadratis postice emarginatis flauis. Subtus pallidiores maculis iisdem at albis.

Taumas. 764. P. P. V. alis diuaricatis fuscis: litura baseos fulua lineolaque media atra.

Habitat in *America boreali* Dom. Boeber.

Statura omnino P. Comma at distinctus. Alae omnes fuscae, nitidulae. Anticae macula magna fulua a basi ad medium marginis crassioris. In medio lineola magna atra. Posticae immaculatae.

Augias. 765. P. P. V. alis diuaricatis fuluis: fascia obliqua marginique postico nigris.

Colon. 766. P. P. V. alis diuaricatis fuluis: macula media marginique striato fusca,

767. P. P. V. alis integerrimis diuaricatis: posticis vtrinque fuscis fuluo maculatis.
Papilio Brontes Wien. Verz. 160. 6.
Papilio Palaemon Pall. Iter. I. App. nr. 63.
β. Papilio Siluius Esp. Pap. tab. 80. fig. 5. 6.
Papilio Siluius Knoch Beytr.
 Variat alis anticis fuscis fuluo maculatis et fuluis atro maculatis.
768. P. G. N. alis integerrimis diuaricatis fuscis: margine *Helirius*. nigro, anticis puncto centrali flavo.
769. P. P. N. alis diuaricatis fuscis: anticis albo punctatis, *Saturnus*. posticis subtus striatis.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Statura omnino P. Comma at minor. Alae supra omnes fuscae, anticis punctis aliquot albis, posticis immaculatis. Subtus anticae concolores, posticae venis albis striatae.
770. P. P. V. alis subangulatis diuaricatis fuscis: fascia flava; anticarum interrupta. *Phineus*.
771. P. P. V. alis subdiuaricatis fuscis: posticis margine interiore fuluis. *Helius*.
772. P. P. V. alis integerrimis fuscis: maculis fuluis sparsis: posticis subtus immaculatis. *Metis*.
773. P. P. V. alis caudatis fuscis subtus brunneis: striga *Silenus*. flauescente.
774. P. P. V. alis caudatis fuscis: anticis maculis fenestratis, posticis caudis albis.
 Drury Ins. 3. tab. 17. fig. 3. 4.
775. P. P. V. alis caudatis fuscis; anticis vtrinque posticis *Eudoxus*. subtus fascia alba.
Papilio Eudoxus Cram. Ins. 31. tab. 366. fig. G. H.
 Habitat Surinami.
 Alae valde caudatae basi virescenti nitidae.
776. P. P. V. alis caudatis fuscis: maculis fenestratis, antennis vncinatis. *Proteus*.
 Maculae alarum variant numero et colore.
777. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticis vtrinque fascia flava, posticis subtus striga argentea. *Tityrus*.
 Conf. *Papilio Coelus* Cram. Ins. 29. tab. 343. fig. C. D.

- Epitus.* 778. P.P. V. alis subcaudatis fuscis flavo maculatis: posticis subtus fascia argentea.
Papilio Epitus Cram. Inf. 29. tab. 343. fig. E. F.
Papilio Euadrus Cram. Inf. 29. tab. 343. fig. G. H.
 Habitat Surinami.
 Affinis praecedenti at alae minus caudatae et fascia argentea multo latior.
- Nicias.* 779. P.P. V. alis subcaudatis fuluis: anticis apice fuscis; macula flavo hyalina.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Corpus magnum fuluum antennis vncinatis nigris. Alae anticae basi fuluae puncto fusco, apice fuscae macula magna sinuata flavo hyalina. Posticae fuluae punctis fuscis. Subtus subconcolores.
- Mercurius.* 780. P. P. V. alis subcaudatis fuscis basi flavis: anticis punctis hyalinis, posticis subtus nigris; fascia cinerea.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Magnus in hac familia. Alae omnes supra fuscae basi fluae. Anticae striga e maculis quatuor hyalinis, e quibus postica maxima. Subtus anticae concolores, posticae nigrae fascia media lata cinerea. Corpus flavescent ab domine nigro segmentorum marginibus albis.
- Thyrsis.* 781. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticis fascia flava, subtus omnibus purpureis flavo irroratis.
- Alpheus.* 782. P. P. R. alis subcaudatis atris: fascia sanguinea, subtus variegatis.
- Pretus.* 783. P. P. V. aliis subcaudatis atris viridi maculatis, subtus subferrugineis flavo maculatis.
- Amynatas.* 784. P. P. V. alis subcaudatis fuscis fenestrato maculatis: posticis subtus puncto baseos atro.
- Momus.* 785. P. P. V. alis subcaudatis fuscis basi hyalino striatis apice maculatis.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Magnitudo praecedentium. Antennae vncinatae nigrae. Alae omnes fuscae basi maculis oblongis bifidis hyalinis striatae, apice maculatae.
- Rhetus.* 786. P. P. V. alis subcaudatis fuluis: posticis margine exteriori coeruleo atris.

787. P. P. V. alis subcaudatis atris: anticis fascia niuea, posticis subtus coerulescentibus, ano sanguinco. *Clonias.*
788. P. P. V. alis subcaudatis atris: anticis fascia niuea, posticis subtus virescentibus: strigis abbreviatis flavis. *Acastus.*
789. P. P. V. alis subcaudatis coerulescentibus: anticis *Palemon.* punto medio, posticis angulo rufis.
790. P. P. V. alis subcaudatis fuscis: anticis flavo macu. *Coridon.* latis, posticis subtus fusco glaucoque variis. *P. Ammon.* on. 5. 5. 274
791. P. P. V. alis subcaudatis concoloribus fuscis: anticis *Brontes.* fascia, posticis margine niueis.

Papilio Ammon Spec. Inf. 2. 134. 618.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Parvus. Antennae vncinatae, fuscae. Alae omnes concolores fuscae anticis fascia niuea, quae tamen marginem haud attingit. Margo albae posticae albus rudimento tamen caudae fusco.

792. P. P. V. alis ecaudatis concoloribus atris: anticis macula transuersa niuea, ano sanguineo. *Arinus.*

793. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: posticis subtus fascia *Alexis.* coerulescente.

794. P. P. V. alis ecaudatis atris viridi nitentibus subtus *Iupiter.* viridibus: venis margineque nigris, capite anoque fanguineis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Magnus in hac familia. Antennæ nobis desunt. Caput villosum sanguineum palpis apice nudis nigris. Corpus nigrum ano sanguineo. Alae supra striatae, atræ viridi colore nitentes. Apex alae albicat. Subtus virides nitidae venis margineque omni nigro.

795. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: maculis aliquot fenestratis, antennis vncinatis. *Thrax.*

Papilio Scaldus Cram. Inf. 29. tab. 342. fig. A. B.

Papilio Runafis Cram. Inf. 29. tab. 342. fig. C.

Variat colore baseos alarum flavescente, virescente et coerulescente.

796. P. P. V. alis ecaudatis fuscis hyalino maculatis: posticis subtus vittis duabus flavescentibus margine tenuiori fulvo. *Marcus.*

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Parutis. Corpus fuscum antennis vncinatis. Alae anticae concolores, fuscae maculis aliquot albo hyalinis. Posticae supra fuscae macula magna media margineque tenuiori albis, subtus fuscis vittis duabus exteriore marginali flavescentibus. Margo interior fulius.

Flesus. 797. P.P.V. alis ecaudatis fuscis: anticis fenestrato maculatis, posticis subtus disco albo nigro punctato.

Dan. 798. P.P.V. alis ecaudatis obscure cinereis fusco punctatis: anticis maculis fenestratis.

Habitat Tranquebariae Dom. Pflug.

Corpus paruum obscure cinereum antennis vncinatis nigris. Alae omnes obscure cinereae punctis strigaque postica fuscis. Anticae in medio maculis tribus anteriore angulata et punctis quatuor minutis approximatis ad marginem crassiorem hyalinis. Subtus concolores.

Nothus. 799. P.P.V. alis ecaudatis fuscis: anticis punctis fenestratis posticis subtus albis: margine fusco; punctis sexocellaribus.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Paruus. Antennae desunt. Corpus fuscum abdomine subtus albo. Alae anticae concolores, fuscae maculis sparsis, fenestratis. Posticae supra fuscae vix maculatae, subtus albae punctis tribus coeruleo argenteis annulo fusco cinctis. Margo posticus fuscus punctis sex coeruleo argenteis annulo obscuricri cinctis.

Silvius. 800. P.P.V. alis ecaudatis fuscis: disco flavescente fusco maculato, posticis subtus cinereis fusco vndatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Magnus in hac familia. Alae omnes supra fuscae disco flavescente, anticis arcu magno atro posticis striga abbreviata e punctis tribus nigris. Subtus anticae cinereae disco fulvo arcu magno punctisque nigris, posticae cinereae strigis obsoletis vndatis fuscis.

Salus. 801. P.P.V. alis dentatis fulvis nigro fasciatis: anticis maculis posticis centro fenestratis.

Iacchus. 802. P.P.V. alis ecaudatis flavo maculatis: posticis subtus punctis sex nivis.

803. P. P. V. alis dentatis subconcoloribus atris: anticis *Gnetus*.
maculis tribus fenestratis, posticis coeruleo fasciatis.
804. P. P. V. alis ecaudatis concoloribus fuscis: posticis *Anaphus*:
apice flauis.
805. P. P. V. alis ecaudatis fusco atroque variis: posticis *Sebaldus*.
subtus angulo ani flauo.
- Habitat in America Mus. Dr. Hunter.
- Magnus. Antennae atrae vix clavatae, vncinatae. Corpus atrum. Alae apice obtuse, haud rotundatae, sed quasi truncatae fusco atroque variegatae. Subtus fuscae angulo ani late flauo punctis aliquot fuscis.
806. P. P. V. alis ecaudatis fuscis: disco fuluo, anticis *Euadrus*.
subtus punctis argenteis subocellatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Antennae exterrsum crassiores. Alae supra omnes fuscae disco fuluo. Subtus anticae cinereae disco fuluo punctis sparsis atris pupilla argentea, posticae maris cinereo fuscoque variae punctis cinereis, faeminae fuscae cinereo punctatae.

807. P. P. V. alis rotundatis fuscis basi virentibus, posticis *Bixa*.
subtus fascia lutea.

808. P. P. V. alis subcaudatis viridi fuscis: anticis macula *Polyclela*-
alba, subtus maculis fuluis argento marginatis. *tus*.

809. P. P. V. alis rotundatis integerrimis fuscis: posticis *Aracintus*.
subtus gris; maculis ocellaribus albis.

Papilio Steropes Wien. Verz. 160. 7.

Papilio Steropes Esp. pap. tab. 41. fig. 1.

Papilio Morpheus Pal. Iter. 1. 471. 64.

Papilio nigro fuscus nitens, alis subtus limbo dentato
fuluo, secundiariis maculis duodecimi albis.

Geoff. Inf. 2. 66. 36.

Habitat et in Russia australiori frequens.

810. P. P. V. alis rotundatis integerrimis atris: anticis *Hemes*.
macula, posticis fascia alba.

811. P. P. V. alis rotundatis integerrimis: anticis atris albo *Eumelus*.
maculatis, posticis fuluis nigro venosis.

812. P. P. V. alis rotundatis integerrimis atris immaculatis, *Philemon*
antennis vncinatis.

Plures huius sunt aut species aut varietates.

- Maenas.* 813. P. P. V. alis integris viridi atris nitentibus margine albis: posticis subtus fascia alba ore anoque rubris.
Habitat in America Mus. Dr. Hunter.
Affinis P. Brixae at paullo maior. Antennae vncinatae atrae. Corpus viridi atrum, nitidum ore anoque rubris. Alae omnes viridi atrae margine albo. Posticae supra immaculatae subtus fascia alba.
- Phidias.* 814. P. P. V. alis integris atris nitentibus margine albore anoque rubris.
Alae posticae subtus ante marginem rubrae.
- Lycagus.* 815. P. P. V. alis rotundatis integerrimis viridi coeruleis immaculatis, ano sanguineo.
- Syrichtus* 816. P. P. V. alis rotundatis integris nigro alboque variis, posticis subtus cinereis: strigis vndatis nigris.
Papilio Orcus Cram. Inf. 28. tab. 334. fig. I. K. L.
- Maimon.* 817. P. C. V. alis integris albis: margine maculisque nigris.
Habitat Cajennae.
- Talaus.* 818. P. P. V. alis integerrimis concoloribus fuscis: anticis punctis albis basique sanguineis, posticis disco albo.
Papilio Talaus Cram. Pap. 33. tab. 393. fig. C.
- Mimas.* 819. P. P. V. alis integerrimis fuscis margine ferrugineis: subtus striga punctorum nigrorum.
- Gentius.* 820. P. P. V. alis integris concoloribus flaviis: limbo atro; anticarum fasciis flaviis.
- ✓ *Maluae.* 821. P. P. V. alis dentatis diuaricatis fuscis cinereo vndatis: anticis punctis fenestratis, posticis subtus punctis albis.
Roef. Inf. 1. Pap. 2. tab. 10. fig. 5. 6.
Schaeff. Icon. tab. 276. fig. 5. 6.
Larua folia filis connectit.
Puncta alarum fenestrata subtus distinctiora.
- ✓ *Alceae.* 822. P. P. V. alis diuaricatis fusco cinereoque variis; anticis punctis fenestratis, posticis subtus cinereis immaculatis.
Papilio Alceae Esp. Pap. tab. 51. fig. 3. mal.
Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.
Nimis affinis P. Maluae. Alae anticae minus obscuriores cinereo variae punctisque aliquot fenestratis. Pot.

sticae obscuriores fasciis macularibus albidis. Subtus omnes cinereae fere. immaculatae punctis aliquot marginalibus nigris.

823. P. P. V. alis integris diuaricatis nigris albo punctatis, posticis subtus cinereis: fasciis duabus flauis. *Sidae.*

Papilio Sidae Esp. pap. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Statura omnino P. Fritilli at paullo maior. Alae omnes supra fuscae maculis quadratis albis posticarum obsoletioribus. Subtus anticae obscurae maculis iisdem albis, posticae albidae fasciis duabus flauis nigro marginatis, anteriore abbreviata.

824. P. P. V. alis integris diuaricatis nigris albo punctatis. *fritillum.*

Papilio alis denticulatis diuaricatis nigris albo punctatis. Geoff. Inf. 2. 67. 38.

Papilio Maluae minor Esp. pap. tab. 51. fig. 2.

Schaeff. Elen. tab. 94. fig. 9.

Wien. Verz. 159. 3.

Habitat in Germaniae Dipsaco Fullonum.

Difserit sanc a P. Maluae. Alae haud dentatae at margine albo nigroque variegato.

Color alae posticae subtus variat.

Variat major maculis alarum pluribus vix tamen distinctus in Russia meridionali *Papilio Maluae maior.* Esp. pap. tab. 23. fig. 2.

825. P. P. V. alis integris fuscis: anticis albo maculatis, posticis punctatis, omnibus lunula media niuea. *Lauatae.*

Habitat Kiliae.

Statura omnino P. Fritilli at duplo minor. Alae anticae concolores fuscae in medio valde albo maculatae et in centro lunula niuea distincta annulo nigro cincta. Posticae fuscae albo punctatae lunula media distincta, subtus concolores.

826. P. P. V. alis integerrimis concoloribus albis: margine *Menalcas* nigro.

827. P. P. V. alis integerrimis striatis fuscis: fascia lata *Menippus* alba.

828. P. P. V. alis integris concoloribus nigris: anticis pun- *Clito.* etis, posticis fascia albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statu-

Statura omnino praeecedentium. Alae omnes fuscae, antennae inaculis aliquot fenestrato albis, posticae fascia media lata alba.

- Virbius.* 829. P. P. V. alis integerrimis nigris: anticis punctis tribus, posticis apice albis.
- Phocion.* 830. P. P. V. alis integerrimis: anticis fusca, posticis flauis.
- Tages.* 831. P. P. V. alis integerrimis: denticulatis fusca obsolete albo punctatis.
- Niso.* 832. P. P. V. alis integerrimis subreversis fusca: anticis supra punctis quatuor albis sparsis.
- Spio.* 833. P. P. V. alis integerrimis reversis nigricantibus yndique albo maculatis.
- pygmaeus* 834. P. P. V. alis integerrimis fusca immaculatis.

148. SPHINX. *Palpi* duo reflexi, pilosi.

Lingua spiralis plerisque exserta.

Antennae squamatae.

- ocellata.* 1. S. alis angulatis: posticis rufis; ocello coeruleo.
Esp. Inf. 2. tab. I.
- Nessus.* 2. S. alis angulatis atro fasciatis posticis rufis: margine atro, abdome rufo flauoque maculato.
- Quercus.* 3. S. alis angulato dentatis cinereis: strigis obscurioribus, posticis ferrugineis: angulo ani albo.
Esp. Inf. 2. tab. 19.
Mas corpore cinereo, faemina fusco.
- lugubris.* 4. S. alis angulatis brunneis: anticis punto subocellari atro.
- fusca.* 5. S. alis angulatis obscuris: punto atro, posticis atris: fascia fulua.
- afiliformis.* 6. P. alis erofo dentatis anticis cinereis: fascia obscuriore: punto nigro, posticis rubris: margine nigro.
- fenestrina* 7. S. aliis erofo dentatis fusco aureis: maculis duabus fenestratis.
Esp. Inf. 2. tab. 23. fig. I.

8. S. alis dentatis reversis griseis, posticis basi ferrugineis, anticis puncto albo.

Esp. Inf. 2. tab. 2.

9. S. alis angulatis virescenti nebulosis saturati fasciatis, *Tiliae*.
posticis supra luteo testaceis.

Esp. Inf. 2. tab. 3.

10. S. alis subangulatis cinereis: puncto baseos fascia media obliqua abbreviata abdominalisque primo segmento nigra.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Statura omnino S. *Tiliae* at paullo minor. Caput cum antennis cinereum. Thorax hirtus, cinereus linea dorsali nigra. Abdomen cinereum primo segmento toto nigro. Alae subangulatae, anticae cinereae puncto distincto baseos atro. In medio marginis inferioris striga abbreviata obliqua atra, quae a macula fusca magna anguli ani excipitur. Versus apicem litura nigra. Subtus obscuriores fasciolis cinereis. Posticae obscurae angulo ani cinereo striga parua atra, subtus griseac.

11. S. alis erofo virescentibus: fascia saturatiore, posticis fulvis apice atris. *Oenotherae*.

Esp. Inf. 2. tab. 20.

Habitat in *Oenothera*.

Larva solitaria, ecaudata, fusca: stigmatibus sanguineis segmentoque penultimo ocello ovali atro: pupilla alba.

Puppa nuda, brunnea.

12. S. alis subangulatis viridibus: fasciis variis pallidioribus saturatiorebus flavescentibusque. *Nerii*.

Cram. Inf. 19. tab. 244. fig. D.

Esp. Inf. 2. tab. 4.

13. S. alis dentatis: anticis fulvis; maculis duabus aureis, *Apulus*. posticis niveis, antennis plumosis.

14. S. alis dentatis fusco cinereoque nebulosis, posticis ferrugineis: margine nigro. *Penaeus*.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Medius. Corpus cinereo fusum thorace apice macula nigra. Abdomen subtus albido ferrugineo irroratum punctisque vtrinque tribus distinctis. Alae an-

anticae in primis apice variegatae puncto medio parvo albo distincto. Posticae ferrugineae margine nigro. Subtus neruis striatis ferrugineis apice obscuriores.

- Pylas.* 15. S. alis eroso dentatis variegatis, posticis fuluis basi flavis apiceque nigris.
- obscura.* 16. S. alis dentatis posticis rubris: margine nigro, abdomine supra pallido immaculato.
17. S. alis dentatis nigris: strigis tribus approximatis pallidis, posticis flavis nigro striatis.
Nimis affinis S. *Caricae*.
- dentata.* 18. S. alis dentatis posticis fuscis: striga alba, abdomine albo annulato.

- Alope.* 19. S. alis dentatis fuscis: posticis flavis apice nigris, abdome nigro: cingulis interruptis pallidis.

Sphinx Alope Drury Ins. I. tab. 27. fig. I.

Cram. Pap. 26. tab. 301. fig. G.

Habitat in India Dom. Vahl.

Statura omnino P. Ello. Caput et thorax fusca immaculata. Antennae ruchi albida. Alae anticae dentatae cinereo substriatae, subtus fuscae immaculatae. Posticae flavae apice nigrae, subtus fuscae macula marginis tenuioris flava. Abdomen nigrum cingulis quinque medio interruptis albis. Subtus griseum.

Variat rarius alis anticis supra cinereis attamen distincta ab. S. Ello.

- ✓ *Ello.* 20. S. alis subdentatis cinereis posticis rufis: margine nigris, abdome pallido: cingulis atris.

Cram. Ins. 26. tab. 301. fig. D.

Merian. Sur. tab. 61. fig. 2.

Habitat Surinami.

- Iatrophae.* 21. S. alis subdentatis posticis nigris basi rufis fasciaque fenestrata, capite bicorni.

- Medea.* 22. S. alis subdentatis anticis viridibus, posticis fuluis: margine nigro.

- Pholus.* 23. S. alis emarginatis nigris apice pallidioribus: strigis nigris, posticis brunneis.

- carolina.* 24. S. alis integris, omnibus margine postico albo punctatis, abdome ocellis sex parium fuluis.

25. S. alis integerrimis griseis, posticis fuluis: strigis *strigilis*. fascis.
26. S. alis integris posticis luteis: fasciis fuscis, abdomi- *Atropos*. ne luteo: cingulis nigris.
- Esp. Inf. 2. tab. 7.
Larua die sub terra latet, vesperi prouenit, pascit.
27. S. alis integris fusco coeruleoque variis, posticis ful- *Erotus*. uis: margine nigro.
28. S. alis integris obscure viridibus: lineolis coeruleis, *Phorbus*. posticis atris: maculis duabus fuluis.
29. S. alis fusco nebulosis, posticis fascia nigra anguloque *Ficus*. ani albo.
 Cram. Inf. 21. tab. 246. fig. E.
30. S. alis dentatis cinereis fusco variis, abdomine sub- *Tetrio*. tus albo: punctis quatuor ferrugineis.
31. S. alis variegatis: puncto medio albo, abdomine ocel- *rufica*. lis trium parium fuluis.
Sphinx rufica Cram. Inf. 26. tab. 30. fig. A.
 Merian. Sur. tab. 5.
 Habitat in Americae Iatropa.
- Larua* caudata flavo nigroque fasciata, capite cauda- que sanguineis.
Puppa fusca.
32. S. alis cinereis nigro nebulosis, posticis supra disco *pagana*. ferrugineo.
33. S. alis integris canis: anticis lineolis tribus confertis *Pinaftri*. nigris, abdomine fusco: cingulis albis.
 Esp. Inf. 2. tab. 12.
34. S. alis integris griseis: puncto medio albo, abdomi- *plebeja*. nis lateribus albis nigro marginatis.
35. S. alis integris griseis: fasciis duabus virescentibus, po- *Euphor*. sticis basi nigraque nigris, antennis niveis. *biae*.
 Esp. Inf. 2. tab. 11.
36. S. alis integris virescentibus: vitta alba, posticis pal- *Gali*. lidis basi strigaque atris, antennis fuscis.
 Esp. Inf. 2. tab. 21.
 Degeer. Inf. 2. tab. 8. fig. 6-11.
 Roef. Inf. 3. tab. 6. fig. 1. 2. 4. *Larua*.

- lineata.* 37. S. alis virescentibus: fascia striisque albis, posticis nigris: fascia rubra.
Sphinx Koechlini Arch. Inf. Fyest. Monog. c fig. Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. 9.
 Habitat in Gallio vero.
Larua caudata, flauicans nigro maculata, capite linea dorsali stigmatibusque rubris.
Puppa fusca.
- Vespertilio.* 38. S. alis integris cinereis immaculatis, posticis sanguineis basi apiceque nigris. Sp. Inf. App. 504.
- Vitis.* 39. S. alis integris virescentibus: fascia viitaque albis, posticis cinereis: fascia nigra marginaque rufo. Cram. Inf. 25. tab. 23. tab. 267. fig. C.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 20. fig. 1.
- satellitia.* 40. S. alis integris griseo nebulosis: anticis puncto nigro ocellari sesquialtero, posticis basi cinereis.
- Oldenlandiae.* 41. S. alis integerrimis griseis: fascia obliqua albo argentea punctoque medio fuso, abdomine lineis duabus argenteis approximatis.
 Thorax vtrinque linea argentea. Alae posticae nigrae fascia albida.
- Lycetus.* 42. S. alis integris cinerascentibus, abdomine griseo vtrinque lineis tribus aureis.
- Boerhaaviae.* 43. S. alis integris virescentibus, posticis fuscis: fascia fulua, abdomine subtus aureo.
Sphinx Pluto alis integris cinereis, posticis rubris apice fuscis, abdomine griseo vtrinque linea aurea. Spec. Inf. 2. 148. 39.
- Minus.* 44. S. alis integris virescentibus posticis ferrugineis: margine nigro, abdomine subtus cinerascente.
 Habitat in India Dom. Lund.
 Statura et magnitudo fere S. Boerhaviae. Caput et thorax virescentia, immaculata. Antennae fuscae. Abdomen cinereum. Alae anticae subangulatae virides litura ad angulum ani apiceque cinereis. Posticae ferrugineae margine nigro.
- didyma.* 45. S. alis integris fuscis: anticis punctis duobus approximatis albis.
- Parce.* 46. S. alis integris, anticis griseis: lunula media argentea, posticis rufescentibus.

47. S. alis integris viridi purpureoque variis, posticis rubris basi atris. *Elpenor.*
Esp. Inf. 2. tab. 9.
48. S. alis integris flavo purpureoque variis: abdomine *Porcellus.*
subtus sanguineo albo punctato.
Esp. Inf. 2. tab. 10.
49. S. alis integris anticis fuscis apice variegatis, posticis *Hylaeus.*
atris albo maculatis.
50. S. alis integris nebulosis posticis subfasciatis, abdomine cingulatae
cingulis rubris atris albisque. *Convolvuli.*
Cram. Inf. 19. tab. 225. fig. D.
Esp. Inf. 2. tab. 5.
Ambram spirat oculis phosphorescentibus.
51. S. alis integris posticis rufis: fasciis tribus nigris, *Ligustrum.*
abdomine rubro: cingulis nigris.
Esp. Inf. 2. tab. 6.
Sepp. Inf. 3. 19. tab. 4.
52. S. alis integris posticis nigro fasciatis basi sanguineis
margin'e albo punctatis, abdomine cingulis sanguineis atrisque. *Cingulata*
53. S. alis integris fuscis posticis rufis nigro striatis, ab- *Caicus.*
domine cinereo: annulis atris.
54. S. alis integris griseis: striis albis, posticis fasciis: *Celerio.*
maculis sex rubris.
Esp. Inf. 2. tab. 8. fig. 1.
55. S. alis integris fuscis atro maculatis, posticis rubris: *Crantor.*
margin'e atro.
56. S. alis integris anticis supra griseis, posticis rubris *Alecto.*
basi margin'e atris.
57. S. alis integris virescentibus: puncto fuluo, posticis *Clotho.*
fuluis.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
Antennae fuluae. Statura omnino S. Alecto. Alae anticae integrae, acutae, virescentes puncto paruo centrali fuluae, subtus cinereae.
58. S. alis integris cinereis: posticis supra vitta nigra. *Gnoma.*
59. S. alis integris anticis viridi nebulosis, posticis fuscis *Hespera.*
immaculatis.

- Anubus.* 60. S. alis integris anticis subferrugineis, posticis atris: striga punctorum albidorum.
- Nechus.* 61. S. alis integris anticis viridibus: striga testacea posticis nigris: maculis baseos fasciaque flauis.
- Butus.* 62. S. alis integris fuscouscentibus, posticis albidis: fascia maculari albida.
Habitat in India.
Statura praecedentium. Caput et thorax viridia linea laterali albida. Abdomen supra obscure virescens subtus pallidum. Alae fuscouscentes striga postica obscuriore. Posticae nigrae fascia maculari albida. Subtus omnes flauo testaceoque variae.
- Labruscae.* 63. S. alis virescentibus anticis subtus puncto albo abdominis lateribus punctis quinque albis.
- Caricae.* 64. S. alis integris posticis subtus luteis, abdome cincereo: cingulis atris.
- terfa.* 65. S. alis integris griseis: puncto fusco, posticis nigris basi fasciaque maculari albis.
Cram. Pap. 34. tab. I. fig. C.
- Vampyrus.* 66. S. alis integris cinereis pallide strigosis, posticis rufis: margine nigro.
Habitat in Indiis.
Parua. Caput et thorax virescentia linea laterali albida. Abdomen cinereum linea laterali aurea. Alae anticae cinereae strigis aliquot approximatis a medio marginis tenuioris ad apicem alae ductis. Posticae rubrae margine nigro. Subtus omnes testaceae atomis fuscis.
- Thyelia.* 67. S. alis ferrugineis: vitta nigricante.

149. SESIA. *Palpi* duo reflexi.*Lingua* exserta truncata.*Antennae* cylindricae.*Tantalus* 1. S. abdome barbato: segmento tertio niueo.*Ixion.* 2. S. abdome barbato: striga alba rufaque, alis anticis variegatis; punctis tribus albis.

3. S. alis fenestratis: margine atro, abdomine cyaneo basi *Melas.*
atro: cingulis tribus flauis.
4. S. alis fenestratis, abdomine barbato viridi: cingulo *Hylas.*
purpureo.
5. S. abdomine barbato, alis fuscis: anticis fasciis dua- *Fidus.*
bus abbreviatis albis.
6. S. abdomine barbato: lateribus albo nigroque variis, *stellata-*
alis posticis ferrugineis. *rum.*
Esp. Inf. 2. tab. 13.
Wien. Verz. 43. 2.
7. S. alis brunneis immaculatis: posticis emarginatis. *Brunnus.*
8. S. alis atris: maculis duabus antecarum flauis, postica- *8 macu-*
rum albis. *lata.*
9. S. alis variegatis, posticis atris: macula baseos hyali- *Marica.*
na nigris.
10. S. abdomine barbato postice fusco, alis macula hya- *Thysbe.*
lina.
11. S. abdomine barbato nigro: fascia flauescente, alis fucifor-
fenestratis: margine nigro. *misis.*
Esp. Inf. 2. tab. 14.
Wien. Verz. 44. 1.
Conf. *Sphinx bombyliformis* Esp. Inf. 2. tab. 23. vix sa-
tis distincta.
12. S. alis fenestratis, abdomine flavo: incisuris atris, tho- *apiformis*
race nigro: maculis duabus flauis.
Sphinx crabroniformis Wien. Verz. 44. 2.
13. S. alis hyalinis margine fasciaque atris, abdomine bar- *sphegi-*
bato: cingulo flavo, antennis ante apicem albis. *formis.*
Sphinx sphegiformis Wien. Verz. App. 305. 15.
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
- Minor S. apiformi. Antennae nigræ ante apicem al-
bae. Caput nigrum palpis subtus flauis. Thorax
ater lateribus flauis. Abdomen barbatum, atrum
cingulo secundi segmenti flavo, praetereaque pun-
cta vtrinque duo lateralia flaua. Pectoris latera flaua.
14. S. alis anticis fuscis posticis fenestratis, abdomine bar- *afilifor-*
bato atro: cingulis tribus flauis. *misis.*
Sphinx afiliformis Wien. Verz. App. 305.

Habitat in Europa australiori Dom. Schieffermyller. Kiliiae Dom. Daldorf.

Minor S. apiformi. Palpi apice flani. Caput atrum linea oculorum argentea. Thorax ater margine antico tenuissime flauo punctoque flauo ante alas. Abdomen atrum, nitidum cingulis tribus flauis. Alae anticae fuscae, immaculatae, posticae hyalinae margine postico nigro. Tibiae posticae flauae.

haemorrhoidalis. 15. S. alis hyalinis: margine fasciaque anticarum nigris, ano barbato sanguineo.

Thorax puncto vtrinque albo. Abdomen basi sanguineum.

culiciformis. 16. S. alis hyalinis: margine fasciaque nigris, abdome barbato? cingulo fuluo.

Esp. Inf. 2. tab. 15. fig. i.

Wien. Verz. 44. 3.

tenthrediniformis. 17. S. alis fenestratis: margine omni fasciaque nigris, capite thoracis lateribus abdominisque barbati cingulo fuluo.

Sphinx tenthrediniformis Wien. Verz. 44. 6.

Habitat in Europa australi Dom. Schieffermyller.

Parua. Antennae nigrae. Caput thoracisque latera fulua. Pedes fului geniculis nigris.

tipuliformis. 18. S. alis fenestratis: margine fasciaque nigris, abdome barbato nigro: incisuris alternis margine flauis.

Esp. Inf. 2. tab. 15. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 224. fig. 1. 2.

Wien. Verz. 44. 4.

Habitat in medulla Ribis rubrae.

Larua solitaria, subpilosa, albida, capite pedibusque flauis lineaque dorsali obscuriore.

Ichneumoniformis. 19. S. alis fenestratis: margine fasciaque nigris puncto fuluo, abdome cingulis albis nigrisque alternis.

Sphinx Ichneumoniformis Wien. Verz. 44. 7.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Antennae nigrae interdum basi luteae. Caput albidum vertice nigra. Thorax niger lateribus flauis. Abdomen cingulis albis nigrisque latioribus alternis. Alae anticae nigrae margine omni fuso et in medio fascia nigra puncto fuluo, posticae hyalinae margine postico punctoque ad marginem interiorum nigris. Pedes flavi.

20. S.

20. S. alis fenestratis margine fasciaque nigris, abdomi- *vespiformis*
ne barbato nigro: segmento secundo ultimisque mis.
margine flavis.

Sphinx vespiformis Linn. Syst. Nat. 2. 804. 33. In. Sr.
1097.

Sphinx vespiformis Wien. Verz. 44. 5.
Habitat in Europae floribus.

150. ZYGAENA; *Palpi* duo reflexi.

Lingua exserta setacea.

Antennae medio crassiores.

1. Z. alis anticis cyaneis: punctis sex rubris, posticis ru- *Filipen-*
bris margine cyaneo. *dulae.*

Esp. Inf. 2. tab. 16.

Wien. Verz. 45. 4.

Variat rarius abdominis cingulo rufo.

Sphinx Peucedani Esp. pap. 2. tab. 25. fig. 2.

Roes. Inf. 1. tab. 57. fig. 6.

2. Z. atra, alis anticis viridibus: maculis tribus oblongis approximatis sanguineis, posticis rubris. *Pythia.*

Sphinx Scabiosae Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 3.

Sphinx Pilosellae Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 2.

Habitat in Pilosella.

Larua pilosa alba, capite lineis duobus punctorum pedibusque anticis nigris, posticis flavis.

3. Z. cyanea alis anticis viridibus: punctis quinque rubris, posticis sanguineis: limbo cyaneo. *Fulvia.*

Sphinx Lonicerae Esp. Inf. 2. tab. 24. fig. 1.

Sphinx Loti Wien. Verz. 45. 3.

Habitat in Loto corniculato.

4. Z. cyanea, alis anticis maculis tribus connatis, posticis totis rubris. *Sedi.*

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Statura omnino praecedentium. Corpus totum cyanum, nitidum. Alae anticae cyaneae maculis tribus magnis una post alteram positis annulo flavo cinctis rubris. Posticae rubrae margine tenuissime nigro.

5. Z. viridi atro, alis punctis fenestratis: antarum sex, *Phigaea.*
posticarum duabus, ab domine cingulo luteo.

Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 1. 2.

Larua fusca, capite pedibusque rufescentibus, dorso plumis fasciculatis albidis.

Ephialtes. 6. Z. cyanea, alis anticis punctis sex rubris, posticis unico, abdomine cingulo rubro.

Sphinx falcatae Wien. Verz. 45. 6.

Sphinx Coronillae Wien. Verz. 45. 7.

Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 3.

Variat punctis baseos vti et cingulo abdominalis aut flauis aut rubris.

Larua pilosa flauescens, capite pedibus lineisque duabus nigris.

Aeacus. 7. Z. cyanea, alis anticis punctis sex flauis, posticis flauis: margine cyaneo.

Sphinx Aeacus Wien. Verz. 45. 8.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo Z. Ephialtes. Corpus cyaneum, nitidum cingulo abdominalis flauo. Alae cyaneae punctis sex flauis 2. 2. 2. oblique positis. Posticae flauae margine late cyaneo.

Agrius. 8. Z. nigra, alis hyalino punctatis: anticis atris, posticis cyaneis.

annulata. 9. Z. nigra alis anticis maculis sex, posticis basi maculaque flauis, abdomine flano annulato.

cervinolica 10. Z. atra, alis anticis cyaneis: punctis sex sanguineis ocellatis, posticis rubris: limbo nigro.

Sphinx caffra Esp. Inf. 2. tab. 27. fig. 4.

Sphinx Onobrychis Wien. Verz. 45. 5.

Habitat in Aedysaro Onobrychis.

Variat abdomine immaculato et cingulo rubro.

caffra. 11. Z. nigra alis fuscis: punctis quinque sanguineis, posticis rubris: margine fusco.

Cram. Pap. 33. tab. 394. fig. E.

guineensis 12. Z. alis fuscis: maculis duabus albis, abdomine cyaneo: cingulo fuluo.

Passalis. 13. Z. alis nigris: punctis fenestratis anticarum sex, posticarum unico, abdomine cingulis cyaneis sanguineisque alternis.

14. Z. alis nigris: punctis fenestratis anticarum sex, posticarum duabus, abdomine cingulis sanguineis. *Cerbera.*
15. Z. coerulea, humeris rubro punctatis, alis nigris: anticis apice, posticis disco hyalinis. *Thetis.*
16. Z. alis atris albo punctatis, abdomine flavo nigro lineato. *Phlegmon.*
17. Z. alis nigris: anticis maculis quinque, posticis brevissimis; disco hyalino, abdomine flavo nigro annulato. *Thelebus.*

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Caput flavum ore nigro. Thorax flavus collari nigro. Abdomen flavum annulis sex nigris. Alae anticae nigrae basi parum flavescentes maculis quinque magnis hyalinis. Posticae breves, hyalinae margine nigro. Pedes nigri tibiis apice albicanibus.

18. Z. alis atris: anticis maculis quinque, posticis unica *Sperbius.* fenestratis, abdomine atro: fasciis duabus flavis, fronte alba.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae apice albae. Caput nigrum fronte late alba. Thorax ater scutello flavo. Abdomen atrum annulo baseos medioque flavis. Anus albus macula unica subflavescente.

Variat rarius ano nigro. Frons semper alba.

19. Z. alis fuscis: maculis anticarum quatuor posticarum *fenestrata* unica hyalinis, abdomine flavo nigroque annulato.

20. Z. fusca, abdomine utrinque maculis quinque coeruleis, ano ore basique femorum abdominisque cocaineis.

Cram. Pap. 33. tab. 394. fig. G.

21. Z. nigra viridi maculata, alis anticis maculis tribus, posticis unica aureis. *Hyparchus.*

22. Z. alis virescenti atris: maculis aureis posticis fuscis *Argynnus* basi aureis.

23. Z. atra, alis hyalinis: margine omni nigro, abdomen sanguineo: linea dorsali cingulisque atris. *Myrtea.*

- Andromacha.* 24. Z. atra, alis hyalinis; margine fasciaque nigris, ano sanguineo.
Conf. Sphinx Caunus Cram. Ins. 19. tab. 224. fig. E.
- flauicor-* 25. Z. alis flauo hyalinis; anticis apice fuscis, corpore cyaneo flauo maculato, antennis pedibusque flavis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magna in hoc genere. Antennae pectinatae apice setaceae, flavae. Caput flavum. Thorax nigro cyaneus punctis duobus anticis, habenis maculisque duabus posticis flavis. Macula quadrata, late emarginata loco scutelli. Abdomen cylindricum, cyaneum segmentis anticis tribus supra fascia interrupta flava, subtus punto medio niveo. Alae flavescentes, hyalinae, anticis apice fuscis. Pedes flavi.
- Bromus.* 26. Z. ferruginea, alis hyalinis; margine omni nigro.
- Eryx.* 27. Z. alis atris anticis basi aureis; macula media abdome que subtus sanguineis,
- Egeon.* 28. Z. alis hyalinis; anticis margine omni flauo.
- Achemon.* 29. Z. flava, alis hyalinis apice nigris, anticis basi flavis, *nigricer-* 30. Z. alis hyalinis; margine nigro, corpore flauo, ante- ce posticeque atro cyaneo maculato.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr,
- Parua.* Antennae pectinatae, nigrae. Caput nigrum ore flauo palpis nigris punctoque verticis cyaneo, Thorax flatus antice ater maculis quatuor approxi- matis cyaneis. Abdomen cylindricum, flavum ano atro strigis duabus cyaneis. Alae albo hyalinae mar- gine omni tenuissime nigro. Pedes flavi apice nigri,
- Melissa.* 31. Z. alis atris; disco hyalino, abdome nigro; lineis tribus aureis, ano fulvo.
- Polyme-* 32. Z. nigra, alis maculis luteis anticarum tribus, posti- carum duabus, abdome cingulis duobus coccineis,
- Letha.* 33. Z. alis nigris; maculis duabus luteis, abdome cin- galis rubris nigris cyaneis alboque.
- Lichas.* 34. Z. nigra viridi inicans, alis striga media viridi pun- ctisque medio albo, abdome atro; cingulis duo- bus aureis. Sp. Ins. App. 505.

35. Z. alis concoloribus rubris: maculis nigris margine *fausta*. nigro connexis.
Esp. Inf. 2. tab. 18. fig. 1.
36. Z. alis fuscis posticis internis sanguineis, antennis *infausta*. pectinatis.
Fyesl. Arch. Inf. Monogr. cum fig.
Esp. Pap. 2. tab. 35. fig. 4.
37. Z. virescens alis posticis atris: fascia alba, antennis *Eriphia*. pectinatis.
38. Z. alis oblongis atris; posticis subcaudatis basi vire- *flabellicornis*. scensibus,
39. Z. alis virescentibus nitidis apice obscurioribus, ab- *Butus*. domine fuluo.
Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.
Medius. Antennae pectinatae, nigrae, Caput et thorax virescentia, nitida. Alae concolores, virescentes, nitidae in margine magis obscuro. Corpus subtus vti abdomen totum fuluum. Anus nigricat.
40. Z. cyanea albo punctata, alis rubris; margine posti- *Pugione*. co fuso.
41. Z. alis apice fuscis: striga punctorum alborum anten- *Eurocilia* nis pectinatis.
42. Z. subfusca, alis violaceis: fasciis duabus albis sub- *pectinicornis*. interruptis, collari sanguineo.
43. Z. alis fuscis: anticis maculis duabus, posticis vitta *Gyon*, abbreviata flavescentibus.
Habitat Cajenae Dom. v. Rohr.
Statura omnino Z. pectinicornis at duplo fere minor.
Antennae pectinatae, nigrae, apice simplices. Caput nigrum palpis reflexis albidis. Thorax niger lineis quatuor albis. Abdomen cylindricum nigrum lineis tribus albis. Alae concolores fuscae, antiae basi albo lineatae maculisque duabus posticis flavescentibus, posticae vitta lata flavescente. Pedes cinerei.
44. Z. alis atris: anticis fascia apicis alba, thorace fuluo. *Ergotis*.
45. Z. alis nigricantibus, anticis fascia obliqua nivea. *Glaucopis Phalaena* *Glaucopis* Cram. Pap. 27. tab. 322. fig. D.

Erynnis. 46. Z. alis atris: anticis fascia obliqua testacea.

Pylotis. 47. Z. alis atris: anticis vtrinque posticis subtus macula niuea.

Habitat Surinami Doct. Schulz.

Parua. Antennae desunt. Caput et thorax atra collaris sanguineo. Abdomen flauum. Alae omnes atrae anticis vtrinque macula magna media niuea. Apex alae albicat. Posticae supra immaculatae, subtus macula minori niuea. Margo posticis vtrinque parum albicat.

Syphilis. 48. Z. alis atris: anticis vitta interrupta, posticis basi testaceis, abdomine punctato.

Scyton. 49. Z. alis albidis, abdomine atro flauo fasciato, ano rubro.

Auge. 50. Z. nigro coeruleoque varia lateribus piloso sanguincis, alis fenestratis postice nigris, antennis pectinatis. Antennae apice setaceae.

S. maculata. 51. Z. alis concoloribus nigris: maculis duabus anticearum flavis, posticarum albis.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Media. Antennae cylindricae nigrae apice subattenuatae. Caput nigrum ore orbitaque oculorum flavis. Thorax niger habenis flavis. Abdomen nigrum, immaculatum. Alae nigrae anticis maculis duabus magnis albis. Pedes nigro tibiis basi fulvo villosis.

capistrata. 52. Z. alis nigris: anticis fasciis duabus posticis disco fenestratis, abdomine sanguineo dorso nigro.

caudata. 53. Z. alis flauo hyalinis apice fuscis, corpore auro maculato.

Cauda longitudine corporis. Antennae pectinatae.

diptera. 54. Z. alis fuscis: anticis maculis quinque fenestratis, posticis breuissimis: macula flava.

halterata. 55. Z. alis hyalinis: macula fusca, posticis breuissimis filiformibus nigris.

Maja. 56. Z. alis cyaneo nigris, abdomine basi albo punctato, pedibus posticis compressis elongatis ciliatis.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Media. Antennae subpectinatae, nigrae superne ante apicem albae. Caput cyaneo nigrum punto vtrinque

que sub antennis albo. Thorax et pectus cyanea albo punctata. Abdomen cyaneum basi supra infraque albo punctatum. Alae nigrae, nitidae basi fasciaque cyaneis. Pedes nigri geniculis albis tibiis tarpisque posticis compressis elongatis ciliatis apice albis.

57. Z. alis anticis fuscis, posticis hyalinis, pedibus posticis elongatis hirsutissimis. *tibialis.*

58. Z. atra, alis anticis puncto baseos abdomine maculis *Ladis.* transuersalibus flauis, pedibus posticis elongatis.

59. Z. fusca collari flauescente, abdomine basi cingulo niveo. Sp. Inf. 2. App. 505. *Eunolophus.*

60. Z. nigra alis anticis apice albis. *Capys.*

61. Z. atra, alis basi luteis. *Pholus.*

62. Z. viridi coerulea, alis posticis fuscis. *Statices.* ✓

Esp. Pap. 2. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Rumice Acetosa, Globularia.

Larua nigricans: lineis dorsalibus duabus lunularum albarum.

63. Z. viridi coerulea, alis posticis nigris. *Prunt.* ✓

Sphinx Pruni Wien. Verz. App. 308. 12.

Habitat in Pruno spinosa Austriae Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis Z. Staticis, at duplo fere minor et larua alia.

Larua alia pilosa fusca, dorso carneo: linea maculatum atrarum.

64. Z. cyanea, alis fuscis, ano rufo. *Acharon.*

65. Z. corpore alisque cyaneis, thorace rufo. *Styx.*

66. Z. alis anticis fuscis posticis atris: disco subhyalino, *Thoos.* collaris sanguineo.

151. BOMBYX. *Palpi* duo compressi reflexi.
Lingua breuis, membranacea.

Antennae filiformes.

Atlas. 1. B. alis patentibus falcatis luteo variis: macula fenestrata: anticis sesquialtera,
 Cram. Pap. 32. tab. 381. fig. C.
 tab. 382. fig. A.

Hesperus. 2. B. alis patentibus falcatis luteo variis: macula fenestra ta, posticis rotundatis.

Aurotus. 3. B. alis patentibus falcatis concoloribus flavescentibus: fascia albida lunulaque disci fenestrata.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Statura et fere magnitudo praecedentis. Alae omnes flavescentes basi striga vna alteraue albida, in medio lunula magna hyalina, quae postice lunula flava terminatur. Pone hunc fascia lata albida. Macula ocellaris nigra lunula alba in apice alae anticae.

Cecropia. 4. B. alis patentibus griseis: fascia fulua, anticis ocello subfenestrato ferrugineo.

Paphia. 5. B. alis patentibus falcatis concoloribus flavis: strigis rufis ocelloque fenestrato.

*Polyphe-
mus.* 6. B. alis patentibus falcatis griseo carneis: fascia atra ocelloque fenestrato posticarum maiori.

Cytherea. 7. B. alis patentibus griseis: strigis cinereis ocelloque fe-
nestrato.

Phalaena capensis Cram. Pap. 26. tab. 302. fig. A. B.]
Larua brunnea punctis numerosis flavescentibus.

Mylitta. 8. B. alis patentibus falcatis flavis: striga ferruginea ocelloque fenestrato diuiso.

*Prome-
thea.* 9. B. alis patulis subfalcatis margine griseis: anticis vtrinque ocello atro.

*Erithri-
nae.* 10. B. alis patulis fuscescentibus: striga vndata pallida.

11. B. alis patulis: anticis variegatis subtus ocello atro, *Ianus*. posticis sanguineis: ocello atro.
12. B. alis patentibus: anticis coeruleis albo maculatis, *Megaera*. posticis medio albis apice coeruleis flavo vndatis.
Habitat in America boreali Dr. Grandidier.
13. B. alis patulis subfalcatis fuscis margine pallidioribus: *Hippoda-* striga alba anticarum interrupta. *mia*.
14. B. alis patentibus fusco incarnatis, posticis ocello ferrugineo: pupilla fenestrata. *nittans*.
15. B. alis patentibus caudatis versicoloribus: puncto fene- *Semira-* strato, caudis longissimis. *mis*.
16. B. alis patulis caudatis cinereis fusco variis, anticis *Boreasi* punctis duobus, posticis ypto fenestratis.
17. B. alis patentibus caudatis concoloribus virescenti- *Luna*. bus: ocello disci lunato.
18. B. alis patulis caudatis subfuscis: striga alba, posticis *Epime-* ocello disci fuluo. *thea*.
19. B. alis patentibus caudatis pallide ferrugineis: punctis *Argus*. ocellaribus fenestratis numerosis, caudis longissimis.
Phalaena Brachyura Cram. Inf. 3. tab. 29. fig. I.
Habitat in Sierra Leon.
20. B. alis patentibus concoloribus flavis: anticis fene- *feneстра*. stra duplice, posticis simplici.
21. B. alis patentibus flavescentibus fusco irroratis: ocello centrali *Penelope*. fenestrato.
22. B. alis patentibus griseis: strigis albis ocello centrali *Tyrrhea*. atro: pupilla fenestrata.
23. B. alis patentibus fuscis: anticis fascia fenestrata ab- *perspicua*. breuiata.
24. B. alis patentibus flavis: atomis maculis strigaque po- *Armida*. stica violaceis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magna, nostra faemina crassa antennis flavis vix pectinatis. Caput flavum, immaculatum. Thorax flavius macula dorsali violacea. Abdomen flavius primi segmentis, macula dorsali violacea. Alae patentibus flavae atomis sparsis violaceis. Praeterea anticæ maculis tribus: duabus approximatis ad marginem exte-

exteriorem et vnicā solitaria ad marginem tenuiorē baseos strigaque baseos violaceis. Posticæ macula media strigisque duabus abbreviatis anteriore vndata. Subtus flavae macula media violacea. Pedes violacei.

militaris. 25. B. alis patulis concoloribus luteis apice maculisque violaceis: anticis extus albo-maculatis.

Castalia. 26. B. alis patentibus rotundatis medio albis: anticis ocello, posticis puncto fusco.

pauonia. 27. B. B. alis patentibus rotundatis griseo nebulosis subfasciatis: ocello nictante subfenestrato.

minor. a. Wien. Verz. 49. 3. *Epp. Phal. Tab. 4. 8.*

media. b. Wien. Verz. 49. 2.

Epp. Phal. 3. tab. 3

singularis ob faemina maremque simillimus.

maior. c. Wien. Verz. 49. 1. *Epp. Phal. Tab. 1. 2.*

Achelous. 28. B. alis patulis ferrugineis: omnibus fascia anticisque puncto albis.

argulata. 29. B. alis patulis erofo dentatis: posticis truncatis obtusissimis.

Liberia. 30. B. alis patulis, anticis variis, posticis fuluis: ocello atro. Sp. Inf. App. 505.

Tau. 31. B. alis patulis testaceis: ocello subuiolaceo; pupilla hastata alba.

Bombyx Tau Wien. Verz. 49. 8. *Epp. Phal. Tab. 5.*

Io. 33. B. alis patulis flavis, anticis subtus, posticis supra ocello atro: pupilla alba.

Abas. 33. B. alis patulis fuscis: posticis cinereis; ocello rufo.

Phalaena Abasia Cram. Pap. 29. tab. 344. fig. A. B. C.

Salmonea 34. B. alis patulis: anticis fuscis striga atra, posticis rufis ocello nigro: lunula alba.

Proserpina. 35. B. alis patulis rotundatis nigris: fascia alba; macula subocellari nigra.

** *Alis reuersis.*

populifolia. 36. B. alis reuersis testaceis dentatis: lunulis numerosis fuscis.

Bombyx populifolia Wien. Verz. 310. 5. *Epp. Phal. Tab. 6.*

fig. 3. 4. tab. 7. fig. 1.

Habi-

Habitat in Populo alba Austriae Dom. Schieffermiller.
 Maior B. quercifolia. Os nigrum. Thorax testaceus
 linea dorsali nigra. Alae omnes testaceae lunulis nu-
 merosis distinctis fuscis. Posticae semitectae apice
 pallidiores.

37. B. alis reuersis dentatis ferrugineis: strigis vndatis *quercifo-*
fuscis, ore tibiisque *nigris*. *lia.*

Wien. Verz. 56. 1. *Epp. Phil. tab. 6. fig. 1. 2. tab. 6. B fig. 1. 2.*

38. B. alis reuersis semitectis serratis griseis: margine po- *ilicifolia.*
stico albo punctato. *Epp. Phil. tab. 8. f. 1. 2.*

Wien. Verz. 56. 2.

Naturf. 15. tab. 3. fig. 5-14.

Larua cinerea: maculis duabus collaribus fuluis,

Puppa folliculata brunnea.

39. B. alis reuersis subdentatis fuscis immaculatis, abdo- *Promula.*
mine brunneo.

40. B. alis subreuersis ferrugineis: strigis obscurioribus, *Caffan-*
thorace antice brunneo. *dria.*

Habitat — — — — — Mus. Dr. Hunter.

Media. Caput testaceum antennis vix pectinatis palli-
 dis. Thorax obscure brunneus pollice cinereus.
 Abdomen cinereum, immaculatum. Alae anticae
 dentatae, ferrugineae strigis tribus distinctis aliquot-
 que obsoletioribus, obscuris, subtus pallidiores im-
 maculatae. Posticae cinereae, immaculatae.

41. B. B. alis reuersis heluolis: anticis strigis duabus re- *capensis.*
 pandis, posteriore nigra inducta.

42. B. alis reuersis fuscis apice cinereis. *Aiuco.*

43. B. alis reuersis heluolis: posticis basi subtus ferru- *Australa-*
gineis. *fia.*

44. B. alis reuersis brunneis: strigis quatuor pallidis. *quadri-*
Habitat in India orientali Dom. Lund. cincta.

Magna. Corpus hirtum, brunneum. Alae brunneae
 strigis quatuor pallidioribus. Posticae brunneae im-
 maculatae. Antennae pectinatae.

45. B. alis reuersis rufocinereis: fasciis duabus linearis- *Fagi,*
bus luteis flexuosis. *Epp. B. 1. 20.*

Wien. Verz. 63. 2.

54. B. alis subreversis concoloribus luteis: anticis strigis *Hibisci*.
duabus, posticis vnicoloribus.
55. B. alis reversis luteis: strigis duabus annulisque tribus anticarum connatis fuscis. *Cynera.*
56. B. alis reversis griseis: fascia ferruginea punctaque *Pini*.
triangulari albo. *Epp. Phal. tab. 12. f. om. T. 13. f. 1.*
Wien. Verz. 56. 4.
57. B. alis reversis fuscis: anticis puncto fascia marginata dumetii.
que postice luteis. *Epp. Phal. tab. 14. f. 3. 4.*
Larua fusco flavo punctata maculisque transversis atris.
58. B. alis reversis griseis: strigis nigro albis, thorace versicolore.
antice albo. *Epp. Bomb. T. 23.*
Wien. Verz. 49. 2.
59. B. alis reversis ceruinis: strigis duabus albidis, subruberibus nullis. *Epp. Phal. tab. 9. fig. omnes.*
Wien. Verz. 56. 2.
60. B. alis subreversis fusco venosis striatisque, corpore *Vinula*:
albo nigro punctato. *Epp. Phal. tab. 10. fig. 1.*
Wien. Verz. 63. 3.
Esp. Bomb. 3. tab. 18. fig. mal.
Bombyx erminea *Esp. Bomb. 3. tab. 19. fig. 1. 2.* nullo modo differt.
Mas Russiae alis fere totis hyalinis Dom. Boeber.
61. B. alis reversis ferrugineis: striga alba, anticis puncto lanestris.
Eto basique albis. *Epp. Bomb. 3. tab. 17. fig. 2 - 8.*
Wien. Verz. 57. 2.
62. B. fusca antice pallida, alis reversis fusciscentibus: *Populi*.
striga sesquialtera repanda albida. *Epp. B. tab. 25.*
Wien. Verz. 58. 9.
63. B. alis reversis ferrugineis vnicoloribus: puncto albo. *Catax*.
Bombyx rimicola Wien. Verz. 57. 1.
Esp. Phal. tab. 16. fig. 1 - 3.
64. B. alis reversis luteis (brunneis faciem.) puncto albo *Eueria*.
apice pallidioribus.
Bombyx Eueria Knoch. Ins. 1. tab. 2.
Bombyx Catax Wien. Verz. 57. 8.
Phalaena lentipes *Esp. Bomb. 3. tab. 16. 6 - 9.*
Habitat in *Pruno spinosa* Germaniae Mus. Dom. Romani:

Omnino distincta. Mas flavescentia, femina brunnea puncto medio niueo.

Oua aggregata hirsutie matris testa disco impresso.

Larua gregaria, pilosa, brunnea: incisuris nigris maculisque lateralibus coeruleis sulphureo punctatis.

Puppa folliculata, flavescentia.

✓ processio- 65. B. alis reuersis cinereo fuscis: faemina striga obscuriora, mare tribus, *pp. B. tab. 29. f. 1. 2.*

Bombyx processionea Wien. Verz. 58. 10.

pithyo- 66. B. alis reuersis griseis: strigis tribus obscurioribus, campa. posticis pallidis, puncto anali fusco. *pp. B. tab. 29. f. 3.*

Bombyx pithyocampa Wien. Verz. 58. II.

Habitat in Austriae Pino Mus. Dom. Schieffernmyller.

Statura et magnitudo B. processionae. Alae anticae griseae strigis tribus vndatis nigricantibus. Posticae albae macula anguli ani fusca. Corpus hirtum griseum abdome flavescente.

Larua pilosa coerulescens: maculis dorsalibus flavis, capite atro.

rured. 67. B. alis reuersis fuscis: strigis vndatis pallidioribus. Habitat in Austria.

Corpus fuscum, immaculatum. Alae anticae obscure fuscæ strigis vix distinctis repandis pallidioribus. Posticae vti omnes subtus fuscæ, immaculatae.

Mori. 68. B. alis reuersis pallidis: strigis tribus obsoletis fuscis. *pp. B. tab. 24.*

tricolora. 69. B. alis subreuersis coccinea, thorace niueo coccineo punctata, alis anticis niueis: striga punctorum nigrorum.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo B. neufriae. Caput coccineum antennis pectinatis nigris. Thorax niueus punctis sex coccineis in orbem positis. Abdomen coccineum. Alae anticae niueae costa coccinea strigaque media punctorum nigrorum, posticae vti omnes subtus coccineae.

✓ neufria. 70. B. alis reuersis griseis: strigis duabus ferrugineis, subtus vnicolor. *pp. B. tab. 27.*

Wien. Verz. 57. 4.

Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 1. 2.

71. B. alis reuersis obscuris: fasciis duabus pallidis.

Wien. Verz. 57. 5. Epp. B. tab. 28. f. am.

castrensis.

72. B. alis reuersis hyalino albidis: striga pallida, limbo *franco-*
nigro. Epp. B. y. 26. fig. 1. 2.

nica.

Bombyx franconica Wien. Verz. 57. 6.

Habitat in Tritico repente Dom. Schieffermyller.

Minor B. neustria. Antennae fuscae. Caput et tho-
rax hirta flavescentia. Abdomen fuscum. Alae
omnes albo hyalinac limbo neruisque fuscis. Striga
albida in medio.

Faemina maior tota brunnea, immaculata lunula sola
media alae antica parum obscuriore.

73. B. alis subreversis pallidis vnicoloribus: anticis pun- Taraxaci
cto medio fuscō, corpore fuluo. Epp. B. tab. 8. f. 3-7.

Bombyx Taraxaci Wien. Verz. 57. 7.

Habitat in Austriae Taraxaco Dom. Schieffermyller.

Maior. Corpus hirtum, fuluum abdominis dorso ni-
gricante. Alae omnes pallidae, anticis puncto par-
uo fuscō. Pedes apice atri.

Larua pilosa atra fasciis abbreviatis flavescentibus.

74. B. alis subreversis cinereis: anticis punctis quatuor atris subocellaribus. ~~Mao B. mendica. Sch.~~

dilecta. mendica.
mox End. Synt.

Habitat in Austria Dr. Schulz.

Media. Antennae pectinatae atrae. Thorax hirtus,
cinereus. Abdomen fuscum. Alae cinereae supra
punctis quatuor nigris atrinulo albo cinctis. Posti-
cae vti omnes subtus immaculatae.

75. B. alis reuersis cinereis: fascia sinuata obscuriore; Malii
puncto atro.

Habitat in Malo et Corylo Hafniae Dom. de Loewen-
skioldt.

Statura omnino B. castrensis. Antennae valde pectina-
tae. Caput et thorax hirta, cinerea. Alae anticae
cinereae fascia media lata obscuriore, quae antice
posticeque striga sinuata nigra terminatur. In me-
dio fasciae punctum atrum. Striga obsoleta fusca ad
marginem posticum. Posticae vti omnes subtus ob-
scurores striga media fusca.

Larua solitaria, pilosa, brunnea linea dorsali pallidio-
re, sanguinibus coeruleoscentibus.

*B. Malo. var.**Aegia-
ne.*

76. B. alis reuersis obscure cinereis: fascia sinuata obscuriore immaculata.
Reaum. Inf. 1. tab. 44. fig. 7-10.
Habitat in Malo et Corylo Hafniae Dom. de Loewenskiold.
Statura omnino praecedentis. Caput et thorax pilosa, obscure cinerea, immaculata. Alae obscure cinereae fascia lata media sinuata obscuriore. Antennae parum pectinatae. *var. O. Grudagi. Scen.*

Hieracii. 77. B. alis subreuersis atro fuliginosis.*Tinea graminella* Wien. Verz. 133. 1.*Larua intra folliculum e foliis straminibusque.**** *Alis deflexis.**lagopus.* 78. B. alis deflexis flavescentibus: atomis strigisque dubiis fuscis, pedibus anticis porrectis hirsutissimis.*imperialis.* 79. B. alis flavis fusco maculatis, omniibus macula subocellari ferruginea.*crafficornis.* 80. B. alis deflexis cinereis: atomis strigisque vndatis fuscis.*Hyphinoe* 81. B. alis deflexis coeruleis: anticis flavo maculatis.*Cyane.* 82. B. alis deflexis atris hyalino maculatis, posticis lunulis fuluis. Sp. Inf. App. 506.*Cossus signatus.* 83. B. alis deflexis nebulosis, thorace postice fascia atra, antennis lamellatis.

Wien. Verz. 60. 1.

terebra. 84. B. alis deflexis dorso dentatis cinereis: atomis strigisque vndatis fusco ferrugineis, thorace postice striga albida.*Bombyx terebra* Wien. Verz. 60. 2.

Habitat in Germaniae ligno. Dom. Schieffermyller.

Statura B. Cossus at paullo minor. Antennae vix pectinatae albidae. Thorax hirtus fuscus striga postica albida. Alae anticae in medio dorsi angulatae, cinereae strigis vndatis atomisque fuscis. Alae posticae vti omnes subtus albidae. Abdomen albidum ano fusco.

Aesculi. 85. B. nivea, alis punctis numerosis coeruleo nigris, thoro senis.*Hepia-*

Hepialus Aesculi Sp. Inf. 2. 208. 5.
Habitat in Pyri, Aesculi ligno.

86. B. alis deflexis, masculis griseo fuscoque nebulosis, *dispar*. ✓
femineis albidis: lituris nigris. Epp. B. tab. 38.
Wien. Verz. 52. 6.
87. B. alis deflexis albidis: strigis nigris, posticis flauis *Amasis*.
nigro maculatis, abdomine atro: cingulis rubris. ✓
88. B. alis deflexis cinereis: strigis tribus vndatis fuscis. *pudibunda*.
Wien. Verz. 55. I. ✓
89. B. alis deflexis cinereis: atomis nigris strigisque dua- *fasciata*.
bus fuluis repandis.
Wien. Verz. 55. 3.
90. B. alis deflexis cinereis, strigis duabus ferrugineis *bucephala*.
maculaque terminali flava. Epp. B. tab. 29. f. 1-4.
Wien. Verz. 59. I.
91. B. alis deflexis nebulosis posticis brunneis, abdomine *Helops*
brunneo albo annulato.
92. B. alis deflexis viridibus fuso subundatis: maculis *oleagina*. ✓
duabus albis, anteriore pupillata, posteriore maiore.
Bombyx oleagina Wien. Verz. 59. 2.
Habitat in Pruno spinosa Germaniae Dom. Romano.
Antennae pectinatae, ferrugineae vachi alba. Maculae
duae distinctae alae anticae, antica pupilla ferruginea,
postica maiori. Posticae albidae margine fuso.
Larua postice quadridentata, cinerea nigro rubroque
punctata, coillari sanguineo: punctis nigris.
93. B. alis deflexis griseis: stigmatibus albis coadanatis. *coeruleo-*
Wien. Verz. 59. 3. *cephala*.
Antennae thorax et alae antice ferruginea.
94. B. alis deflexis dorso dentatis griseis: maculis duabus *argen-*
tinae; anteriori cordata. *tina*.
Alae dorso dente erecto, valido. Anticae maculis dua-
bus, in medio punctis tribus ante maculas argenteis.
95. B. alis deflexis: anticis rubro flavo nigroque varie- *decora*. ✓
gatis, posticis rubris: margine nigro.
Cram. Inf. 19. tab. 219. fig. F.G.
96. B. alis deflexis supra viridibus: fascia sinuato dentata *Celsia*. ✓
glauca. Linn. Syst. Nat. 2. 143. 8. In Sv. 1141. tab. 2.
fig. 1141. Habi-

Habitat in Sveciae Humulo,
Margo posticus alae anticae ut posticae totae fusca.

Dione, 97. B. alis deflexis albis nigro striatis punctatisque, subtus margin'e purpureo,

Ziczac, 98. B. alis deflexis dorso dentatis apicibusque macula grisea ocellari, antennis squamatis,

Wien, Verz. 62, 5.

Tritophus 99. B. alis deflexis dorso dentatis fusco nebulosis; lunula media ferruginea albo cincta,

Bombyx Tritophus Wien, Verz. 63, 6.

Habitat in Austriae Populo tremula Dom. Schieffermüller.

Statura omnino B. Ziczac. Caput et thorax hirta, fusca. Abdomen cinereum. Alae anticae fusco nebulosae strigis aliquot obsoletis, vndatis, obscurioribus. In medio lunula alba pupilla lunata ferruginea. Posticae albae litura anali fusca,

Larua solitaria nuda viridis gibberibus dorsalibus tribus caudalique obtusa, capite fusco.

elegans, 100. B. alis deflexis glaucis: strigis duabus maculaque media nigris; lunula sanguinea,

Habitat ad Cap. Bon, Spei Mus. Dom. Banks,

Media. Caput fuscum punctis palpisque flavis. Antennae nigrae vix pectinatae. Thorax villosus, cinereus maculis dorsalibus quatuor flavis. Alae glaucae punctis duobus baseos strigisque duabus vndatis in medio nigris. Inter strigas color obscurior macula nigra lunula sanguinea. Alae posticae ut omnes subtus obscurae,

dilatæa, 101. B. alis deflexis exustis: plaga albida, posticis albis,

Bombyx dilatæa Wien, Verz. 62, 1.

Larua glabra postice gibba viridis: linea dorsali alba, laterali flava, pedibus anticis rufis,

Dromeus, 102. B. alis deflexis anticis nebulosis dorso dentatis; linea basi anique flavescentibus,

Wien, Verz. 63, 7.

Ammir, Ins, tab. 14.

Larua solitaria nuda, viridis gibberibus quatuor dorsalibus caudalique reflexa,

103, B.

103. B. alis deflexis glaucis, fascia ferruginea; puncto nigro albo annulato, thorace variegato. *Coryli.* ✓

Wien. Verz. 55. 4.

104. B. alis deflexis obscure cinereis: fascia media lata angulata nigra; macula marginali flava. *flavoua-
cula.*

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax hirta nigra. Alae obscure cinereae nitidulae fascia in medio lata atra, quae postice ad marginem exteriorem angulum format et in hoc angulo macula magna flava. Margo posticus fuscus punctis aliquot atris. Posticae subtus cinereae puncto strigaque postica fuscis. Pedes nigri flauo annulati. Anus flavius. *Vestia lucipora. Schub.*

105. B. alis deflexis: anticis nudis aqueis, posticis cinereis: macula marginali nuda. *nuda.*

Habitat in Amarantho spinosa Indiae Mus. Dom. Banks.

Media. Antennae pectinatae fuscæ, Caput testaceum. Thorax et abdomen cinerea. Alae anticae nudæ, aqueæ basi parum cinereæ, posticae cinereæ macula magna marginali nuda, aquæa.

106. B. alis deflexis hyalino nigris, ab domine villoso *Morio.* atro; segmentis margine flavi. *Eyp. B. tab. 43. f. 6. 7.*

Phalaena Morio elinguis alis nigris atro striatis abdominis incisuris fluorescentibus. Linn, Syst.Nat. 2, 828, 66.

Bombyx Morio Wien. Verz. 50. I.

Habitat in Europæ Lolio perenni Dom. Schieffermyller. Statura et magnitudo B. atrae. Antennæ valde pectinatae, nigrae vachi albida. Alae fere nudæ nigro hyalinae margine obscuriore. Abdomen villosum, atrum annulis quatuor flavi.

Fæmina alis breuibüs hyalino cinereis, ab domine albo.

Larua atra lineis sex verrucarum ferruginearum pilosarum.

Puppa subfolliculata atra pallido maculata.

107. B. alis reflexis hyalino pallide rufescens: puncto *Rubea* medio pallido.

Bombyx Rubea Wien. Verz. 51. 2.

Habitat in Quercu Dom. Schieffermyller.

Praecedente maior. Alae omnes pallide rufescentes se re hyalinae puncto medio pallido. Antennæ pectinatae.

Alphara. 108. B. alis deflexis ferrugineis: puncto medio albo striaque punctata fusca.

monacha. 109. B. alis deflexis albis atro vndatis, abdominis incisuris sanguineis. *Epi. B. tab. 37. fig 1 - 6.*
Wien. Verz. 52. 5.

flavus. 110. B. alis deflexis flauissimis apice punctis tribus nigris.

lutea. 111. B. alis deflexis flauissimis immaculatis.

curtula. 112. B. alis deflexis glaucis: strigis albis maculaque apice testacea immaculata.

Wien. Verz. 55. 2.

Larua pilosa solitaria, cinerea: striis quatuor punctorum ferrugineorum.

reclusa. 113. B. alis deflexis griseis; strigis albidis subanastomosantibus, macula apicis ferruginea: puncto marginali albo.

Bombyx reclusa Wien. Verz. 56. 4.

Roef. Inf. 4. tab. 11. fig. 1 - 6.

Habitat in Germaniae Salice Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis B. curtulae paullo minor. Strigae alarum albae magis interruptae, magis anastomosantes. Macula ferruginea apicis minor puncto tantum marginali albo et puncta atra anguli ani alae anticae omnino desunt.

Larua fusca: linea dorsali cinerea maculis duabus nigris.
Puppa folliculata, brunnea.

anachoreta. 114. B. alis deflexis griseis: strigis albidis, macula apicis fusco ferruginea: striga vndata alba.

Bombyx anachoreta Wien. Verz. 56. 3.

Roef. Inf. 3. tab. 43.

Habitat in Salice, Populo Dom. Schieffermyller.

Affinis praecedentibus. Alae griseae strigis quatuor albidis, quarum ultima macula apicis vndata transit. Ad angulum ani alae anticae puncta duo atra altera maiore.

Larua pilosa fusca: stria dorsali incarnata, verrucis duabus eleuatis punctisque lateralibus rufis.

Puppa folliculata brunnea.

anastomosis. 115. B. alis deflexis griseis: strigis tribus albidis subanastomosantibus, thorace ferruginato.

Wien. Verz. 55. 1.

116. B. alis deflexis flavis s. ferrugineis: strigis duabus *testudo*. *Hyalinus* ✓
obliquis obscurioribus.

Bombyx sulphurea Sp. Inf. 2. 189. 86.

Bombyx testudo Wien. Verz. 65. 1. *dimacodes* Epp. Sch.
Strigae ad marginem exteriorem coeunt.

Larua apoda ouata nuda viridis: lineis duabus dorsa-
libus albidis.

Puppa folliculata, brunnea.

117. B. alis deflexis fuscescentibus immaculatis.

Bombyx asella Wien. Verz. 65. 2.

Habitat in Austriae Populo Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis at triplo minor, tota fusca,
immaculata, nitidula.

Larua apoda, ouata, rubra: linea dorsali flava nigro
punctata, lateribus viridibus.

Puppa folliculata, brunnea.

Hyalinus
asella.

118. B. alis deflexis flavescentibus: fascia lata fusca, ma. *bufo*;
culis flavis. *voo. D. Testudo. Lin. mas*

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Antennae flavescentes.
Corpus flavescentes. Alae anticae flavescentes
fascia lata fusca, quae ad marginem posticum adhuc
magis extenditur. In hac fascia maculae dueae, al-
tera in medio, altera ante angulum ani. Posticae
fuscae angulo ani flavescente. Subtus anticae fuscae,
posticae flavescentes.

119. B. alis deflexis fuscis: maculis tribus viridibus. *cippus*.

120. B. alis deflexis dentatis albidis nigro venosis, pal. *palpina*. *Vipis*
porrectis pennaceis.

Wien. Verz. 62. 2.

121. B. alis deflexis dorso vnidentatis griseis: puncto me- *trepida*. *Vipio*
dio ocellari strigaque postica maculari fuscis.

Bombyx tremula Wien. 49. 4.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.

Magna. Antennae pectinatae, ferrugineae. Thorax
fuscus. Abdomen cinereum. Alae anticae obscure
griseae, in medio puncto oblongo fusco annulo albo
cincto et postice striga e punctis sex fuscis. Dens
validus, erectus niger in medio marginis interio-
ris. Posticae albae margine interiori griseo.

Larua solitaria nuda, viridis, lineis duabus dorsalibus albis, lateralibusque obliquis flavo rufis.

Puppa folliculata dimidia sub terra.

querna. 121. B. alis deflexis griseis: strigis tribus atris albae innotatis.

Bombyx querna Wien. Verz. 49. 5.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae pectinatae, ferrugineae. Corpus hirtum, griseum. Alae anticae griseae strigis tribus vndatis albo marginatis nigris, quarum baseos minima. Ante strigam posticam litura albida. Posticaceae albidae.

Larua postice gibba nuda viridis lineis quatuor flauis spiraculisque atris.

Gnoma. 122. B. alis deflexis subdentatis cinereo albis: vitta marginali atra; macula alba.

capuzina 123. B. alis deflexis denticulatis ferrugineis denticuloque dorsal reflexo.

Wien. Verz. 63. 4.

camelina. 124. B. alis deflexis denticulatis brunneis: omnibus denticulo dorsal.

Wien. Verz. 63. 3.

aulica. 125. B. alis deflexis anticis griseis flavo punctatis, posticis foliis nigro maculatis.

Wien. Verz. 53. 6.

Larua solitaria nigra: verrucis albis, subtus ferrugineo, supra albo pilosa.

heluola. 126. B. alis deflexis heluolis: maculis ordinariis strigaque postica cinereis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Media. Antennae pectinatae. Caput thorax heluola. Abdomen cinereum ano barbato heluolo. Alae anticae heluolae maculis ordinariis strigaque postica fere obsoleta cinereis. Ante strigam puncta aliquot cinerea. Posticæ cinereæ.

vndata. 127. B. alis deflexis cinereis: fasciis duabus fuscis cinereo vndatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Corpus medium, cinereum. Alae anticae cinereae fascia ante medium alteraque pone medium fuscis et in

in his fasciis strigae aliquot cinereae. Ad basin et ad marginem posticum puncta aliquot fusca. Posticæ cinereae.

128. B. alis deflexis flavescentibus: punctis nigris, abdomine quinquefariam nigro punctato. *lubricipeda*.

Bombyx lubricipeda Wien. Verz. 54. 1.

129. B. alis deflexis nigro punctata, femoribus anticis mendica. luteis.

Phalaena mendica elinguis cinerea tota, femoribus luteis Linn. Syst. Nat. 2. 822. 47. mas.

Wien. Verz. 54. 3. mas.

- β. *Phalaena Menthastri* Wien. Verz. 54. 2. Faem. Knoch. Beytr. 3. tab. 2. fig. 5 - 13.

Habitat in Austriae Tanaceto Balsamita Dom. Schiefermeyller,

Mas cinereo fuscus, faemina albida punctis aliquot nigris. Femora antica barba lutea, Abdomen concolor.

Larua pilosa virescens punctis nigris verticillatis, capite flavescente.

Puppa folliculata, brunnea.

130. B., alis deflexis fuscis: punctis dorsalibus albis, posticis nigris: macula media fulua, puncto nigro. *aduena*.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae pectinate nigrae vachii alba. Thorax, abdomen hirta, cinerea. Alae anticae fuscae lincola basi os punctisque tribus costalibus subocellatis albis. Posticæ nigrae macula magna oblonga fulua puncto nigro. Lineola interrupta marginis tenuioris fulua.

131. B. alis deflexis pallide flavis; margine postico ferrugineo. *rutila*.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Parua. Antennae pectinatae, flavescentes. Corpus pallidum. Alae omnes concolores, flavescentes margine postico tenuissime ferrugineo.

132. B. alis deflexis atris: angulo ani flavo, abdomine supra flavo: linea dorsali punctata nigra. *luctifera*.

Bombyx lucifera Wien. Verz. 54. 4. 2. p. B. tab. 43 f. 1 - 5.

Habitat in Plantagine lanceolata Dom. Schieffermeyller.

Statura praecedentium. Caput et thorax atra. Abdomen subtus atrum, supra flavum linea punctorum nigrorum. Alae omnes atrae angulo ani flavo.

- leporina.* 133. B. alis deflexis albis: punctis nigris ramosis, abdome immaculato.

Bombyx leporina Wien. Verz. 67. 8.
Larua albo pilosissima.

- lota.* 134. B. alis deflexis cinereis: punto disci atro posticeque striga purpurascente fracta.

Bombyx lota Wien. Verz. 76. 6.

- laeta.* 135. B. alis deflexis, anticis niueis: fascia lata nigra, antennis filiformibus.

- communi macula.* 136. B. alis deflexis pallide carneis: macula magna dorsali fusca.

Bombyx communi macula Wien. Verz. 85. 7.

Habitat in Europa australiori Dom. Romanus.

Parua. Corpus albidum. Alae pallide carneae macula magna, oblonga marginis tenuioris fusca. Posticae omnino albidae.

- compressa* 137. B. alis compresso adscendentibus niueis: macula communis fusca, centrali grisea; lunula alba.

Phalaena spinula Wien. Verz. 64. 6.

Habitat in Pruno spinosa.

Larua fusca: antice spinis quatuor, postice duobus, acuminata.

Puppa antice brunnea, postice coerulea.

- Milhau-seri.* 138. B. alis deflexis canis: maculis duabus dorsalibus fuscis, antennis apice setaceis.

Bombyx Milhauseri Esp. pap. 3. tab. 21.

Bombyx terrifica Wien. Verz. 63. 1.

- spreta.* 139. B. alis deflexis carneo luteoque variis: stigmatibus albis.

Phalaena spreta Naturf. 21. 27. tab. 3.

Phalaena piniperda spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus rubicundo luteo variis, macula transversali albidiiori dolabriformi; inferioribus griseis pallidius fimbriatis Panz. Monogr. 51. tab. 1. fig. 1-12. optim.

Habitat in Pino sylvestri Germaniae sylvas totas depascens, destruens.

Media.

Media. Antennae simplices vti totum corpus fuscae, immaculatae. Alae anticae carneo luteoque variae striga una alteraue alba. Maculae ordinariae albae, anteriore orbiculata, posteriore veniformi. Posticæ fuscae. Subtus cinereae striga obscuriore.

Larua nuda viridis linea dorsali alba, lateralique ferruginea.

Puppa nuda, ferruginea.

140. B. alis deflexis atris, anticis apice, posticis basi *Lincus*. fuluis.

141. B. alis deflexis anticis griseis apice albo nigroque ^{Ulm. f. 1.} *strigada*.
friatis.

Noctua Ulmi Wien. Verz. 66. 1. ^{id Ead. fig. 153.}

Habitat in Germaniae Ulmo.

Antennae muris apice setaceae vti in *B. Milhauseri*.

Larua virens bicaudata: lineis pallidioribus, capite fusco.

Puppa nuda brunnea.

142. B. alis deflexis albis: costa atra.

Begga.

Phalaena Begga Cram. Inf. 30. tab. 345. fig. E.

Habitat Surinami.

Corpus album. Antennæ flavae. Pedes flavi apice nigri.

143. B. alis deflexis albis V nigro notatis. ^{Epp. B. 1. 40.} *Vnigrum*
Bombyx niuosa Wien. Verz. 52. 1.

144. E. alis deflexis niueis, ano barbato ferrugineo.

Wien. Verz. 52. 3. ^{Epp. B. tab. 39. fig. 1-5.}

Aliam minorem alis subtus fuscescensibus ex India orientali vidimus, vix tamen distincta.

chrysorrhoea.

145. B. alis deflexis albis: anticis subtus costa fusca, ano auriflua. ^{Epp. B. tab. 39. fig. 6. 7.}

Bombyx aurifluu Wien. Verz. 52. 4.

Roes. Inf. 1. Phal. 2. tab. 21.

Habitat in Germaniae Pyro, Pomona Dom. Schieffermyller.

Summa affinitas *B. chrysorrhoeae* differt tantum costa alae anticae subtus nigra. Puncta interdum nigra sparsa in pagina superiori alarum.

Larua pilosa, nigra rubro lineata punctisque laterilibus albis, verruca collari caudalique.

146. B.

- bicolora.* 146. B. alis deflexis albis: macula magna lutea nigro notata.
Phalaena bicolora Wien. Verz. 52. 4.
 Naturf. 12. tab. 2. fig. 9. 10. *Epp. T. III. Tab. 41. 7.*
 Habitat in Saxonia Mus. Dom. Romani.
 Affinis B. chrysorrhoeae. Corpus album, immaculatum.
 Antennae vachi alba pilis luteis. Alae omnes albae
 anticus in medio ad marginem tenuiorem macula
 magna lutea punctis aliquot nigris. Praeterea pone
 maculam in primis in faemina puncta aliquot nigra.
- Salicis.* 147. B. alis deflexis albis, pedibus nigris albo annulatis.
Bombyx salicis Wien. Verz. 52. 2. *Epp. T. III. Tab. 41. 1.*
- Cassinia.* 148. B. alis deflexis griseis: lineolis abbreviatis nigris
 sparsis.
Bombyx Cassinia Wien. Verz. 61. 1.
 Habitat in Austriae Tilia Döm. Schieffermüller.
 Magna. Thorax cinereus linea dorsali laterali queatrat.
 Alae anticae griseae lineis aliquot atris. Versus mar-
 gine in posticum striga fere obsoleta angulata, palli-
 da. Alae posticae pallidae. Subtus albidae macula
 centrali fusca.
- Centroli-
nea.* 149. B. alis deflexis cinerea fuscoque nebulosis: linea
 centrali alba atrae innata.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Magna statura B. Cassiniae. Antennae ferrugineae. Cor-
 pus hirtum. Thorax griseus, Abdomen fuscum.
 Alae cinereo-fuscoque nebulosae atroque parum vnde-
 datae, in medio linea abbreviata nivea atro vtrin-
 que marginata, subtus griseae disco fuso. Posticae
 supra obscurae, subtus albidae macula centrali fusca.
- Erataegi.* 150. B. alis deflexis rotundatis cinereis: fascia obscuriore,
 ano barbato Wien. Verz. 58. 8.
- Eridanus* 151. B. alis deflexis nivea, abdomine fulvo annulato.
- tibialis.* 152. B. alis deflexis niveis, tibiis anticis flauescentibus
 nigro punctatis.
- nitidula.* 153. B. alis deflexis niveis: anticis maculis duabus costali-
 bus flaueaque marginali glaucis nitidulis.
 Habitat in Coromandel. Dom. Vahl.
 Media. Corpus niveum, immaculatum. Antennae
 filiformes, simplices, flauescentes. Alae anticae ni-
 veae

ueae maculis duabus costalibus fuscō glaucis nitidulis, anteriore oblonga. Fascia lata marginalis eiusdem coloris, margo tamen ipse albus punctis coerulecentibus. Posticea concolores albae apice fuscae.

154. B. alis deflexis subferrugineis: striga flauescente, antennis maris pectinatis. *plumigera.*

Bombyx plumigera Wien. Verz. 61. 2.

Habitat in Acere campestris Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus hirtum, ferrugineum. Alae anticae mox ferrugineae, vnicolores, mox flavo mixtae striga pallidiore, posticae immaculatae. Abdomen flauescens. Antennae maris radiis longissimis.

Larua solitaria glabra viridis albo lineata.

155. B. alis deflexis albidis: costa palpisque ferrugineis. *obsoleta.*

156. B. alis deflexis, anticis cinereis, posticis nivis. *Corones.*

157. B. alis deflexis flauescentibus basi coeruleo maculatis *festiva.* apice nigro punctatis.

158. B. alis deflexis fuscis, abdome fulvo: punctis annoque nigris. *Dryas.*

159. B. alis deflexis luteis; margine sanguineo lunulaque *russula.* fusca, antennis sanguineis.

Bombyx russula Wien. Verz. 54. 13.

160. B. alis incumbentibus fuscis: linea punctisque duabus rubris, posticis rubris nigro marginatis. *Iacobaea.*

161. B. alis deflexis luteis: anticis flavis nigro striatis, grammatica posticis fascia terminali nigra. *ca.*

Wien. Verz. 54. 12.

162. B. alis deflexis anticis flavis fuscō punctatis, posticis purpurea, rubris nigro maculatis. *Plantaginis.*

Wien. Verz. 53. 9.

163. B. alis deflexis atris: riuulis albis, posticis luteis: *Plantaginis.* margine maculique nigris. *Epp. Bonn. 3. 18. 36. Jan.*

Wien. Verz. 53. 4.

- Variat in Russia boreali frequens alis posticis albis maculis margineque nigris. *Phalaena hospita* Wien.

Verz. App.

164. B. alis deflexis atris: vittis tribus abbreviatis albis. *vittata.*

- Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Statura B. Plantaginis. Antennae vix pectinatae nigrae. Caput nigrum puncto frontali albo. Thorax albus punctis duobus anticis lineolisque tribus latis atris. Alae anticæ atrae, vittis tribus diunidiatis albis: duabus marginalibus. Margo posticus parum albicat. Posticae atrae macula baseos rubra. Subtus concolores.

✓ **Iugubris.** 165. B. alis deflexis flauis; riuulis punctisque atris, posticis fuscis.

Noctua sulphurea Wien. Verz. 93. 6.

Habitat in Convolvulo arvensi.

Larua semigeometra nigra: linea laterali flavescente.

✓ **Vidua.** 166. B. alis deflexis fuscis: anticis cinereo subfasciatis, posticis macula baseos fasciaque rufis.

Wien. Verz. 91. 9. *Dh. Noctua Parthenias* Linn.

Habitat in Populo alba.

Larua nuda viridis rubro lineata.

Matronula. 167. B. alis deflexis fuscis externis flavo maculatis, inferioribus flauis nigro fasciatis.

Phalaena Matronula Linn. Syst. Nat. 2. 835. 92.

Wien. Verz. 53. 5.

Roef. Inf. 3. tab. 39. fig. 1. 2.

Merian. Europ. 58.

Habitat in Artemisia vulgari.

Magna thorace nigro lineis duabus sanguineis. Abdomen sanguineum dorso nigro maculato.

Faemina maculis alae anticae maioribus, in primis posteriori transuersa.

✓ **Villica.** 168. B. alis deflexis atris: maculis octo albis; posticis flauis nigro maculatis. Wien. Verz. 53. 7. *Epp. Odon. 3. Tab. 34. 1. 2.*

✓ **Hebe.** 169. B. alis deflexis atris albo fasciatis: posticis sanguineis atro maculatis. *Epp. Odon. 3. Tab. 34. 1. 2.*

Bombyx Hebe Wien. Verz. 52. 2.

Variat alis albis nigro fasciatis.

Tarquinius. 170. B. alis deflexis cinereis: macula media atra; linea ramum exferente alba.

Tarquiniæ. 171. B. alis deflexis, anticis nigris: lineata humata inter strigas duas albas.

✓ **Caja.** 172. B. alis deflexis fuscis: riuulis albis, posticis purpureis nigro punctatis.

Bombyx Caja Wien. Verz. 52. I. *Epp. B. tab. 30. 31. 32.*

Variat alis posticis rubris fuluisque, rarius alis fuscis immaculatis.

173. B. alis deflexis albis: anticis fusco maculatis, posticis pudicas immaculatis.

Bombyx pudica Esp. Bomb. 3. tab. 33. fig. 1.

Habitat in Gallia australi Dom. Esper.

Statura et magnitudo B. maculofae. Caput et thorax fusca-thorace lunulis duabus antice connatis albis. Alae omnes albae, antice maculis fere trigonis numerosis fuscis. Posticae immaculatae. Subtus subconcolores, posticis maculis duabus fuscis.

174. B. alis deflexis atris: fasciis duabus dentatis albis, casta. posticis rubris: maculis marginalibus fuscis.

Bombyx casta Esp. Bomb. 3. tab. 33. fig. 2.

Habitat in Germania Dom. Esper.

Statura et magnitudo, B. maculofae. Corpus nigrum. Thorax fascia antica pallida. Abdomen punctis baseros rubris. Alae anticae nigrae fasciis duabus unidentatis albis. Punctum paruum in medio costae et litura versus apicem.

175. B. alis deflexis nigro maculatis: anticis fuscis, posticis rubris. *Epp. Bon. 3. tab. 33. fig. 4. 5.*

Phalaena maculosa Wien. Verz. 59. 10.

Phalaena maculosa Knoch. Beytr. 3. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Germaniae australioris Gallio Aparineo. Mus. Dom. Zschuck.

Magnitudo B. plantaginis. Thorax cinereus lineis tribus atris. Alae anticae fuscae punctis plurimis atris sparsis. Posticae rubrae striga, lunula maculisque tribus marginalibus atris, interiore geminata. Abdomen atrum linea laterali sanguinea, quae tamen apicem haud attingit.

Larua solitaria pilosa nigra verrucis coeruleis lineaque dorsali flava.

176. B. alis deflexis atris: riuulis rubicundis, posticis rubris nigro punctatis. *Virgo.*

177. B. alis deflexis nigris: maculis albis, posticis pureis: macula centrali margineque nigris. *Menete.*

178. B. alis deflexis albis nigro maculatis, posticis subtus defloratis. atris: fasciis albis.

**** *Alis incumbentibus.*

- Crotalariae.* 179. B. alis incumbentibus, anticis purpurascientibus; maculis ocellaribus atris, posticis rubris nigro maculatis.
- Ricini.* 180. B. alis incumbentibus obscuris: maculis numerosis subocellaribus fuscis, posticis rubris nigro macellatis.
- sanguino-tenta.* 181. B. alis incumbentibus niveis: anticis costa sanguinea, posticis maculis atris.
Phalaena latilinea Cram. Inf. 12. tab. 133. fig. D.
- Hera.* 182. B. alis incumbentibus virescenti nigris: riuiulis flavis, posticis rubicundis: maculis tribus nigris.
 Wien. Verz. 53. 3.
- Dominula* 183. B. alis incumbentibus atris: maculis albo flavescentibus, posticis rubris nigro maculatis.
 Wier. Verz. 53. 8.
Larua solitaria.
- credula.* 184. B. alis incumbentibus corporeque atris albo punctatis.
- lectrrix.* 185. B. alis incumbentibus nigris: maculis coeruleis flavis albisque, posticis rubro alboque maculatis.
- furcula.* 186. B. thorace variegato, alis griseis basi apiceque albis nigro punctatis. Wien. Verz. 64. 4. Ep. 19. f. 6. 7.
- colon.* 187. C. alis incumbentibus griseo fuscis: punctis duobus nigris distantibus.
- populeti.* 188. B. alis incumbentibus griseo nitidis: striga postica punctorum nigrorum.
- antiqua.* 189. alis incumbentibus, anticis ferrugineis: lunula alba anguli postici, faemina aptera.
 Wien. Verz. 55. 5.
- gono-stigma.* 190. B. alis incumbentibus fuscis: maculis duabus albis oppositis, femina aptera.
 Wien. Verz. 55. 6.
- paradoxa.* 191. B. alis subincumbentibus fusco cinereoque varijs: macula centrali albida, posticis atris, femina aptera.
 Habitat in Tritico repente Russiae Dom. Boeber.
 Mas niger antennis valde pectinatis rachi albida. Alae fuscae cinereo variae in primis ad marginem tenuiores. Macula magna albida in medio alae et margo posti-

posticus albo punctatus. Posticae atrae ciliis albis.
Femina omnino aptera absque villo alarum rudimento.

192. B. alis incumbentibus nigris: fasciis albis, abdomi- *Zona*.
ne atro: segmentorum marginibus sanguineis, femi-
na aptera.

Phalaena Zonaria Wien. Verz, 100. 5.

Habitat in Germaniae Millefolio Dr. Pflug.

Magnitudo et statura omnino B. antiquae. Antennae
pectinatae, nigrae rachi alba. Thorax hirtus cine-
reus lineis tribus nigris. Alae anticae nigrae vitta
lata abbreviata bascos, quae in primis ad marginem
exteriorem extenditur, fascia in medio obliqua stri-
gaque postica albis. Alae posticae albidae striga me-
dia marginaque postico nigris. Abdomen villosum
atrum segmentorum marginibus sanguineis.

Femina aptera, crassa, villosa, abdominis segmentis
margine sanguineis. Rudimenta alarum vtrinque
duo, brevia, cylindrica, hirta, nigra.

193. B. alis conuolutis atris, fronte abdome que fuluis. *Vimber*.

194. B. alis conuolutis fuluis: maculis albis numerosis *histrio*.
coeruleo cinctis.

195. B. alis incumbentibus flavis: fasciis sex punctorum *Pylotis*.
nigrorum, posticis nigro punctatis.

196. B. alis conuolutis flavis: fasciis sex punctorum nigro- *bella*.
rum, posticis rubris apice nigris.

197. B. alis albis: anticis nigro sanguineo que punctatis, *pulchella*. ✓
posticis apice nigris.

Habitat in Heliotropis, Myosotide arvensi.

Larua hirsuta palleseens: linea dorsali alba punctis ni-
gris rufisque.

198. B. alis depressis rubris atro punctatis, posticis albo *ornatrix*. ✓
nigroque variis.

199. B. alis incumbentibus, anticis fuscis: fascia flava, po- *priuerna*.
sticis fuluis: margine atro.

200. B. alis incumbentibus: anticis carneis; vitta inter- *Francista*
rupta atra, posticis hyalinis.

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Caput nigrum vertice carneo. Thorax carneus vitta
dorsali lata atra. Alae anticae supra carneae vitta
lata

lata postice interrupta atra, praeterea puncta aliquot parua atra. Posticae hyalinae, immaculatae. Abdomen subtus fuscum, supra sanguineum maculis dorsalibus atris. Pedes nigri femoribus supra flavis.

Iesuita. 201. B. alis incumbentibus atris: stria fulua.

viciella. 202. B. alis incumbentibus cinereo hyalinis, antennis fuscis.

Tinea viciella Wien. Verz. 133. 2. tab. I. a. fig. 7.
tab. I. b. fig. 7.

Tinea inuolucro palearum vnico teeto Geoff. Inf. 2.
203. 50.

Reauin. Inf. 3. tab. II. fig. 7. 8.

Frish. Inf. 6. 16. tab. 7.

Habitat in Vicia syluatca Europae Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus cinereo lunatum. Antennae pectinatee fuscae. Alae cinereo hyalinae, neruosae, immaculatae. Femina intra puppam oua excludit, nec declaratur.

vestita. 203. B. alis incumbentibus nigris immaculatis, abdomine subtus villoso albo.

Tinea plumella Wien. Verz. 133. 6.

muscella. 204. B. alis incumbentibus obscure hyalinis, corpore atro.

Bombyx muscella Wien. Verz. 133. 3.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus totum hirtum, atrum antennis fuscis. Alae hyalinae, immaculatae.

bombella. 205. B. alis incumbentibus cinereis fusco irroratis.

Tinea bombycella Wien. Verz. 133. 4.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus hirtum, griseum. Alae anticae, cinereae atomis numerosis fuscis, posticae immaculatae.

pectinella. 206. B. alis incumbentibus cinereo hyalinis: anticis strigis obsoletis obscurioribus.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus hirtum nigrum. Alae anticae cinereo hyalinae strigis vndatis vix conspicuis obscurioribus. Posticae immaculatae.

✓ *annulata.* 207. B. alis incumbentibus atris nuceo maculatis, tibiis albo annulatis.

Noctua Consperga Wien. Verz. Epp. Vth.

208. B.

208. B. alis depressis griseis: linea trifurca punctoque albidis. Wien. Verz. 82. 3. Graminis ✓
 Variat magnitudine forte sexu posticeque striga punctorum nigrorum.
209. B. alis incumbentibus fuscis albo venosis, posticis poplaris. ✓
 albidis.
 Habitat in Russia, Germania Dom. Boeber.
 Statura omnino B. Graminis. Antennae pectinatae, fuscæ. Alae anticae fuscæ venis albis. In medio maculae ordinariae pupilla obscuriore. Vertus apicem striga e maculis paruis sagittatis atris. Posticæ albidae margine obscuriore subtusque puncto centrali fusco.
210. B. alis incumbentibus dentatis griseo fuscoque variegatis, thorace antice albo: striga nigra. fulminea. ✓
 Noctua leucophaea Wien. Verz. 82. 5.
 Habitat in Germaniae Achillaea Millefolio.
Larua virescens dorso obscuriore; linea longitudinali alba. *O. lotii* Esper. Schr.
211. B. alis incumbentibus atris rubro flavoque variegatis, Gloriose posticis nigris: margine flavo.
212. B. alis incumbentibus atris ante marginem subferrugineis, posticis albis. Crini.
213. B. alis incumbentibus roseis: strigis tribus fuscis; secunda vndata, tertia punctata. rosea. ✓
 Noctua rubicunda Wien. Verz. 68. 10.
 Habitat in Lichenibus arborum.
Larua brevis hirsutissima: pilis plumosis fasciculatis griseis, ore aurantio.
Puppa folliculata: folliculo denso intertextis capillis.
214. B. alis incumbentibus atra, collaris sanguineo, ab domine flavo. rubricollis. ✓
 Noctua rubricollis Wien. Verz. 68. 11.
 Habitat in Lichene oliuaceo Pini et Fagi.
Larua pilosa nigricans: fasciis atris, capite piceo: triangulo albo.
215. B. alis incumbentibus rubro fuliginosis: puncto gemino nigro, abdomine sanguineo: dorso nigro. fuliginosa. ✓
 Bombyx fuliginosa Wien. Verz. 54. 11.

cribrum. 216. B. alis incumbentibus anticis albis transuerse nigro punctatis Wien. Verz. 68. 8.

obscura. 217. B. alis incumbentibus concoloribus fuscis: anticis punctis tribus albo hyalinis, abdomine flauo: linea nigra.

Phalaena Ancilla alis fuscis: superioribus puncto maculisque quatuor albis; inferioribus luteis margine arcuque fuso. Linn. Syst. Nat. 2. 835. 93.

Noctua Ancilla Wien. Verz. 69. 13.

Habitat in Germaniae Lichene parietino.

Variat alis posticis fuscis immaculatis et flauis margine arcuque fuscis.

Larua pilosa nigra, flauo lineata: linea dorsali maiore, pedibus posticis flauis.

punctata. 218. B. alis incumbentibus concoloribus: anticis fuscis albo punctatis, posticis flauis apice fuscis.

152. HEGIALVS. *Palpi* duo reflexi, reflexi. *Rudimentum linguae bifidae* inter palpos.

Antennae moniliformes.

Humuli. 1. H. alis flauis fulvo striatis maris niueis.
Bombyx Humuli Wien. Verz. 61. 1.

Iodutta. 2. H. alis liuidis: fasciis duabus obscurioribus.
Bombyx Iodutta Wien. Verz. 61. 6.

Habitat in Germania Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae omnes fuso liuidae fasciis duabus altera in medio maiore, altera in ipso margine: Posticae immaculatae.

tupulinus. 3. H. alis cinereis: striga albidiore.
Variat alis cinereis ferrugineisque.

hectus. 4. H. luteus, alis deflexis: anticis fasciis duabus albidis obliquis punctato interruptis.
Bombyx hectus Wien. Verz. 61. 4.

carna. 5. H. alis fuscis: anticis punctis albis nigrisque sparsis.
Bombyx carna Wien. Verz. App. 310. 7.
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura H. hecti at distinctus alis fuscis punctis albis obscurioribusque.

6. H. alis rufo luteis: lineis duabus obliquis albis, anten-*crux.*
nis ferratis.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Statura H. hecti at paullo maior. Antennae valde serratae, rufae. Caput et thorax hirta, grisea. Alae luteae rufo mixtae lineis duabus obliquis albis ad marginem tenuiorcm fere coeuntibus. Posticae uti omnes subtus obscuriores.

7. H. niueus: strigis numerosis abbreviatis nigris *stria-scalaris.*
que longitudinali fulva.

8. H. niueus: alis punctis numerosis transversalibus ni-*pyrinus.*
gris, thorace duodecim cyaneis.

153. NOCTVA. *Palpi compressi pilosi apice cylindrici, nudi.*

Lingua porrecta, cornea.

Antennae setaceae.

1. N. alis patulis variegatis subtus ferrugineis nigro vn-*Zenobia.*
datis.

Phalaena Zenobia Drury Inf. 3. tab. 39. fig. 1. 2.

2. N. alis patulis concoloribus albo nigroque reticulatis *Strix.*
nebulosisque.

3. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndulatis: anticis *Bubo.*
macula magna ocellari brunnea.

4. N. alis patulis dentatis fuscis ferrugineo vndatis, po-*Iphia-*
sticis basi atris: striga coerulescente. *nasse.*

5. N. alis patulis dentatis brunneis nigro vndulatis ma-*Aluco.*
culisque tribus marginalibus flavis.

6. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndulatis: anticis *caprimul-*
ocello coerulescente. *gus.*

7. N. alis patulis dentatis fuscis nigro vndatis: anticis *odora.*
ocello atro: lunula coerulea strigaque macularia alba.

8. N. alis patulis dentatis: anticis vndatis strigaque coe-*Mycerina*
rulea, posticis strigis duabus albis coeruleaque.

Vlula.

9. N. alis patulis dentatis nigro vndulatis: anticis fascia abbreviata alba maculaque subocellaris.

Itynx.

10. N. alis patulis dentatis fuscis ferrugineo vndatis: medio fuluo maculaque geminata: iride alba.

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Parua in hac familia, Alae omnes dentatae fuscae ferrugineo vndatae. In medio alae anticae macula ocellaris ferruginea et pone hanc maculae duae connatae maiores, ocellares, exteriori fulua iride nigra albaque, interiori coerulecente iride atra albaque. Subtus omnes fuscae margine albo punctato. Maculae duae atrae ad marginem interiorem alae posticæ.

spiralis.

11. N. alis patulis griseo fuscoque vndatis: anticis linea spirali conuoluta nigra.

crepuscu-
laris.

12. N. alis patulis fuscis: fascia maculaque marginali albis, anticis ocello,

squalida.

13. N. alis patulis: anticis basi fuscis apice cinereis, omnibus subtus striga vndata alba.

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Corpus magnum, fuscum. Alae anticae supra basi fuscae, apice cinereae, subtus fuscae striga media alba. Posticæ fuscae macula magna media alba, subtus fuscae striga media e lunulis albis. Pedes fusi puncto niueo ad basin tibiarum posticarum, apice spinarum duobus paribus.

pandrosa.

14. N. alis patulis nigricantibus: anticis lunula vitta que niueis.

umminea.

15. N. alis patulis integris obscuris: anticis macula didyma niuea; annulo fuluo Sp. Inf. App. 506.

vespertilio.

16. N. alis patulis integris cinereis: punctis centralibus nigris postice vndatis.

Habitat Tranquebariae Dom. de Sianbusch.

Magua. Caput fuscum. Thorax cinereus lobo antico fuso. Abdomen fuluum. Alae anticae cinereae in medio punctis duobus tribusque nigris. Pone haec striga pallida nigrae innata et tunc fuso vndatae striga punctorum nigrorum. Posticæ eiusdem coloris at absque punctis centralibus. Subtus fuluae lunula strigisque tribus fuscis.

illibata.

17. N. alis patulis fuscis: macula apicis nigra.

* * Tho.

** *Thorace laeui, alis planis incumbentibus.*

18. N. laeuis, alis incumbentibus subdentatis griseis, scrobiculo baseos nigro; posticis vitta marginali nigro. *scrobiculata.*
 19. N. laeuis, alis incumbentibus dentatis griseis, posticis luteis: lunula limboque nigris. *Dioscoreae.*
 20. N. laeuis, alis incumbentibus, posticis fuluis: macula marginaque albo punctato atris. *materna.*
- Cram. Inf. 23. tab. 267. fig. E.
21. N. laeuis alis incumbentibus cinereis, posticis rufescens; macula atra. *micro-rhoea.*
 22. N. laeuis alis incumbentibus griseis: punctis strigisque quatuor fuscis, posticis apice nigris albo maculatis. *serua.*
 23. N. laeuis, alis incumbentibus; anticis viridibus apice fuscis, posticis flavis: macula atra. *Tirrhaea.*
 24. N. laeuis alis incumbentibus; anticis fuscis albo venosis, posticis albo nigroque variis. *Paphos.*

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Statura omnino N. Chione. Antennae setaceae nigrae.

Palpi fului puncto baseos apicisque nigro. Caput fulnum. Thorax fuluus nigro punctatus. Abdomen fuluum supra linea dorsali, subtus vtrinque linea laterali punctorum nigrorum. Alae anticae supra fuscae margine interiori neruisque albis. Subtus fuscae macula media alba. Posticae variegatae.

25. N. laeuis, alis incumbentibus albis, anticis immaculatis, posticis apice virescenti striatis. *chione.*

Variat rarius alis anticis albo lineatis; thorace abdomineque supra fuluis.

26. N. laeuis, alis incumbentibus concoloribus fuscis: disco hyalino, thorace niveo nigro punctato. *Astrea.*

27. N. laeuis, alis incumbentibus fuscis: vitta alba, posticis flavis apice coeruleis. *Narcissus.*

28. N. laeuis alis incumbentibus: anticis fuscis maculis duabus strigaque albis, posticis flavis nigro maculatis. *bajularia.*

29. N. laeuis alis incumbentibus fusco nitidulis: posticis atris; maculis duabus fuluis. *Saga.*

Habitat in Coromandel Dom. Vahl.

Magnitudo N. quercus. Caput et thorax fusca, immaculata. Antennae filiformes, simplices. Alae anticae fuscae immaculatae, subtus nigrae marginis, maculisque duabus flavis. Posticae supra atrae macula magna media lunata fulua, minorique apicis. Subtus ferrugineae nigro irroratae. Abdomen dorso fusco segmentorum marginibus fuluis.

- polita.* 30. N. laevis alis incumbentibus fuscis nitidulis: striga postica punctorum ferrugineorum.

Noctua polita Wien. Verz. 85. 3.

Habitat in Taraxaco, Plantagine Dom. Schieffermyller. Statura omnino N. tetræ. Corpus hirtum, fuscum. Alae anticae fuscae, nitidae versus apicem striga punctorum ferrugineorum.

Larua nuda, testaceo pallida: punctis sparsis nigris.

- tetra.* 31. N. laevis alis incumbentibus fuscis nitidulis: punctis quatuor costalibus albis, posticis cinereo ferrugineis.

Habitat in Austriae Alsine Dom. Schieffermyller.

Sequenti duplo minor. Caput et thorax fusca, nitidula, immaculata. Alae anticae itidem fuscae, immaculatae punctis tribus costalibus paruis versus apicem. Posticae cinereae ferrugineo nitidulae. Subtus cinereae. Antennae pectinatae.

Larua nuda viridis: lineis quinque albis: mediis tenuioribus, capite pallidiore.

- liuida.* 32. N. laevis, alis incumbentibus atris nitidulis: posticis ferrugineis; margine fuscō.

Noctua liuida Wien. Verz. 85. 13.

Habitat in Austriae Taraxaco Dom. Schieffermyller.

Corpus totum vti alae atrae, nitidulae.

Larua vtrinque attenuata, nuda, flavo virescens rubromicans: linea dorsali obscuriore, laterali tenui pallida, variegata, capite pallidiore.

- irrorata.* 33. N. laevis, alis incumbentibus cinereis nigro irroratis, postice striga obsolete rufescente. Sp. Inf. App. 506.

- Quercus.* 34. N. laevis, alis incumbentibus griseis: strigis tribus fuscis.

Noctua trilinea Wien. Verz. 84. 5.

- notacula.* 35. N. laevis, alis incumbentibus cinereis: stigmatibus tribus inter strigas duas flavescentes.

Habi-

Habitat — — — — Mus. Dom. Vahl.

Statura omnino N. *Quercus*. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae striga baseos abbreviata flavescente, ante medium striga altera et pone medium striga tertia flavescentes in medio, posteriori maiori veniformi. Posticæ supra fuscescentes. Subtus omnes cinereæ fusco irroratae.

35. N. laenis alis incumbentibus griseis fuscō vndatis: *4 puncta.* ✓
punctis quatuor marginis exterioris nigris. *ta.*

Noctua calicularis Wien. Verz. 72. 6.

Habitat in Valeriana Locusta.

36. N. laeuis, alis incumbentibus pallidis immaculatis: *pallens.* ✓
marginibus posticis subtus nigro punctatis.

Noctua pallens Wien. Verz. 85. 10.

Habitat in Taraxaco.

37. N. laeuis, alis incumbentibus lanceolatis cinereo fuscō *neruosa.*
scis pallido striatis.

Noctua neruosa Wien. Verz. 85. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Alae singulares, lanceolatae, obscuræ, pallido lineatae. Posticæ albae, immaculatae, subtus fuscae margine albo.

38. N. laenis, alis incumbentibus cinereis fuscō subfascia- *Vaccinii:* ✓
tis postice punctis nigris.

Phalaena Vaccinii spirilinguis alis ferrugineis obsolete nebulosis: puncto strigaque postica septem punctata fuscis. Linn. Syst. Nat. 2. 832. 166. In Sv. 1212.

Phalaena Vaccinii Wien. Verz. 85. 2.

Habitat in Sveciae Vaccinio Dom. de Paykull.

Media. Caput et thorax cinerea, immaculata. Alae anticae cinereae basi punctis duobus in medio fasciaque postica fuscis. Pone hanc fasciam puncta aliquot nigra.

Larua ferrugineo fusca: linea laterali pallidiore, collari caudaque nigris albo striatis.

39. N. laeuis alis depressis plumbeis: margine exteriori *complanata.* ✓
pallidis, posticis totis flavis.

Phalaena complanata Wien. Verz. 68. 4.

Larua pilosa atra: lineis duabus punctorum pallidorum.

40. N. laenis, alis depressis luteis: anticis punctis duobus *quadra.* ✓
cyanecis.

β. Noctua deplana alis incumbentibus cinereis, thorace flavo. Sp. Inf. 2. 215. 29. Mas N. quadrae.

✓ *bicolora.* 41. N. laevis, alis incumbentibus flavis: margine postico late fuscō.

Habitat in Sierra Leon. Dr. Pflug.

Media. Caput et thorax flava, immixtula. Alae anticae itidem flavae puncto paruo medio subferrugineo. Margo posticus late fuscus. Subtus omnes pallidae in margine fuscescente.

Delia. 42. N. laevis, alis conuolutis flavis: anticis fasciis duabus cyaneis.

Habitat in Insula Amsterdam. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino N. complanae. Caput fuluum anten- nis pectinatis nigris. Palpi omnino huius generis basi fului apice nigri. Thorax fuluu, postice cyaneus. Abdomen flauum. Alae flavae anticis costa exteriori, fascia media aliaque apicis cyaneis. Posticae immaculatae. Pedes cyanei femoribus basi flavis.

Capreat. 43. N. laevis, alis ineumbentibus repandis fuscō cinereis nitidulis: strigis tribus obliquis, stigmatibusque albidis.

Habitat in Hafniae Salice Dom. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax hirta obscure cinerea. Alae anticae margine postico repando obscure cinereae strigis tribus albidis, duabus ante, tertia pone medium. Stigmata siue maculae ordinariae albidae, anteriore rotundata, posteriori maiori veniformi. Posticae fuscae margine cinereo. Subtus cinereae atomis puncto medio strigaque postica fuscis.

Larua solitaria, nuda, viridis.

conuoluta 44. N. laevis, alis conuolutis pallidis flavo venosis: anticis maculis duabus angulatis atro coeruleis.

narbonea 45. N. laevis, alis planis: anticis cinereis; strigis duabus flavis posticeque puncto fuscō.

Boleti. 46. N. laevis, alis depressis planis fuscō irroratis, antennis pectinatis.

*** *Thorace laeui, alis deflexis.*

✓ *Ficus.* 47. N. laevis, alis deflexis cinereis: basi fuluo albo nigroque maculatis, antennis pectinatis apice setaceis,

coronata. 48. N. laevis, alis deflexis fuscis: strigis tribus obscurioribus stigmateque postico nigro punctato.

49. N. laevis, alis deflexis brunneis: posticis fascia coerulea margineque nigro. *Manlia.*
50. N. laevis alis deflexis atris flavo maculatis: posticis *Geryon.* rubris; margine atro.
51. N. laevis, alis deflexis brunneis: stigmatibus griseis, *leonina.* posticis flavis: maculis duabus nigris, abdomine cinguli nigris.
52. N. laevis, alis deflexis fuscis albo striatis: posticis albis; margine nigro. *Dama.*
53. N. laevis, alis deflexis variegatis: posticis atris marginae albo,. *marginalis.*
- Noctua marginata* Sp. Inf. 2. 216. 40.
54. N. laevis alis deflexis cinereis: punctis lunulisque marginalibus nigris, subtus macula centrali fusca. *Arundinis.* Schieve Naturforsh. tab. fig. Habitat in Arundinibus caulis equis lethalis.
- Magna. Corpus cinereum, hirtum, immaculatum. Alae anticae obscure cinereae, nitidulae punctis paruis nigris. In margine crassiori puncta tria pallida. Margo posticus lunulis octo atris. Posticae pallidae. Subtus anticae obscurae, posticae pallidae macula centrali fusca.
55. N. laevis alis deflexis virescentibus strigis tribus saturatioribus. *virescens.*
56. N. laevis, alis deflexis: anticis fuscis; maculis quinque incarnatis, posticis albidis. *Batis.* *Phalaena Batis* Wien. Verz. 71. 7.
57. N. alis deflexis heluolis: macula postica nigro punctata. *Silene.* *Noctua Silene* Wien. Verz. 85. 1. Habitat in Brassica campestris Mus. Dom. Schieffermyller. Media. Caput et thorax heluola, immaculata. Alae anticae heluolae striga media abbreviata paullo obscuriore. Maculae ordinariae griseae posteriori veniformi nigro punctata. Variat macula anteriori lunula nigra. *Larua nuda*, obscure fusca, collari nigro albo marginato; stigmatibus nigris.
58. N. laevis alis deflexis substriatis ferrugineis: strigis nitida. flavescentibus, posticis fuscis.

Noctua

Noctua nitida Wien. Verz. 86. 4.

Habitat in Veronica arvensi Mus. Dom. Schieffermyller.
Affinis N. Vaccinii. Alae ferrugineae fere reticulatae
striis vel neruis longitudinalibus strigisque vndatis
flauescientibus. In medio maculae ordinariae. Ver-
sus marginem posticum striga punctorum nigrorum.
Posticae nigrae.

Larua nuda fusco, griseo rufoque varia, capite pal-
lido collari atro: lineis duabus albis.

rubriginea 59. N. laevis alis deflexis flavis ferrugineo vndatis: pun-
ctis nigris sparsis.

Noctua rubriginea Wien. Verz. 86. 8.

Habitat in Pyro Malo Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Antennae fuscescentes. Ca-
put et thorax flava, immaculata. Alae anticae fla-
uae strigis plurimis vndatis ferrugineis. Puncta ni-
gra plurima, in primis versus apicem. Posticae fu-
scae margine fulvo.

✓ *rufina*. 60. N. laevis, alis deflexis rufis: fasciis fuscescientibus;
postica latiore, subtus rufescientibus. Linn. Syst. Nat.
2. 830. 72. Clerk. Icon. tab. 4. fig. 8.

Phalaena heluola In Sv. 1142.

Noctua rufina Wien. Verz. 86. 9.

Habitat in Germaniae Querci Dom. Schieffermyller.
Statura praecedentium fasciis tribus, intermedia te-
nuiori.

Larua nuda hepatica albo punctata lineaque lateralí
alba.

strigosa. 61. N. laevis alis deflexis fusco cinereoque variis: lineo-
lis tribus atris ante marginem interiorem.

Noctua strigosa Wien. Verz. 88. 15.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus cinereum. Alae anticae variegatae strī-
ga apicis vndata. Margo interior fuscens lineolis
tribus longitudinalibus atris. Posticae cinereae.

Fulvia. 62. N. laevis, alis deflexis concoloribus fulvis: margine
nigro.

scutosa. 63. N. laevis alis deflexis fusco alboque variis: posticis
basi albis; macula fuscá; apice fuscis albo maculatis.

Noctua scutosa Wien. Verz. 89. 1.

Habitat in Artemisia campestris Dom. Schieffermyller.

Sta-

Statura et magnitudo N. glyphicae. Corpus griseo fusco. Alae anticae fuscae in medio albae maculis tribus fuscis cinctis, apice fuscae strigis punctisque marginalibus albis, subtus limbo albo punctis tribus magnis atris. Posticae basi albidae macula magna fusca, apice fuscae striga obsoleta maculisque duabus albidis, subtus albae puncto medio, striga macula que apicis fuscis.

Larua virescens nigro punctata lineisque tribus obscurioribus.

64. N. laevis alis deflexis cinereo fuscoque variegatis subtus luteis fuscis fasciatis. *glyphica*. ✓

Noctua glyphica Wien. Verz. 94. 5.

65. N. laevis alis deflexis pallidis: fascia late fusca, posticis albo nigroque variis. *dipsacea*. ✓

Noctua dipsacea Wien. Verz. 89. 3.

Habitat in Centaurea, Plantagine, Fragopagine capitula exedens Dom. Schieffernyller.

Larua rubra lineis albis interruptis, capite cinereo.

66. a N. laenialis deflexis cinereis carneo nitentibus fuscis fasciatis, posticis atris: maculis tribus albis. *Ononis*.

Noctua Ononis Wien. Verz. 89. 4.

Habitat in Ononis spinesae floribus Dom. Schieffernyller.

Statura omnino N. dipsaceae. Alae anticae basi cinereae in medio fascia lata fusca, tunc cinerea. Margo latae fuscus striga parua cinerea. Posticae atrae maculis tribus cinereis.

Larua solitaria nuda: striis roseis ac purpureis alternis: purpurea atomis nigris.

66. b N. laevis, alis deflexis fuscocinereoque variegatis: subtus nigro.

Noctua Mi Wien. Verz. 94. 4.

Habitat in Medicagine falcata.

67. N. laevis, alis deflexis cinereis: maculis quatuor fusciis: anterioribus triquetris, posticis flavis fuscis fasciatis. *triquetra* ✓

Noctua triquetra Wien. Verz. 94. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Romani.

Statura omnino N. Mi. Corpus cinereum. Alae anticae cinereo fuscoque variae macula magna media triquetra nigra, et pone hanc tres fere coadunatae alias

aliae fuscae. Alae posticæ flavescentes fascia baseos
marginaque postico fuscis.

- auida.* 68. N. laeuis, alis deflexis fuscō nitidulis: stigmate fa-
sciaque postico ferrugineis, posticis albis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Media. Caput et thorax nigricantia. Abdomen ni-
ueum subtus fuscum. Alae anticae fuscae nitidulae
stigmate ordinario ferrugineo et pone stigma striga
vndata, obsoleta nigra. Versus marginem posticum
fascia lata marginem exteriorem haud attingens fer-
raginea lunulis flavescentibus. Margo striga vndata
nigra. Alae posticae albae. Subtus anticae fuscae,
posticae albae.

- Roboris.* 69. N. laeuis, alis deflexis cinereis: strigis duabus vnda-
tis albis, macula centrali niuea: lunula nigra.

- mixta.* 70. N. laeuis, alis deflexis pallidis fuscō subfasciatis: po-
sticis basi pallidis apice fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Corpus album immaculatum. Alae anticae
pallidae fuscō subfasciatae, posticae basi pallidae, api-
ce fuscae. Subtus omnes pallidae.

- albicollis.* 71. N. laeuis alis deflexis basi albis apice fuscis: litura
duplici alba.

Noctua solaris Wien. Verz. 90. 8.

Habitat in Taraxaco, Chinopodio.

Larua nuda grisea striata antice posticeque, attenuata,
capite testaceo, segmento singulo punctis duobus
albis.

- italica.* 72. N. laeuis alis deflexis fuscis: strigis ferrugineis macu-
laque transuersa marginali alba.

Noctua luteola Wien. Verz. 90. 7.

Habitat in Plantagine.

- palliata.* 73. N. laeuis alis anticis ferrugineis: puncto apicis atro,
posticis atris: niārgine fuluo.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Magnitudo N. albicollis. Caput et thorax obscure fer-
raginea. Abdomen supra fuscum, subtus cinereum.
Alae anticae ferrugineae striga postica obsoleta cine-
rea punctoque postico distincto atro. Posticae atrae
margine fuluo. Subtus oīmnes nigrae marginibus flavis.

74. N. laeuis alis deflexis cinerascentibus: disco atro; triangulo niueo.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Média. Corpus cinereum. Alae anticae disco atro triangulo magno niueo linea interior obliqua. Costa basi niuea. Margo posticus cineres. Subtus omnes obscurae.

75. N. laeuis alis deflexis albidis: arcu medio maculaque arcuata. postica marginali atris.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Magnitudo et statura N. albicollis. Antennae pectinatae apice nudae. Alae vti totum corpus albidae, nitidae in medio macula ordinaria, quam lunula atra cingit, ad marginem exteriorem crassior. Versus apicem macula magna marginalis atra.

76. N. laeuis, alis deflexis anticis obscure cinereis immaculatis posticis apice nigris albo maculatis. *Vulpina.*

77. N. laeuis, alis incumbentibus griseis fusco maculatis: deflectita. striga alba fuscae innata sub marginali.

78. N. laeuis alis deflexis: anticis variegatis, posticis nigris: fascia maculisque tribus marginalibus atris.

Phalaena Melicene Cram. pap. 27. tab. 323. fig. C. D.

79. N. laeuis alis deflexis: anticis fusco variis; puncto lyncea. medio niueo; subtus flavis fusco vndatis. Sp. Inf. App. 567.

80. N. laeuis alis deflexis fuscis: macula magna atra; fasciis duabus: anteriore niuea. *geometrica.*

81. A. laenis, alis deflexis fuscis: fasciis duabus niueis; stolida. posteriore vnidentata.

82. N. laeuis alis deflexis corporeque albis, antennis linearibus: gualaque testaceis.

83. N. laeuis alis deflexis cinereis: macula transversa nigra postice inaequali albo marginata Sp. Inf. 507. *Joviana.*

84. N. laeuis alis deflexis fuscis: strigis tribus coeruleo-scentibus brunneae adnatis. *inclyta.*

85. N. laeuis, alis deflexis: strigis tribus vndatis maculisque ordinariis miniaceis. *miniosa.*

Noctua miniofa Wien. Verz. 88. 14.

Habitat in Austriae Quercu Mus. Dom. Schieffermyller.
 Statura omnino N. trapezinae. Antennae pectinatae,
 ferrugineae strigis tribus miniaceis. Versus margi-
 nem striga punctorum nigrorum. Posticae albidae
 striga marginali fusca.

Larua nigra: linea laterali interrupta flava, collari
 trilineato.

✓ *trapezina* 86. N. laevis alis deflexis albidis: fascia latissima satura-
 tiore; puncto nigro marginaque punctato.

Noctua-trapezina Wien. Verz. 88. 13.

✓ *Cerafi*. 87. N. laevis, alis deflexis griseo ferrugineis: maculis
 strigaque postica flavescentibus, margine nigro pun-
 cato. *Sp. inf. 58.*

Noctua stabilis Wien. Verz. 76. 2.

Habitat et in Tilia.

Larua viridis: lineis lunulaque postica albis.

✓ *instabilis*. 88. N. laevis, alis deflexis griseis: fascia media ferruginea.
Noctua instabilis Wien. Verz. 76. 1.

Habitat in Austriae Amygdalo communi Dom. Schieff-
 fermyller.

Rufica media. Corpus hirtum, subferrugineum. Alae
 anticae griseae subundatae fascia media vndata ferru-
 ginea. Posticae supra fuscae, subtus cinereae pun-
 cto centrali fusco.

Color alae anticae variat fascia ferruginea tamen sem-
 per constans.

Larua nuda viridis: linea dorsali alba, laterali flava.

humilis. 89. N. laevis, alis deflexis griseis: strigis tribus flave-
 scentibus mediaque fusca, margine punctato.

Noctua humilis Wien. Verz. 76. 3.

Habitat in Leontodonte Taraxaco. Dom. Schieffermyller.

Antennae ferrugineae. Corpus griseum. Alae griseae
 maculis duabus ordinariis annulo flavescente cinctis.
 Strigae tres flavescentes, vnicā ad basin, duabus ver-
 sus apicem et praeterea vnicā in medio, quae macu-
 lam posteriorem transit. Posticae fuscae, subtus albi-
 dae puncto medio fusco.

Larua nuda, obesa, viridis: linea dorsali lateralique
 albis; priore nigro marginata.

Lychnidis 90. N. laevis, alis deflexis ferrugineo fuscis flavo striatis.

Noctua Lychnidis Wien. Verz. 76. 5.

Habi-

Habitat in Lychnidis dioccae capsalis Mus. Dom. Schiefermyller.

Rustica. Corpus griseum antennis ferrugineis. Alae anticae obscureae, subferrugineae striis flavis 6-7. a basi ultra maculas ordinarias ductis, strigam posticam tamen haud attingunt. Versus apicem strigae duae, altera stria fere terminat, altera posterior. Maculae ordinariae in medio. Margo subpunctatus. Posticæ fuscae.

Larua viridis ferrugineo punctata lineaque laterali ferruginea.

91. N. laeuis, alis deflexis: anticis basi pallidis apice vi- *fixa*. rescentibus: striga pallida, posticis flavis: margine nigro.

Habitat in Gibraltar. Dom. Boeber.

Parua. Corpus supra fuscescens, subtus flavum. Alae anticae basi cinerascentes, in media fascia fusca, apice virescentes striga cinerea. Posticæ flavae strigis ante marginem margineque nigris.

92. N. laeuis, alis deflexis brunneis: punctis quatuor ap- *monilis*. proximatis albis, antennis pectinatis. Sp. *59*.

93. N. laeuis alis deflexis griseis: strigis vndatis fuscis, *vndata*. posticis cinereis: fascia marginali nigra. Sp. *60*.

94. N. laeuis alis deflexis dentatis cinereis: strigis fuscis, *vittata*. posticis flavescentibus: vitta marginali atra. Sp. *61*.

95. N. lacuis, alis deflexis cinereis: striga postica flave- *munda*. scente; punctis duobus atris.

Noctua munda Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in Pyro communis Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentium. Maculae ordinariae obsoletiores. Postice striga flavescentes et in hac puncta duo approximata atra.

Variat interdum punctis et duobus atris ad angulum ani.

Larua nuda griseo nigroque varia: linea laterali testaceo rufa.

96. N. laeuis alis deflexis cinereo fuscis: strigis albidio- *blanda*. ribus.

Noctua blanda Wien. Verz. 77. 8.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica media. Alae anticae cinereo fuscae strigis albidioribus. In medio maculae ordinariae et pone has saepe striga punctorum nigrorum. Posticae albidae.

- ambigua* 97. N. laevis cinerea: atomis strigaque pone medium nigris.

Noctua ambigua Wien. Verz. 77. 10.

Habitat in Leontodonte, Soncho, Chenopodio Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica indistincta, cinera punctis aliquot baseos strigaque pone medium nigris. Maculae ordinariae in medio. Posticae albinae subtus puncto medio nigro.

Larua ferrugineo fuscoque variegata capite fuso.

- gracilis.* 98. N. laevis, alis deflexis fuscocinereis: striga vndata fusca baseos, flauescenteque apicis, intermedia punctata.

Noctua gracilis Wien. Verz. 76. 4.

Habitat in Lysimachia vulgari Dom. Schieffermyller.

Noctua fere indistincta. Alae obscurae, basi striga nigrante, in medio maculae ordinariae fere obsoletae, pone has striga e punctis nigris, aliaque flauescens. Posticae subtus albidae striga punctorum nigrorum.

Larua nuda virens lateribus flauescens, incisuris flavis: singulis segmentis punctis quatuor obscuris maculaque antica nigra.

- frugalis.* 99. N. laevis, alis deflexis cinereis: fascia obliqua strigaque punctorum nigrorum.

- flava.* 100. N. laevis, alis deflexis flavis: strigis vndatis ferrugineis.

- stigmatis-
zans.* 101. N. laevis, alis deflexis angulatis flavis: strigis obsecurioribus stigmatoque niveo.

- equestris.* 102. N. laevis, alis deflexis fuscis: fascia lata viridi.

- dorsalis.* 103. N. laevis, alis deflexis viridibus: macula magna communis fusca.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Parua. Palpi porrecti huius generis. Caput et thorax virescens. Alae anticae virides macula magna communis fusca, quae fere fasciam constituit.

- Guttella*
*erythro-
cephala.* 104. N. laevis, alis deflexis atris albo punctatis, capite fulvo.

Habi-

Habitat in Germania Dom. Lund.

Parua. Caput piloso fuluum antennis setaceis nigris. Palpi magni atri, articulo primo pilosissimo, secundo cylindrico nudo. Corpus atrum pedibus apice albo annulatis. Alae anticae atrae punctis plurimis albis quatuor vtrinque marginalibus. Posticae, uti omnes subtus atrae.

105. N. laeuis alis deflexis albis: macula postica virescente. *reiecta*.
 106. N. laeuis, alis deflexis griseis fusco maculatis: posticis flauis striga marginaque postico fuscis. *fortificata*.

Habitat in Germania Dom. Boeber.

Parua. Alae anticae griseac macula baseos, altera in medio sinuata, tertia ad marginem crassiorem fere strigam efficiens. Posticae flauae striga ante marginem marginaque ipso nigris. Subtus flavescentes.

107. N. laeuis alis deflexis: anticis fusco nebulosis: litura maculaque cinereis, posticis nigris.
 108. N. laeuis, alis deflexis lanceolatis cinereis: anticis *Boleti*, fusco irroratis.

**** *Thorace cristato, alis incumbentibus.*

109. N. cristata alis planis cinerascentibus fusco vndulatis: posticis rubris; fasciis duabus nigris, abdomine vndique cinereo. *sponsa*.

Noctua spinosa Wien. Verz. 90. 5.

Minor fascia antica magis angulata.

110. N. cristata, alis planis cinerascentibus: posticis rubris: fasciis nigris, abdomine cano subtus albo. *nupta*.

Noctua rubra Wien. Verz. 90. 4.

Fascia anterior alae posticae magis rotundata, *integra*.

111. N. cristata, alis grisecentibus subundatis, posticis *patta*: rubris; fasciis duabus nigris, abdomine supra rubro.

Noctua patta Wien. Verz. 90. 3.

Abdomen supra roseum. Alae posticae roseae: fascia anteriore marginem interiore haud attingente.

112. N. cristata, alis dentatis fusco cinereoque variis: strigis dentatis atris, posticis rubris fasciis duabus nigris. *promissa*.

Noctua promissa Wien. Verz. 90. 6.

Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffermyller.

Nimis praecedentibus affinis at N. pactae duplo minor.

Alae anticae cinereo fuscoque variae: strigis dentatis atris. Thorax griseus fascia atomisque nigris.

✓ *Fraxini.* 113. N. cristata, alis dentatis cinereo nebulosis, posticis supra nigris: fascia coerulecente.

Noctua Fraxini Wien. Verz. 90. 2.

formosa. 114. N. cristata, alis incumbentibus purpurascens vitta maculisque duabus flavis, posticis fulua macula margineque nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Magnitudo N. pronubæ: Caput nigricans lineis duabus albidis. Thorax purpurascens. Abdomen flavum. Alae anticae vitta versus marginem interiore apicem haud attingente, interrupta maculisque duabus posteriore transuersa flavis. Subtus flavae apice fuscae maculis duabus flavis. Posticae fuluae macula media transuersa margineque posticæ nigris. Subtus concolores.

✓ *pronuba.* 115. N. alis incumbentibus: posticis testaceis; fascia nigra submarginali.

Noctua pronuba Wien. Verz. 79. 20.

✓ *Orbona.* 116. N. cristata, alis incumbentibus hepaticis: posticis flavis; lunula strigaque postica fusca.

Habitat in Germania Dom. Boeber.

Statura omnino N. pronubæ. Caput et thorax hepatica. Alae anticae hepaticæ strigis aliquot punctorum nigrorum obsoletorum. Subtus macula magna nigra. Posticae flavae lunula media strigaque postica fusca, subtus lunula margineque interiori hepaticis.

✓ *Solani.* 117. N. cristata, alis incumbentibus virescenti griseoque variis, posticis rufis: fascia lata submarginali.

Naturf. 9. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Europæ Solano tuberoso, fabis, in aliis laruis saeuiens.

Nimis N. pronubæ affinis, differt tamen alis anticis magis virescentibus. Versus apicem puncta aliquot alba ad marginem crassiorem et iuxta haec macula parua atra. Posticae rufae fascia lata atra. Subtus omnes multo dilutiiores.

Larua

Larua obesa, rugosa, cinerea.

Puppa nuda, brunnea.

118. N. cristata alis incumbentibus dentatis variegatis apice ferrugineis, posticis flavis margine fuscō. *linogrisea*

Noctua linogrisea Wien. Verz. 79. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Affinis N. pronubae, at distinctus alis dentatis anticis valde variegatis apice ferrugineis.

Larua dorso rubicundo lineolis obliquis punctisque nigris.

119. N. cristata, alis deflexis grisels: strigis angulatis nigris, posticis flavis: fasciis duabus arcuatis atris. *hymenaea*

Noctua hymenaea Wien. Verz. 91. 8.

Habitat in Pruno spinosa Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis N. paranympiae, at alae anticae magis griseae absque strigis albis.

Larua flavo virescens: lineis duabus tuberculorum eleuatorum denteque medio eleuato porrecto.

120. N. cristata, alis incumbentibus variegatis, corpore raptā. supra nigro: vitta dorsali alba.

Habitat Tranquebariae Dom. de Slanbusch.

Magna. Antennae ferrugineae rachi alba. Palpi magni albi. Caput et thorax supra nigra linea media albida. Abdomen cinereum dorso fuscō; vitta pallida. Alae anticae variegatae, posticae pallido nigroque variae, subtus flavescentes angulo ani macula transuersa fusca.

121. N. cristata alis incumbentibus variegatis: punctis duobus albis, posticis atris: margine albo. *Epione.*

122. N. cristata, alis planis: anticis fuscis; strigis angulatis albis nigrisque, posticis flavis: fasciis duabus arcuatis atris. *paranympha.* Wien. Verz. 91. 7.

Larua nuda cinerea: tuberculo dorsali luteo caudalique reflexo, acuto, subtus nigro punctata.

123. N. cristata, alis planis griseo fasciatib, posticis heluo-fimbrialis: macula linearis atra. *fimbria.*

Wien. Verz. 78. 18.

Habitat in Primula veris.

Larua obesa ochraceo grisea: linea dorsali, pallida, stemmatibus atris: pupilla alba.

- Ianthina*. 124. N. cristata, alis incumbentibus griseis: litura albida, posticis atris: macula media margineque ferrugineis.
Noctua Ianthina Wien. Verz. 78. 19.
Phalaena domiduca Knoch. Inf. 1. tab. 4. fig. 5.
Phalaena domiduca Fyesl. Arch. 3. tab. 16.
 Habitat in Germaniae Aro. Dom. Romanus.
 In medio alui anticae lunulae aliquot albae.
Larua albida fusco vndata posticeque punctis nigris.
- meretrix*. 125. N. cristata alis incumbentibus griseis: lunula centrali fusca inter strigas albidas, posticis basi albidis. Sp. Inf. App. 507.
- alienata*. 126. N. cristata alis incumbentibus fuluis: maculis ocellariibus flauis; posticis luteis macula margineque nigris.
 Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.
 Corpus paruum, flauum. Alae anticae fuluae maculis duabus basi occupantibus, connatis, tribus in medio fere fasciam constituentibus; tribusque maioribus, tribusque minoribus connatis apicis flauis, omnibus annulo nigro cinctis. Posticae flauae puncto medio margineque nigris..
- Augur*. 127. N. cristata alis incumbentibus fuscis: characteribus atris. Sp. Inv. 77.
- Segetis*. 128. N. cristata, alis incumbentibus ferrugineis: strigis vndatis obscurioribus, posticis albidis. Sp. Inv. 78.
- ambusta*. 129. N. cristata alis incumbentibus griseo fuscis: strigis tribus annuloque medio flavescentibus, striga postica vndata.
Noctua ambusta Wien. Verz. 88. 16.
 Habitat in Lichene parietino Dom. Schieffermyller.
 Parua. Antennæ ferrugineæ basi albidae. Caput et thorax rufo grisea. Alae griseo fuscae strigis tribus annuloque medio oblongo flavescentibus. Posticae albidae apice fuscae.
Larua nuda, fusca alba lineata. Quies 3 mensium.
- subtusa*. 130. N. cristata, alis incumbentibus fuso cinereis: strigis quatuor annulisque tribus flavescentibus.
Noctua subtusa Wien. Verz. 88. 17.
 Habitat in Populo tremula Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentis. Antennae pallidae. Corpus cinereum, immaculatum. Alae anticae obscure cinereae striga parua baseos, altera ante medium, tunc annuli tres, anteriori striga secunda connexa, posteriori inaori, veniformi, demum striga incurua et ultimo striga vndata flavescentibus. Posticae fuscae. *Larua nuda*, albida, albo lineata, capite nigro: fronte alba.

131. N. cristata alis incubentibus fuscō griseis subemarginatis: strigis tribus pallidioribus. Linn. Syst. Nat.

2. 858. 193. In Sv. 1218.

Noctua retusa Wien. Verz. 88. 18.

Habitat in Salice Dom. Schieffermüller.

Distincta alis anticis subemarginatis. Maculae ordinariae in medio.

Larua nuda viridis: lineis dorsalibus tribus, laterali solitaria.

132. N. cristata, alis incubentibus ferrugineis: strigis mercato-fuscis vndatis, posticis apice nigris albo inacutatis. ria.

133. N. cristata, alis incubentibus subdentatis griseis: partita. macula baseos atra, stigmatibus duobus brunneis strigaque media alba.

134. N. cristata, alis incubentibus dentatis cinereo nigroque variis, subtus margine albo.

Noctua maura Wien. Verz. 90. I.

135. N. cristata, alis incubentibus dentatis fuscescentibus in medio griseis: puncto atro lunulaque fusca.

Noctua lunaris Wien. Verz. 94. I.

Habitat in Quercu Austriae Mus. Dom. Schieffermüller.

Antennae fuscae basi albae. Caput et thorax fuscō grisea. Alae anticae basi griseae tunc fuscae striga cinerea, in medio griseae puncto paruo atro lunulaque vel macula veniformi fusca, tunc striga cinerea, demum fuscescentes fascia obsoleta dentata cinerea punctisque ante marginem nigris. Posticae basi cinereae apice fuscae. Corpus magnum abdome cincereo.

Larua ferrugineo fusca pallido punctata, antice punctis duobus sulcis tuberculisque duobus caudalibus.

136. N. cristata alis incubentibus glaucis: puncto lunula que thoraceque antice atris Linn. Syst. Nat. 2. 851. 74.

Noctua lusoria Wien. Verz. 94. 2.

Reaum. Ins. I. tab. 14. fig. 10.

Habitat in Europae Astragalo Glycyphyllo Dom. Schieffermyller.

Larua cinerea nigro punctata: lineis duabus atris, intermediaque interrupta flava.

Craccae. 137. N. cristata, alis striatis cinereis: puncto albido, lunula punctata thoraceque antice atris.

Noctua Craccae Wien. Verz. 94. 3.

Habitat in Vicia Cracca Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentis at paullo minor. Thorax cinereus antice ater. Alae anticae venis striatae cinereae puncto parvo albo ante medium. In medio lunula e punctis aliquot atris. Postice fascia obsoleta obscurior. Costa punctis quatuor fuscis.

Larua fusco griseoque varia, cauda bifida.

✓ **libatrix.** 138. N. cristata, aliis incumbentibus dentato erosis rufo griseis: punctis duobus albis.

Noctua libatrix Wien. Verz. 62. 1.

✓ **plecta.** 139. N. cristata alis incumbentibus fuscis: margine crassiori albo.

Noctua plecta Wien. Verz. 77. 6.

✓ **C. nigrum** 140. N. cristata, alis planis fusco cinereis macula nigra extus albida lineolaque apicis atra. Linn. Syst. Nat. 852. 162. In Sv. 1193. Clerk. Icon. tab. I. fig. 3.

Noctua C. nigrum Wien. Verz. 77. 7.

Habitat in Spinacia oleracea Dom. Schieffermyller. Thorax fuscus antice albus striga ferruginea. Alae posteriae albidae.

Larua cinereo fuscoque varia: lineolis lateralibus transuersis atris lineaque lateralii pallida.

✓ **figuum.** 141. N. cristata alis maculis tribus fuscis: costa baseos cinerascente, thorace fusco antice brunneo.

Noctua signum Wien. Verz. 78. 8.

Habitat in Austriae Atriplice hortensi Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentis. Alae anticae fuscae costa usque ad medium cinerea fusco vndata apice albo punctata. In medio loco macularum lunulæ duæ cohaerentes, atrae. Margo posticus striga punctorum alborum. Posticae obscurae.

142. N.

142. N. cristata alis incumbentibus fuscis cinereo strigosis: lineolis duabus centralibus atris; anteriore arcuata. *Nun atrum*.

Noctua Nun atrum Wien. Verz. 78. 9.

Habitat in Gallio Aparinis Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis N. gothicae. Antennae ferrugineae pectinatae. Alae anticae fuscæ strigis aliquot albido. In medio lineolæ duæ, quarum anterior maior arcuata. Costa ultra medium punctis atris postice cinereis. Posticae fuscæ subtus puncto centrali albo.

Larua glabra, viridis, albo punctata: linea laterali, niuea.

143. N. cristata, alis incumbentibus fuscis: macula media cincta. grisea linea flexuosa atra cincta pupillaque atra.

Noctua i cinctum Wien. Verz. 78. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Media. Antennæ pectinatae, fuscæ. Caput et thorax cinerea. Alæ anticae ultra medium fuscæ. In medio macula magna grisea, et in hac punctum transversum atrum. Maculam ipsam cingit linea flexuosa atra ante basin interrupta. Alæ apice griseæ margine punctato. Posticae fuscæ.

144. N. cristata alis subincumbentibus fuscis maculisque rectangulatis quatuor medii atris, duabus costalibus, thorace antennæ atro.

Noctua rectangula Wien. Verz. 78. 15.

Habitat in Trifolio Melilotus Dom. Schieffermüller.

Statura præcedentium. Caput et thorax ferrugineo fuscæ, hic antice ater. Alæ anticae fuscæ punctis aliquot baseos maculisque quatuor medii, quarum duæ costalis, nigris. Costa albo punctata.

145. N. cristata, alis planis fusco cinereoque nebulosis: *polymita*. angulo ani macula atra. *sp. inv. 84.*

Noctua polymita Wien. Verz. 72. 4.

146. N. cristata alis incumbentibus cinereo nebulosis: *Brassicae*. vno nigro ad maculam priorem. *sp. inv. 85.*

Noctua Brassicae. Wien. Verz. 81. 21.

Larua fuscæ vel viridis: linea dorsali obscuriore stigmatibus albis.

147. N. cristata alis incumbentibus griseis: linea flexuosa flamma- baseos nigra, thorace fascia atra. *tra.*

No-

Noctua flammata Wien. Verz. 80. 1.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Affinis N. exclamationis. Corpus cinereum fascia lata abbreviata thoracis atra. Alae anticae griseae linea magna baseos flexuosa atra. In medio maculae ordinariae macula fusca distinctae.

- Cespitis.* 148. N. cristata alis incumbentibus fuscis: strigis tribus vndatis albidis nigrae innatis, posticis albis.

Noctua Cespitis Wien. Verz. 82. 2.

Habitat in Aira cespitosa Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax fusca, immaculata. Alae anticae fuscae nitidulae strigis tribus vndatis pallidis, vnlca ante medium, duabus pone medium, quae interne terminantur striga atra. In medio maculae ordinariae annulo albo. Posticae albae margine interdum fuscescente.

Larua nuda fuscescens: lineis tribus pallidioribus concurrentibus.

- Chenopo- dii.* 149. N. cristata alis planis cinereis nigro maculatis: striga postica bidentata alba, thoracis crista breui bifida.

Noctua Chenopodii Wien. Verz. 82. 6.

Habitat in Austriae Chenopodio Dom. Schieffermyller.

Media. Antennae fuscae. Caput et thorax cinerea immaculata. Alae anticae cinereae atomis in primis costae marginisque postici nigris. In medio maculae ordinariae. Ante marginem posticum striga cinerea bidentata.

Larua viridis linea dorsali obscuriore, laterali rubra.

- contigua.* 150. N. cristata alis planis fusco cinereoque nebulosis: striga postica bidentata alba, thoracis crista bifida.

Noctua contigua Wien. Verz. 82. 7.

Habitat in Chenopodio bon. Henrico Austriae Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis praecedenti affinis at magis obscura.

Larua viridis capite maculisque duabus primi segmenti brunnens, stigmatibus nigris.

- dentina.* 151. N. cristata alis planis cinereo fuscoque variis: macula marginis interioris strigaque postica flavis.

Noctua dentina Wien. Verz. 82. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae anticae cinereae in medio in primis fuscescentes maculis ordinariis maculaque cinerea bifida. Distincta inacula marginis interioris ad basin strigaque postica vndata flauis.

152. N. cristata alis albido cinerascentibus: anticis subnebulosis, posticis nigro bimaculatis. Linn. Syst. Nat. sa. 2. 856. 184.

Noctua bimaculosa Wien. Verz. 82. 5.

Habitat in Germania.

Larua nuda grisea albo punctata cornubus caudalibus duebus.

153. N. cristata alis incumbentibus fuscis: lineola atra exclamā-
maculaque cordata, posticis atris. Sp. Inj. 86 tionis.

Habitat in Senecione vulgari.

Larua ferrugineo fusca nigro punctata: linea dorsali pallida.

154. N. cristata alis incumbentibus luteo cinereis: macu-
lis duabus centralibus atris apice obscuris. distincta.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis. Caput et thorax hirta.

Palpi subtus fusi. Alae anticae ultra medium luteo cinereae strigis aliquot obsoletis fuscis. In medio macula potius vnicolor oblonga atra stigmata rotundato in duas diuisa. Margo posticus obscurus striga grisea terminalique e punctis atris. Posticae subtus cinereae puncto medio strigaque postica fuscis.

155. N. cristata alis incumbentibus fuscis apice pallidio-
ribus: lineola media duabusque apicis puncto albo
notatis atris. suffusa.

Noctua suffusa Wien. Verz. 80. 4.

Habitat in Soncho arvensi Dom. Schieffermyller.

Corpus fuscum fascia antica atra. Alae anticae fuscae interdum griseo variegatae apice pallidiores. Pone mediump lineola crassa atra et versus apicem duas mi- nores, cuspidatae puncto albo notatae. Posticae albidae.

156. N. cristata alis subincumbentibus cinereis fusco vndatis: linea baseos atra, pupilla apicis oblonga al- bida. signifera.

Noctua signifera Wien. Verz. 80. 8.

Habitat in Cochlearia, Draba. Dom. Schieffermyller.

Caput

Caput et thorax grisea, immaculata. Alae anticae cinereae fusco paullo vndatae. Linea atra a basi usque ad medium ducta, quae apice dilatatur pupilla oblonga, albida. Maculae ordinariae in medio altera oblonga, altera ventiformis. Margo nigro striatus. Posticæ albidae.

Larua nuda cinereo fuscoque varia punctis lineisque nigris, collari flavescente: lineis tribus albis.

- valligera.* 157. N. cristata alis incumbentibus cinereo fuscoque variis: macula oblonga baseos nigricante: puncto ocellari ferrugineo.

Noctua valligera Wien. Verz. 80. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Antennæ pectinatae. Corpus griseum. Alae griseae maculis ordinariis punctisque variis fuscis. Macula magna, oblonga, nigricans ad basin et in hac punctum ferrugineum annulo albido cinctum. Costa fusa punctis tribus albis. Antennæ pectinatae.

- Caecima-* 158. N. cristata alis incumbentibus dentatis griseis: punctis duobus baseos nigris strigisque duabus cinereis.

Noctua caecimacula Wien. Verz. 81. 14.

Habitat in Austriae Sio falcaria Dom. Schieffernmyller.

Media. Corpus griseum antennis fuscis. Alae anticae basi griseae punctis duobus nigris, altero ad basin, altero ante medium in striga ipsa vndata cinerea. Medium parum obscurius maculis ordinariis. Pone has striga altera cinerea. Margo griseus striga punctorum nigrorum.

Larua carnea atomis nigris: lateribus capiteque flavescentibus.

- I. album.* 159. N. cristata grisea, alis incumbentibus I. albo notatis.

Habitat in Plantagine. Sp. iij. 87.

Margo posticus fuscus.

- viminalis.* 160. N. cristata alis incumbentibus basi fuscis: strigis vndatis fulvis apice cinereis. Sp. iij. 89.

- pagana.* 161. N. cristata, alis incumbentibus griseo fuscis: punctis marginalibus fuscis quinque, albis tribus, posticis albis: fascia nigra. Sp. iij. 90.

***** *Thorace cristato, alis deflexis.*

162. N. cristata, alis deflexis flavis: strigis ferrugineis; *fuluago.*
posteriore punctata, posticis albis.

Phalcenia fuluago Linn. Syst. Nat. 2.858.190. In Sv. 1173.

Noctua fuluago Wien. Verz. 86. 1.

Clerk. Icon. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Europae Betula alba.

Maior N. Citrago.

Larua nuda pallida: capite brunneo.

163. N. cristata, alis deflexis ferrugineis: strigis fuscis, *croceago.*
costa albo punctata.

Noctua croceago Wien. Verz. 86. 2.

Habitat in Quercu Austriae Dom. Schieffermyller.

Caput et thorax ferruginea, immaculata. Thoracis
crista valde eleuata, ~~con~~ compressa. Alae anticae ferru-
gineae strigis tribus obturis. Costa punctis duobus
baseos quatuorque in medio niueis. Posticae albidae
puncto strigaque vndata sanguineis.

*Larua flavescentis linea dorsali fusca lineolisque obli-
quis lateralibus aurantiis.*

164. N. cristata alis deflexis fuscescentibus: litura baseos *aurago.*
fascia media late flavis.

Noctua aurago Wien. Verz. 86. 17.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae anticae basi apiceque fu-
scae litura flavescente. In medio fascia lata dentata
flava. Posticae cinereae.

*Larua nuda grisea: lineolis obliquis fuscis. Quies
quatuor hebdomadum.*

165. N. cristata, alis deflexis deflexis flavis: punctis nu- *sulphura-*
merosis strigisque fuscis. *go.*

Noctua sulphurago Wien. Verz. 86. 8.

Habitat in Austriae Betula Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae anticae pallide flavae pun-
ctis baseos fuscis. In medio strigae duae, anteriore
maiore, posteriore valde vndata. Pone strigam an-
teriorum annuli duo fuscii. Margo fusco punctatus.

Larua nuda albida, capite flavo. Quies 17 dierum.

166. N. cristata alis deflexis flavis fuscō subfasciatis, po- *Cerago.*
sticis albis.

Noctua

Noctua Cerago Wien. Verz. 86. 9.

Habitat in Germaniae Salice Dom. Schieffermyller.

Praecedentibus affinis at maculae latiores fere fascias constituunt. Thorax flauus crista in altero sexu elevata, acuminata.

- ✓ *rutilago.* 167. N. cristata, alis deflexis flauis ferrugineo strigosis: fascia baseos apicisque fusca.

Noctua rutilago Wien. Verz. 86. 4.

Habitat in Europae Populo.

Media. Corpus fuscum, abdomine albido. Alae anticae fluae strigis numerosis atomisque ferrugineis, maculisque ordinariis distinctis. Fascia baseos lata ad marginem interiorem totam basin occupat.

- ✓ *citrago.* 168. N. cristata, alis deflexis luteis: strigis tribus ferrugineis obliquis. *Sp. Inv. 53.*

- luteago.* 169. N. cristata, alis deflexis flauis: strigis duabus densatis fuscis.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Statura praecedentium. Antennae ferrugineae rachi alba. Alae anticae flavescentes strigis duabus in medio ad marginem interiorem fere coeuntibus, valde dentatis, fuscis. Posticae albidae.

- ✓ *ferrago.* 170. N. cristata alis deflexis ferrugineis: macula media fusca; lunula alba.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Alae anticae ferrugineae, in medio macula fusca et in hac lunula alba.

Pone fasciam striga e punctis vix conspicuis nigris. Posticae fuscae. Subtus omnes argenteae nitidae.

- ✓ *flauago.* 171. N. cristata, alis deflexis flauissimis: punctis fascia que lata fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura et summa affinitas N. Cereago. Caput fuscum.

Thorax antice fuscus, postice cristatus, flauus. Alae anticae flauissimae punctis aliquot fuscis. Macula magna baseos ad marginem exteriorem fusca. Pone medium fascia lata, sinuata, fusca, in qua puncta tria costalia; flava. Pone hanc striga e punctis parvis fuscis. Alae posticae cinereae.

172. N. cristata, alis deflexis luteis: puncto medio fusco *giluago*.
strigaque postica punctorum nigrorum.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura praecedentium Alae anticae flavae vix strigae puncto magno medio fusco et pone hoc striga e punctis sex nigris. Alae posticae albae.

173. N. cristata alis deflexis orichalceis: margine fascia que griseis. Sp. inq. 91.

Noctua chrysitis Wien. Verz. 92. 2.

174. N. cristata alis deflexis purpurascensibus: maculis *concha*. duabus punctisque apicis aureis.

Phalaena C aureum Knoch Beytr. I. tab. I., fig. 2.

Habitat in Austriae plantis.

Caput et thorax antice ferruginea. Antennae pallidae.

Alae anticae purpurascentes lineola baseos maculis magnis duabus in medio punctisque quatuor versus apicem aureis. Posticae pallidae.

175. N. cristata alis deflexis fuscis: macula magna lunata *orichalcea*. Sp. inq. 92.

176. N. cristata alis deflexis cinereis: macula marginali *lamina*. atra vtrinque auro marginata maculaque aurea.

Noctua lumina Wien. Verz. 314. 8.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Affinis N. bractea at minor. Caput et thorax grisea.

Abdomen basi fasciculis pilorum nigrorum. Alae anticae cinereae macula in medio marginis tenuioris magna atra vtrinque striga aurea terminata. Externe in apice macula magna aurea et in hac macula nigra.

177. N. cristata alis deflexis variegatis: macula magna *bractea*. media aurea nitida.

Noctua bractea Wien. Verz. 314. 7.

Habitat in Europa australi Dom. Zschuck.

Statura omnino N. Festucae. Caput et thorax obscure ferruginea. Alae anticae cinereo, fusco, ferrugineoque variae. In medio macula magna, angulata, nitida aurea. Posticae cinereae.

178. N. cristata alis deflexis: anticis flavo fuscoque variis; *Festucae*. maculis tribus argenteis. Sp. inq. 93.

Noctua Festucae Wien. Verz. 92. 1.

circumflexa.

179. *N. cristata* alis deflexis: anticis fuscouscentibus charactere flexuoso argenteo Linn. Syst. Nat. 2. 884. 128. Wien. Verz. 93. 4.

Habitat in Germaniae Achillaea Mellefolio.

Larua subnuda viridis: linea laterali obscuriore.

Puppa dimidiato alba nigraque.

Artemisiae.

180. *N. cristata*, alis deflexis anticus viridibus; maculis argenteis sparsis.

Noctua argentea Sp. Inf. App. 507.

Noctua Artemisiae Wein. Verz. 312. 9.

Knoch. Beytr. I. 45. tab. 3. fig. I. 2.

Gamma.

181. *N. cristata* alis deflexis dentatis: anticis fuscis et aureo inscriptis. J. n. inf. 94.

Noctua gamma Wien. Verz. 39. 5.

moneta.

182. *N. cristata*, alis deflexis aureis: strigis vndatis annuloque geminato argenteo.

Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermyller.

- Magnitudo *N. Festucae*. Thorax cristatus griseus punctis nigris. Alae anticae aureae strigis atomisque fuscis, apice obscuriores. In medio annulus duplicatus argenteus quadro fusco notatus. Posticae cinereae.

aemula.

183. *N. cristata* alis deflexis dentatis nigro cinereoque variegatis: lineola media duplicita argentea.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Statura et summa affinitas *N. gamma* at alae omnes nigro cinereoque variegatae. Signum medio alae inscriptum parum, minus distinctum. Posticae basi cinereae, apice fuscae.

dinergens

184. *N. cristata* alis deflexis integris: anticis griseis medio fuscis signo albo inscriptis, posticis fuluis: margine fusco.

Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermyller.

Affinis praecedentibus at minor. Alae anticae cinerascentes macula magna fusca ad medium marginis interioris et in hoc signum album. Posticae fuluae margine fusco.

argentina

185. *N. cristata* alis deflexis griseis: vitta lata abbreviata argentea.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Parua. Corpus pilosum album. Alae anticae griseae vitta lata fere marginali argentea a basi ultra medium ducta, nitida. Posticae niveae.

186. N. cristata alis deflexis: anticis fusco cinereoque variis signo? albo inscriptis. *Sp. vng. 95.* Wien. Verz. 93. 3.

Habitat in Vrtica vrente.

187. N. cristata, alis deflexis obscuris basi nigro punctatis signo medio? aureo inscriptis. *Sp. vng. 96.*

188. N. cristata, alis deflexis griseis: macula apicis dorsalique brunneo aurea. *Sp. vng. 97.* *Peponis.*

189. N. cristata alis deflexis: anticis ferrugineo griseis i iota resupinato aureo inscriptis. *Sp. vng. 98.*

190. N. cristata alis deflexis fusco cinereoque variis: arcu medio flavo marginato.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino praeecedentium. Thorax valde cristatus cinereus. Alae anticae fusco cinereoque variae. In medio arcus magnus cinereus margine flavo. Posticae basi cinereae apice fuscae.

191. N. alis deflexis fuscis cinereo variegatis, posticis albo hyalinis. *Sp. vng. 99.* *paupe- rata.*

192. N. alis deflexis eroso dentatis pallidis: anticis basi incarnata: triangulo fuso. *Sp. vng. 100.* *meticu- lofa.*

Wien. Verz. 83. 1.

193. N. cristata alis deflexis dentatis viridibus: margine ciliata. postico cinereo.

Habitat Cajeanae Dom. v. Rohr.

Magnitudo N. lacerae. Antennae pectinatae apice setaceae. Corpus cinereum thorace antice parum brunneo. Alae anticae obscure virides, minime nitidae margine postico dentato, late cinereo. Posticae fusca marginè exteriori pilis fulciantatis ciliata, postico dentato cinerascente. Subtus omnes fuscescentes. Tibiae anticae barbatae.

194. N. cristata, alis deflexis integris virescentibus nitidulis: triges duplicatis albis; anteriore inflexa, uniculisque duabus apicis fulvis.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Nimis sequenti affinis at minor et maculae tantum duae distinctae apicis fuluae.

- illustris.* 195. N. cristata alis deflexis integris viridi cinereoque nitidulis: maculis tribus ferrugineis distinctis.
Habitat in Germania australiori Dom. Zschuck.
Similis N. meticulosa at paullo minor. Corpus obscure cinereum. Thorax valde cristatus antice parum ferrugineus. Alae anticae cinereo, viridi carmine variegatae, nitidae et ad marginem posticum maculae tres distinctae ferrugineae, strigis duabus pallidis inclusis. Posticae cinereae.
- lacera.* 196. N. cristata, alis deflexis fusco ferrugineo variegatis dorso emarginatis, fronte fulua. Sp. vng. 106.
- Oo.* 197. N. cristata, alis deflexis cinerascentibus ferrugineo strigosis oo notatis. Linu. Syst. Nat. 2. 832. 81. In Sv. 1139.
Noctua Oo Wien. Verz. 87. 1.
Roes. Ins. 1. Phal. 2. tab. 63.
Wilks pap. tab. I. a. 22.
Habitat in Europae Quercu.
Larua violacea: punctis lineisque albis: dorsali interrupta.
- flamma.* 198. N. cristata alis deflexis ferrugineo flavoque variis: maculis ordinariis confluentibus.
Habitat in Austriae Mus. Dom. Schieffermüller.
Minor N. Oo. Alae anticae ferrugineo flavoque variegatae; apice albido striatae. In medio maculae ordinariae interne lineola albida cinctae. Posticae fuscae subtus rufescentes puncto strigaque fuscis.
- gothica.* 199. N. cristata, alis deflexis: anticis fuscescentibus; arcu punctoque medio atris. Sp. vng. 102.
- derasa.* 200. N. cristata, alis deflexis: anticis supra decorticatis.
Noctua derasa Wien. Verz. 87. 2. Sp. vng. 103.
- Serici.* 201. N. cristata, alis deflexis albis: strigis tribus nigris, posticis luteis, punctis strigaque nigris.
Noctua Serici Thunb. Act. Holm. 1781. 243. tab. 5. fig. 12.
Habitat in Iaponia culta sericum praebens.
Magnitudo N. Mori. Corpus album collari sanguineo.
Alae anticae albae strigis tribus arcuatissimis nigris.

202. N. cristata alis deflexis cinereis fusco vndatis: media or.
cula media grisea.

Noctua or Wien. Verz. 87. 5.

Habitat in Austriae Populo Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae cinereae strigis numerosis vndatis
in primis baseos fuscis. In medio macula magna trans-
uersa grisea. Posticae obscurae.

Larua virescens, capite brunneo: margine antico atro.

203. N. cristata alis deflexis cinereis: fasciis duabus fer- diluta.
rugineis obsoletis puncto que medio albo.

Noctua diluta Wien. Verz. 87. 6.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Media. Alae cinereae basi fascia ferruginea postice stri-
ga fusca terminata, pone medium fascia altera minus
distincta striga fusca terminata. Subtus cinereae stri-
ga fusca. Thorax cinereus.

Larua pallida: linea dorsali fascia, capite atro.

204. N. cristata alis deflexis obscure cinereis: fasciis dua- ruficollis.
bus obscurioribus, thorace antice brunneo.

Noctua ruficollis Wien. Verz. 87. 7.

Habitat in Quercu Robore Dom. Schieffermyller.

Antennae thoraxque antice ferruginea. Abdomen ci-
nerenum. Alae posticae cinereae.

Larua nuda: dorso plumbeo; lateribus albis nigro
punctatis.

205. N. cristata alis deflexis dentatis brunneis: anticis pun- satellitia. ✓
cto flavo inter punctula duo alba. Sp. vij. 104.

Noctua satellitia Wien. Verz. 86. 5.

Larua nigra albo sublineata, collaris anoque flavo li-
neatis, in alias laruas facuit.

206. N. cristata, alis deflexis ferrugineis: muculis tri- diffinis. ✓
bus costalibus albis, postice punctis nigris duobus.

Noctua diffinis Wien. Verz. 88. 10. Sp. vij. 105.

Larua viridis albo lineata, capite pedibusque anticis
atris.

207. N. cristata alis deflexis ferrugineis: angulo inferiori affinis. ✓
puncto gemino nigro, posticis nigris. Sp. vij. 106.

Noctua affinis Wien. Verz. 88. 11.

Habitat in Europaë Populo.

Larua subnuda albo virescens lineis alternis clare vel obscure viridibus: punctis eleuatis nigris piliferis, stigmatibus superne arcu nigro.

Variat pallide virens atomis albis nigrisque.

triptera. 208. N. cristata alis deflexis: maculis tribus longitudinalibus rotundatis atomisque sulphureis adspersis. Sp. nig. 107.

margi- 209. N. cristata, alis deflexis flavecentibus: strigis fer-
nata. ragineis, postice fuscis. Sp. nig. 108.

Absinthii. 210. N. cristata alis deflexis canis: fasciis punctisque in tetragenum positis nigris. Sp. nig. 109.

Noctua Absinthii Wien. Verz. 73. 1.

Abrotani 211. N. cristata alis deflexis fusco cinereis: strigis vndatis nigris, costa punctis quatuor albis.

Noctua Abrotani Wien. Verz. 73. 2.

Roel. Ins. 3. tab. 51. Larua.

Habitat in Artemisia Abrotano Dom. Schieffermyller.

Statura N. Absinthii. Antennae ferrugineae. Thorax cinereus margine antice albido striga tenuissima nigra. Alae anticae cinereo fuscoque variae strigis vndatis nigris. Maculae ordinariae in medio. Puncta quatuor alba in margine crassiori. Posticae cinereae nitidulae.

Larua viridis ferrugineo maculata: tuberculis dorsibus conceis.

occulta. 212. N. cristata alis deflexis nebulosis apice cinereis: maculis tribus nigris.

Phalaena occulta spirilinguis cristata, alis deflexis fu-
seo nebulosis, inferioribus brevioribus: margine al-
bis. Linn. Syst. Nat. 2. 349. 247. In Sv. 1203. ?

Habitat in Svecia Dom. de Paykull.

Magna. Thorax cristatus linea laterali strigaque antiæ abbreniata nigris. Alae anticae basi cinercae in medio nebulosae striga postica vndata alba, postice cinereae maculis tribus nigris striga albida adiacente maiori anuli. Posticae fuscae margine albido.

Alni. 213. N. cristata alis deflexis fuliginosis: areis duabus ci-
nerascentibus: priore punto marginali nigro.

Noctua degener Wien. Verz. 70. 4. Sp. nig. 110.

214. N. cristata, alis deflexis purpurascensibus: fasciis *Delphinii*. ✓
duabus albidis, posticis obscuris. Sp. ing. 118.
Noctua Delphinii Wien. Verz. 87. 8.
215. N. cristata, alis deflexis purpurascensibus basi flavis: *purpurina*.
Noctua purpurina Wien. Verz. 88. 9. na.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.
Affinis N. *Delphinii* at distincta. Alae anticae basi fla-
uescetes apice purpureae striga una alteraue. Po-
sticae fuscae.
216. N. cristata alis deflexis fuscis variis: strigis duabus *geogra-*
postice coeuntibus niueis, apice striatis. *phica*.
Habitat in Austria Dom. Schieffernmyller.
Parua. Thorax cinereus punctis duobus albis. Alae
anticae fuscescentes basi macula albida. In medio
strigae duae dentatae ad marginem tenuiorem coeun-
tes niueae. Margo posticus albo striatus.
217. N. cristata alis deflexis nigro substriatis fuscis *cine-* *Hyperici*:
reoque variis: macula baseos oblonga albida.
Noctua Hyperici Wien. Verz. 76. 10.
Habitat in Austriae *Hyperico* Mus. Dom. Schieffernmyller.
Antennae nigrae. Thorax pallidus strigis duabus ab-
breuiatis nigris. Abdomen fuscum. Alae anticae
variegatae macula magna oblonga alba interne linea
nigra terminata. In medio maculae ordinariae po-
stica maiori veniformi. Margo albo nigroque stria-
tus. Posticae fuscae nitidulae. Pedes albo annulati.
Larua violacea; dorso lineis tribus albis interruptis.
218. N. cristata, alis deflexis exusto striatis postice bis *perspicili-* ✓
bidentatis: macula ordinaria solitaria veniformi. *laris*.
Phalaena perspicillaris Linn. Syst. Nat. 2. §49. 148. In
Sv. 1198.
Noctua perspicillaris Wien. Verz. 76. II.
Clerk. Icon. tab. 2. fig. 3.
Habitat in Europeae Astragalo, Acere, Pruno:
Margo alae inferior parum purpurascit.
Larua subpubescens scabra, viridis: linea dorsali al-
ba, lateralibus tenuioribus punctisque albis sparsis.
219. N. cristata, alis deflexis fuscis cinereis apice albo ni- *Linariae*: ✓
groque striatis: maculis ordinariis niueis.
Noctua Linariae Wien. Verz. 73. 6.
Habitat in Antirrhino Linaria Dom. Schieffernmyller.

Parua. Caput antice albidum. Thorax griseus marginē anticō albo striga parua nigra. Alae fuscō cinereoque variae, apice albo nigroque striatae striis albis terminantibus. In medio maculae ordinariae niueae annulo paruo atro cinctae. Posticae pallidae margine fuscō.

Larua linea dorsali flava lateralibusque striis albis nigrisque, capite cinereo nigro punctato.

✓ *Piji.*

220. N. cristata, alis deflexis ferrugineis bimaculatis: striga postica vndata pallida. Sp. inf. 112.

Noctua Piji Wien. Verz. 83. 14.

mendica.

221. N. cristata, alis deflexis pallida incarnatis: macula media fusca, stigmatibus flavis. Sp. inf. 113.

✓ *Oxya-*
canthe.

222. N. cristata, alis deflexis bimaculatis: margine tenuiore coerulescente: lunula alba. Sp. inf. 114

Noctua Oxyacanthe Wien. Verz. 70. 3.

brunnea.

223. N. cristata, alis deflexis fuscis: macula media transversa flava, margine brunneo.

Noctua brunnea Wien. Verz. 83. 15.

Habitat in Piso arvensi Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus subtus brunneum. Thorax fuscus. Abdomen supra cinereum. Alae anticae fuscae maculis aliquot in primis marginis exterioris fuscis. In medio loco maculae ordinariae posticae macula transversa flava. Margo alae ipse brunneus. Posticae fuscae margine brunneo.

Larua nuda brunnea albo maculata lineaque lateralī coerulescente, capite nigro: lineis duabus albis.

✓ *culta.*

224. N. cristata alis deflexis vndatis fuscescensibus: punctis duobus albis; anteriore duplicata, thoracis marginibus albis.

Noctua culta Wien. Verz. 70. 4.

Habitat in Pyro sylvestri Dom. Schieffermyller.

Media palpi subtus albi. Antennae ferrugineae. Caput niueum striga punctisque atris. Thorax fuscus margine antico lateralibusque albis parum nigro maculatis. Abdomen cinereum. Alae anticae fuscae albo nigroque parum albidae nigro punctatae. In medio maculae due magna ordinariae, anteriore duplicata. Margo posticus albo fusoque varius. Posticae albae

albae litura ani nigricantē. Tibiae anticae albae nigro punctatae tarsis nigris albo annulatis.

Larua obscure variegata: lineis vtrinque duabus vndatis nigris, ano quadridentato.

225. N. cristata alis deflexis fuscis nigro vndatis: fascia *compta*. media lata alba.

Noctua compta Wien. Verz. 70. 5.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Praecedentibus minor. Caput et thorax fusco alboque varia. Abdomen cinereum. Alae anticae fuscae, nigro vndatae basi parum albicant. Fascia lata in medio et striga postica fere obsoleta albis. Posticae fuscae basi pallidiores. Tarsi nigri albo annulati.

226. N. cristata alis deflexis fusco viridique variis: lituris duabus albis, thoracis crista duplici. *prafina*.

Noctua prafina Wien. Verz. 82. 11.

Habitat in Cechia Armoracia Dom. Schieffermüller.

Magna. Alae fuscae nigro parum vndatae viridique variae. Lituree duae magnae, altera ad basin, altera pone medium. Posticae fuscae ciliis albis, subtus puncto strigaque vndata nigris.

Larua sub violacea: dorso nigro maculato stigmatibus albis, capite fusco.

227. N. cristata alis deflexis: anticis fusco nebulosis: litura media flava bitida. *Atriplicis* Sp. inv. 115.

228. N. cristata, alis deflexis basi cinereis: macula magna sinuata nigra. *Sp. inv. 116.*

229. N. cristata alis deflexis variegatis, posticis albis: *histrionica* striga marginali nigra. *Sp. inv. 117.*

230. N. cristata, alis deflexis cinereis bimaculatis: posticis fascia rufa abbreviata. *Sp. inv. 118.*

Noctua praeceps Wien. Verz. 82. 12. vix differre videatur, at tota virescens,

231. N. cristata alis fuscis: strigis tribus vndatis flavescentibus repandis, posticis ferrugineis. *Sp. inv. 119.* *pyramidea*.

Noctua pyramidea Wien. Verz. 71. 1.

232. N. cristata, alis deflexis obscure cinereis: strigis vndatis maculisque ordinariis flavescentibus. *lucipeta*.

Noctua lucipeta Wien. Verz. 71. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax hirta, obscure cinerea, immaculata. Alae obscure cinereae strigis punctisque vndatis flauescentibus. In medio maculae ordinariae, altera orbiculata, altera veniformi.

pyrophila 233. N. cristata alis cinereis lunulis maculisque fuscis, posticis fuscis nitidulis.

Noctua pyrophila Wien. Verz. 71. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Praecedente minor. Corpus cinereum in thorace striga interrupta fusca. Alae cinereae strigis tribus lunularum fuscarum. Maculae ordinariae fere obsoletae. Margo posticus nigro punctatus. Alae posticae fuscæ nitidae, supra immaculatae, subtus pallidiores lunula strigaque fuscis.

✓ *typica*. 234. N. cristata, alis deflexis fuscis: stigmatibus marginatis strigisque pallidis reticulatis. Sp. inf. 120.

✓ *lucipara*. 235. N. cristata, alis deflexis cinereo nitidis: fascia media lata fusca. Sp. inf. 121.

✓ *oleracea*. 236. N. cristata alis deflexis: anticis ferrugineis: lunula latecente strigaque alba: postice bidentata. Sp. inf. 122.

Phalaena dissimilis Knoch. Beytr. 57. 12. tab. 4. fig. 1 - 4.

Noctua oleracea Wien. Verz. 83. 19.

Conf. *Noctua suasa* Wien. Verz. 83. 18. vix distincta.

xanto-grapha. 237. N. cristata alis deflexis testaceis: maculis ordinariis flauis.

Noctua xantographa Wien. Verz. 83. 26.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis at paullo minor. Caput thorax, alae anticae obscure testaceae maculis ordinariis flauescentibus, postice striga punctorum nigroruin. Posticae vti et abdomen cinereæ.

✓ *leucomelas*. 238. N. cristata, alis deflexis atris: posticis basi niueis. *Noctua leucomelas* Wien. Verz. 90. 6. Sp. inf. 123.

✓ *conuergens*. 239. N. cristata alis deflexis subdentatis griseo fuscis apice cinereis: angulo ani macula fulua.

Noctua conuergens Wien. Verz. 84. 8.

Habitat in Austriae Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae anticae ultra medium fuso griseo que variae basi lineola atra. In medio maculae ordinariae, posteriore

riori veniformi lunula obsoleta alba, apice cinereae macula anuli ferruginea punctisque marginalibus nigris.

Larua coerulescens lineis punctisque albis, capite brunneo.

240. N. cristata alis deflexis dentatis nigris atro vndatis *alchymista* apice cinerascentibus, posticis basi maculisque duabus marginalibus albis.

Noctua alchymista Wien. Verz. 89. 5.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Affinis N. leucomelas at paullo maior. Corpus atrum dorso cristato. Alae nigrae strigis quatuor vndatis atris apice striga cinerascente, quae versus angulum ani maculam format. Posticac nigrae macula magna baseos duabusque minoribus marginalibus albis. Subtus omnes nigrae posticis basi albis puncto nigro.

241. N. cristata, alis deflexis fuscis: fascia grisea apice *riangularis*: bifida flauo marginata. *Sp. inf. 124.*

Noctua Cucubali Wien. Verz. 84. 5.

Noctua triangularis cristata, alis deflexis fuscis triangulo fasciaque dentata flauo marginatis Thunb. nou. sp. 3. fig.

Habitat in Europae Cucubalo.

Larua nuda glabra virescenti cinereoque varia: punctis obscurioribus.

Conf. Noctua capsincola Wien. Verz. 84. 6. vix differt.

242. N. cristata alis deflexis albidis: fascia lata fusca vtrinque flauo-maculata. *serena.*

Noctua perlata Wien. Verz. 84. 4.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus albidum atomis fuscis. Alae anticae basi albae punctis aliquot nigris, in medio fuscae, qui color vtrinque striga vndata flauescente terminatur maculis ordinariis albidis, apice albae striga nigra fuscaque. Costa albo nigroque punctata.

243. N. cristata alis deflexis nigris: margine tenuiori anguloque ani obscure cinereis.

Phalaena Pinastri alis deflexis nigris: margine dorsali *Pinastri*: posticeque pallidis. Linn. Syst. Nat. 2. 851. 160. In Sv. 1188.

Noctua Pinastri Wien. Verz. 82. 1.

Clerk.

Clerk. Icon. tab. I. fig. 8.

Habitat in Europae pratis graminosis.

Magnitudo et statura N. riicularis. Caput nigrum antennis fuscis. Thorax niger crista longitudinali, compressa, obscure cinerea. Alae anticae nigrae maculis ordinariis obsoletis, margine tenuiori anguloque ani late cinereis subtus cinereae.

Liguistri. 244. N. cristata, alis deflexis fusco virecentique variis nigro subundatis: macula magna postica albida.

Noctua Ligustri Wien. Verz. 70. 1.

Habitat in Austriae Ligistro Dom. Schieffermyller.

Paullo minor N. aprilina. Thorax albo nigroque varius. Alae anticae obscurae, variegatae. In medio macula ordinaria annula albo cincta. Versus apicem macula magna alba. Margo ipse albo variegatus, nigro punctatus.

Larua pilosa viridis flavo lineata.

strigilis. 245. N. cristata, alis deflexis nebulosis: denticulis setaceis intra fasciam albam terminalem.

Phalaena strigilis Linn. Syst. Nat. 2. 851. 161. In Sy. 1199. Clerk. Icon. tab. 9. fig. 6.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Parua. Alae basi litura alba.

runica. 246. N. cristata, alis deflexis: anticis virentibus; maculis variis atris, postice vtrinque punctis trigonis.

Noctua runica Wien. Verz. 70. 5. Sp. Inv. 125.

Phalaena aprilina Linn. Syst. Nat. 2. 847. 138.

Larua solitaria, glabra, cinerea; quadris fuscis.

Puppa brunnea.

Imaginis thorax arcubus duobus nigris. Margo alae punctis trigonis in duplice serie.

aprilina. 247. N. cristata, alis deflexis viridibus: maculis fascia que atris apice punctorum trigonum serie vnicā.

Noctua aprilina Wien. Verz. 70. 6.

Phalaena aprilina Linn. In Sv. 1178.

Habitat in Quercu Dom. Schieffermyller.

Difserit sane a praecedente. Minor Thorax antice niger postice virescens. Alae pone medium fascia nigra et pone hanc series vnicā punctorum nigrorum.

Larua pilosa supra fuscescens: fasciis ferrugineis maculisque albis.

248. N. cristata, alis deflexis anticis viridibus; lunula me- virens.
dia alba, posticis albis immaculatis.

Noctua virens Wien. Verz. 85. 8.

Phalaena virens Linn. Syst. Nat. 2. 847. 139.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Margo alae anticae albidus.

249. N. cristata alis deflexis: anticis abdomineque trifa- ludifica.
riam nigro punctato flauis. Sp. sig. 186.

Habitat in Salice.

Larua taberculata, pilosa coeruleo flauoque lineata:
collo caudaque albo maculatis.

Puppa folliculata nigra: angulis rubris.

250. N. cristata alis deflexis albo fuscoque variis apice ni- ~~striatis~~.
gro striatis: stigmatibus subocellatis; posteriori ve- ~~Linn.~~ E.
niformi.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Media. Antennae fuscae. Thorax cristatus strigis fere
indistinctis albis fuscisque alternis. Alae anticae al-
bo fuscisque variae, versus apicem striis septem ab-
breuiatis atris et in medio stigmata ordinaria annulo
atro cincta, anteriori orbiculato, posteriori veni-
formi. Alae posticae nigricantes margine albo.

251. N. cristata alis deflexis cinereis nigro vndatis: ma- perla,
culis duabus fuscis.

Noctua perla Wien. Verz. 70. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis videtur N. Algae. Alae anticae supra obscure
cinereae strigis vndatis nigris. In medio maculae
duae magnae fuscae. Posticae albidae puncto cen-
trali fuso.

252. N. cristata alis deflexis: anticis viridibus: maculis *Lichenes*.
variis atris subtus fuscis. Sp. sig. 187.

Noctua glandifera Wien. Verz. 70. 2.

253. N. cristata alis deflexis: anticis fuscis; fasciis duabus *Algae*.
viridibus. Sp. sig. 188.

254. N. cristata, alis deflexis cinereis: maculis atris tri- *tridens*.
fidis, posticis albidis.

Noctua tridens Wien. Verz. 67. 1.

Habitat in Austriae Pruno Armeniaco Dom. Schieffer-
myller.

Nimis affinis N. Psi at larua diuersissima.

Larua nigra: lateribus rubro punctatis lineaque dorsali sulphurea, taberculo conico porrecto.

✓ *Psi.*

255. N. cristata alis deflexis cinereis: anticis lineola baseos characteribusque nigris, pedibus inimaculatis.

Noctua Psi Wien. Verz. 67. 2. Sp. inf. 129.

✓ *auricorna*

256. N. cristata alis deflexis: anticis cinereo fuscis: strigis characteribusque nigris, pedibus apice albo annulatis.

Noctua auricoma Wien. Verz. 67. 6.

Habitat in Austriae Rubo caesio Doin. Schieffermyller.

Nimis affinis N. Psi at omnia obscuriora. Alae posticae albidioris. Pedes albidi apice fusti albo annulati.

Larua pilosa atra verrucis fuluis, pilis capitis caudaeque albis, dorsi aureis.

✓ *Lamda.*

257. N. cristata, alis deflexis fuso cinereis: lineola baseos duabusque in medio atris.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura et magnitudo omnino N. Psi. Caput et thorax obscure cinerea, valde cristata. Alae anticae obscure cinereae, nitidae fascia baseos mediique obsoletis obscurioribus. Lineola atra ad basin, duaeque in medio: interiori longiori.

✓ *Chi.*

258. N. cristata, alis deflexis canis: anticis x nigro notatis.

Noctua Chi Wien. Verz. 72. 3. Sp. inf. 130.

✓ *Aceris.*

259. N. cristata alis deflexis canis nigro vndatis, abdomine subtus basi brunneo.

Noctua Aceris Wien. Verz. 67. 7.

Phalaena Aceris Linn. Syst. Nat. 2. 846. 137. In Sv. 1179.

Wilks pap. 32. tab. 2. c. 6.

Reaum. Inf. 1. tab. 34. fig. II.

Frisch. Inf. 1. tab. 5.

Habitat in Acere, Aesculo.

Larua hirsuta: fasciculis flavis rubrisque, dorso albo nigro maculato.

✓ *Euphorbiae.*

260. N. cristata alis deflexis cinereis fuso vndatis: maculis ordinariis; anteriore orbiculata, posteriori veniformi albidis.

Noctua Euphorbiae Wien. Verz. 67. 4.

Habitat in Austriae Euphorbia Dom. Schieffermyller.

Rustica media. Caput et thorax hirta cinerea. Alae cinereae striga baseos breuissima, altera ante medium vndata, tertia pone medium incurva. In medio pallidiores maculis ordinariis distinctis annulo fusco cinctis. Margo fusco punctatus.

Larua pilosa virescens: maculis dorsalibus atris, colari lunula ferruginea.

261. N. cristata, alis deflexis cinereis nigro vndatis: macula vnicolor orbiculata albida. *megacephala.*

Noctua megacephala Wien. Verz. 67. 5.

Habitat in Salice Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica media affinis N. Euphorbiae. Antennae nigrae.

Caput et thorax hirta, cinerea. Abdomen albidum. Alae anticae obscure cinereae strigis variis vndatis nigris. In medio macula ordinaria vnicolor. Margo fusco punctatus. Posticae albae subtus puncto centrali fusco.

Larua pilosa fusca ferrugineo maculata, capite corpore latiore segmentoque postico macula sulphurea.

262. N. cristata, alis deflexis canis: litura media atra; litura puncto albo. *Sp. vñf. 176.*

Noctua litura Wien. Verz. 77. 2.

Habitat in Europae Salice, Pruno.

Larua nuda viridis: linea dorsali pallida, laterali albo flavoque varia, capite pallido.

263. N. cristata, alis deflexis cinereis apice obscurioribus pistacina, vndatis, posticis fuscis.

Noctua pistacina Wien. Verz. 77. 1.

Habitat in Centaurea Scabiosa Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica media. Corpus griseum. Alae cinereae striatae, basi parum pallidiores punctis nigris, apice obscuriores striga vndata pallida posteriorique e punctis nigris.

Larua nuda scabra vitidis: punctis lineaque laterali albis.

264. N. cristata alis deflexis ferrugineis: puncto paruo *Baja*, baseos geminatoque apicis nigris.

Noctua Baja Wien. Verz. 77. 3.

Habitat in Atropa Belladonna Mus. Dom. Schieffermyller.

Rustica media. Palpi ferruginei apice pallidi. Thorax ferrugineus. Abdomen cinereum. Alae anticae ferrugineae puncto baseos distincto atro, in medio paulo obscuriores maculis ordinariis et apice versus marginem exteriorem puncta duo approximata atra. Posticae fuscae ciliis ferrugineis.

Larua cinereo fuscoque varia: lineis tribus dorsalibus albis, laterali flavescente.

rubricosa 265. N. cristata, alis deflexis fuscescentibus: costa alba fusco maculata, apice fusca: punctis albis.

Noctua rubricosa Wien. Verz. 77. 4.

Habitat in Rumice acuta Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax hirta, flavescentia. Alae anticae fuscescentes, cinereo vndatae margine tenuiori baseos rufescente. Costa ultra medium albida maculis tribus nigris apice fusca punctis paruis duobus albis. Subtus obscurae.

Larua grisea: linea dorsali pallida segmentoque singulo punctis duobus albis.

erythrocephala. 266. N. cristata alis deflexis ferrugineis cinereo fuscoque vndatis: macula posterior nigro punctata, capite rufo.

Noctua erythrocephala Wien. Verz. 77. 5.

Habitat in Plantagine Dom. Schieffermyller.

Caput rufescens. Thorax subcristatus, fuscus. Alae rufescentes cinereo fuscoque vndatae. Costa baseos cinerea. In medio maculae ordinariae, quarum posterior punctis aliquot marginalibus atris. Posticae fuscae margine ciliato cinereo. Subtus anticae limbo cinereo, posticae cinereae puncto strigaque vndata fusca.

polygona. 267. N. cristata, alis deflexis subundatis extus fusco nigroque variis, intus pallidis, thorace variegato.

Noctua polygona Wien. Verz. 78. 16.

Habitat in Plantagine Dom. Schieffermyller.

Magna. Thorax fusco ferrugineoque varius postice linea utrinque obliqua, atra. Alae anticae subundatae ferrugineo fuscoque variae maculis ordinariis, intus cinereae fusco vndatae. Costa punctata. Posticae albidae.

Larua nuda viridis: linea laterali albida stigmatibus que fuluis.

268. N. cristata alis deflexis fusco nebulosis: stigmate venisiformi albo; pupilla lunari flava. *Sp. sp. 132.* *Persicariae*
Noctua Persicariae Wien. Verz. 71. 8. *riac.*
- Larua nuda viridis:* linea dorsali alba segmento quarto et quinto macula obscuriori, cauda conica.
269. N. cristata alis deflexis obscure cinereis nitidulis: *similans var.* strigis vndatis fuscis; posteriore punctata. *Trifinis. End.*
Habitat in Germania Dom. Schneider.
Media. Caput et thorax obscura abdomine pallidiore.
 Alae anticae cinereae nitidae strigis vndatis obscurioribus marginali punctata. Posticae fuscae, nitidulae.
270. N. cristata alis deflexis: anticis fuscis: punctis nigris tribus approximatis, posticis lividis. *Sp. sp. 133.* *Tragopoginis.*
Noctua Tragopoginis Wien. Verz. 85. 14.
271. N. cristata, alis deflexis obscure griseis: macula fusca punctisque tribus costalibus albis. *Sp. sp. 134.* *hepatica.*
Noctua hepatica Wien. Verz. 83. 16.
272. N. cristata alis deflexis heluolis: strigis duabus obliquis cinereis, posticis fuscescentibus; margine luteo-brunneo. *Acetosellae*
Noctua Acetosellae Wien. Verz. 84. 1.
Habitat in Rumice Acetosella Dom. Schieffermüller.
 Antennae rufescentes. Caput et thorax heluola. Alae anticae heluolae strigis duabus postice conuergentibus cinereis. Inter strigas has maculae ordinariae. Posticae fuscae margine brunneo.
- Larua nuda* dorso fulvo striis duabus longitudinalibus fuscis, lateribus rufescens, capite rufo: lineis duabus purpureis atro punctatis.
273. N. cristata alis deflexis flavescentibus: strigis duabus turcas fuscis lunulaque lutea. *Sp. sp. 135.*
Noctua turca Wien. Verz. 84. 2.
Habitat in Iunco piloso.
 Margo alaruin purpureus.
Larua rufo ochracea: linea dorsali albida subtus luteo albida, incisuris lineolis nigris, lateraliter obscuriore, capite fusco.
274. N. cristata alis deflexis flavescentibus: strigis duabus conigera. fuscis punctoque medio albo trigono.

Noctua conigera Wien. Verz. 84. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minor N. turca. Antennae flavescentes. Alae anticae flavescentes striga baseos recurva, in medio punctum trigonum album, postice striga obliqua, posticae obscurae.

Larua grisea albo nigroque lineata, capite fuscō, segmento primo atro: lineis tribus albīs.

albipuncta. 275. N. cristata alis deflexis cinereis: lunula media alba, strigisque duabus lunularum fuscarum.

Noctua albipuncta Wien. Verz. 84. 4.

Habitat in Plantagine maiori Dom. Schieffermyller.

Corpus cinereum. Alae anticae cinereae, interdum parum rufescentes strigis duabus e lunulis interruptis fuscis. Inter has strigas lunula albida.

Larua grisea albo lineata nigroque punctata: primo segmento fuscō: lineis tribus albīs.

polyodon. 276. N. cristata, alis deflexis dentatis nebulosis: striga postica dentata alba. Sp. ins. 136.

Noctua polyodon Wien. Verz. 72. 1.

Habitat in Europae Betula alba.

Larua fusca: lateribus pallidis; lineolis obliquis nigris.

flavicincta. 277. N. cristata, alis dentatis deflexis fuscō cinereoque variis fulvo punctatis.

Noctua flavicincta Wien. Verz. 72. 2.

Roef. Ins. 1. pap. 2. tab. 54. 55.

Habitat in Pruno Ceraso Dom. Schieffermyller.

Minor N. polyodon. Caput cinereum basi parum fuluum. Thorax cinereus atomis fuscis fuluisque.

Alae anticae fuscō cinereoque variegatae punctis sparsis fuluis. Costa albo punctata. Posticae cinereae supra striga, subtus puncto strigaque fuscis.

Larua viridis: linea laterali pallida.

eremita. 278. N. cristata alis deflexis ferrugineis: strigis duabus vndatis albīs; anteriore obsoleta, posteriore repanda. Sp. ins. 137.

nigricans 279. N. cristata, alis deflexis nigricantibus: stigmatibus ordinariis pallidioribus. Sp. ins. 138.

Noctua nigricans Wien. Verz. 81. 19.

Habitat in Cichorio Intybo.

Larua nuda cinereo fuscā nigro punctata: linea dorsali pallidiore,

280. N.

280. N. cristata, alis deflexis subdentatis cinereis: fascia *perflua*: lata atra; puncto ocellari.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax fusca. Alae anticae subdennatae cinerascentes. Fascia in medio lata vtrinque dentata atra, et in hac punctum paruum nigrum annulo cinereo cinctum. Margo posticus obscurior lunulis fuscis. Posticae fuscae.

281. N. cristata; alis deflexis nigricantibus: striga postica *fumosa*. ✓ punctorum alborum.

Noctua fumosa Wien. Verz. 81. 18.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis N. nigricans affinis. Differt tantum striga postica punctorum cuspidatorum alborum. Corpus totum nigricans.

282. N. cristata alis deflexis fusco nitidulis: fascia media *aurita*. repanda cinerea, capite bi-, thorace quadridentato.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnia B. strigulae at omnino huius generis. Caput cinereo hirtum, denticulis duobus erectis e fasciculis pilorum. Thorax itidem quatuor eleuatis validis. Alae fusco nitidulae, in medio fascia lata repanda cinerea apice albo nigroque striatae.

283. N. cristata alis deflexis fusco ferrugineoque variis: *oculea*. ✓ strigata veniformi pallido. Sp. mag. 139.

284. N. cristata alis deflexis: anticis cinereis; strigis tribus atris antennis luteis. Sp. mag. 140. ✓ *flauicornis*.

Noctua flauicornis Wien. Verz. 72. 6.

Larua nuda virescens: punctis lateralibus albis, capite carneo.

285. N. cristata alis deflexis fuscis: strigis tribus vndatis *caluaria*. cinereis maculaque media testacea.

Noctua caluaria Wien. Verz. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus griseum. Palpi magni reflexi fere Pyramidalum. Alae anticae obscurae fuscae strigis tribus vndatis maculisque duabus marginalibus albidis. In medio inter strigas punctum paruum maculaque posterior magna fulua, et in hac puncta duo parua nigra. Posticae fuscae, subtus albo vndatae.

- ✓ *triplacia*. 286. N. cristata alis deflexis: anticis arcu duplice contra-
rio maculisque tribus glaucis intermediis. Sp. sp. 141.
Noctua triplacia Wien. Verz. 91. 1.
 Conf. *Noctua Asclepiades* Wien. Verz. 91. 2. vix dif-
fert at larua nuda pallida nigro punctata: linea late-
rali flava.
- ✓ *trifinis*. 287. N. cristata alis deflexis cinereis fusco subundatis mar-
gineque exteriori punctato, subtus pallidis: fascia
fusca. Sp. sp. 142.
- ✓ *Rumicis*. 288. N. cristata alis deflexis cinereo fuscoque variis: litu-
ra marginis tenuioris alba. Sp. sp. 143.
- ✓ *ridens*. 289. N. cristata alis deflexis viridi fusco alboque variis
macula baseos strigisque duabus vndatis albis, anten-
nis flavescentibus.
 Habitat in Germania Dom. Schneider.
 Statura et magnitudo N. Rumicis. Caput et thorax vi-
rescentia albo irrorata. Antennae flavescentes. Abdo-
men pallidum. Alae viridi fusco alboque variae ma-
culta magna distincta alba baseos ad marginem exte-
riorem, quae strigam vndatam albam attingit. Pone
maculas ordinarias striga altera vndata alba. Versus
apicem strigae lineolis albis lunulisque atris.
- ✓ *exoleta*. 290. N. cristata, alis lanceolatis conuolutis fusco cine-
reoque nebulosis: punctis quatuor marginalibus albis.
Noctua exoleta Wien. Verz. 75. 1. Sp. 9. 144.
- ✓ *Verbasci*. 291. N. cristata alis deflexis dentato erosis: margine la-
terali fusco immaculato. Wien. Verz. 73. 4. Sp. 9. 145.
- ✓ *Asteris*. 292. N. cristata alis integris striatis cinereis: marginibus
nigris; exteriore punctis tribus nigris.
Noctua Asteris Wien. Verz. 312. 10.
 Habitat in Astere chinensi Dom. Schieffermyller.
 Statura et magnitudo omnino N. Verbusci at alae inte-
grae. Antennae supra albae, subtus ferrugineae.
 Alae in medio pallidae lateribus fuscis. In costa puncta
tria alba, in margine tenuiori lunula alba. Posti-
cae fuscae disco ciliisque albis.
- ✓ *Chamo-
millae*. 293. N. cristata alis anticis lanceolatis striatis canis: pun-
ctis duobus centralibus minutissimis nigris, subtus
immaculatis.
Noctua Chamomillae Wien. Verz. 73. 3.

Habi-

Habitat in Chamomilla flores exedens Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis N. umbraticeae vix distinguenda, at larua diuersissima. Antennae ferrugineae. Caput fuscum strigis cinereis. Thorax hirtus cinereus striga antica marginali nigra. Abdomen griseum basi fasciculis aliquot dorsalibus. Alae anticæ supra striatae, canæ in medio punctis duobus hirsutissimis costaque punctis tribus cinereis. Subtus cinereæ punctis tribus costalibus albis. Posticae striatae, cinereæ ciliis albis, subtus immaculatae lunula parua centrali fusca.

Larua nuda, cinerea utrinque lineolis duabus incuruis ferrugineis in singulo segmento. Iunior flano alboque maculata.

294. N. cristata alis lanceolatis striatis canis: lineolis duabus atris, posticis albis subtus immaculatis. *Tanaceti.* ✓

Noctua *Tanaceti* Wien. Verz. 73. 5.
Habitat in *Tanaceti vulgaris* floribus Dom. Schieffermyller.

Affinis N. Chamomillæ. Antennae ferrugineæ basi albidæ. Caput cinereum. Thorax cinereus striga antica fusca. Abdomen basi albidum. Alae anticæ striatae, canæ lineola a basi fere ad medium ducta, et alia in medio brevior, apice parum flexa. Puncta tria costalia. Subtus obscuræ nitidae. Posticae albae supra margine nigricante, subtus immaculatae.

Larua nuda cinerascens nigro punctata-flavoque linea-
ta similis laruae N. Verbasci.

295. N. cristata alis anticis striatis lanceolatis canis fusco *Lactucae*: obsolete vndatis, subtus fuscis, posticis disco albo.

Noctua *Lactucae* Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in *Lactuca sativa* Dom. Schieffermyller.

Summa affinitas N. umbraticeae. Striga antica thoracis interrupta. Alae striatae vndis aliquot fuscis at absque punctis centralibus costalibusque. Subtus fuscæ basi margineque pallidae punctis tribus costalibus albidioribus. Posticae fuscæ disco albicante.

Larua atra annulis lateralibus albis lineaque dorsali maculari fulua, capite atro: linea antica bisida alba.

- vnbrati-* 296. N. cristata, alis striatis lanceolatis canis: macula centrali ferruginea; punctis duobus nigris. *Sp. inf. 146*
ca. *Noctua lucifuga* Wien. Verz. 312. 11. vix differt.
 Alae subtus fuscae, posticis limbo albido.
- lattea.* 297. N. cristata, alis deflexis niueis nitidis immaculatis.
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.
 Statura omnino N. vembraticeae at duplo minor. Antennae, caput, thorax alba, immaculata. Alae omnes niueae, nitidae omnino immaculatae.
- ✓ *putris.* 298. N. cristata alis deflexis obsoletis subpunctatis: margine exteriori fuso; adiecta macula subocellari.
Noctua putris Wien. Verz. 75. 4. *Sp. inf. 147.*
 Habitat in Europae graminibus.
Larua nuda nigro punctata flavo albido fuscescenti striata, capite nigro.
- lithoxy-*
laea. 299. N. cristata alis deflexis dentatis cinereis fuso maculatis: margine postico fuso.
Noctua lithoxylea Wien. Verz. 75. 2.
 Habitat in Pyro Mus. Dom. Schieffernmyller.
 Media. Corpus cinereum. Thorax linea dorsali brunnea. Alae anticae dentatae cinereae maculis punctis que obsoletis fuscis. Margo posticus tenuissime fuscus. Subtus cinereae margine tenuiori nitido. Posticae cinereae margine postico fuso, subtus immaculatae.
- ✓ *petrifica-*
ta. 300. N. cristata alis dentatis griseo fusoque nebulosis, posticis fuscis, capite antice quadrifido.
Noctua petrificata Wien. Verz. 75. 3.
 Habitat in Austriae Quercu Dom. Schieffernmyller.
 Statura et magnitudo N. lithoxyleae. Antennae fuscae. Caput antice dentibus quatuor distinctis. Thoracis crista itidem bifida. Alae anticae dentatae cinereo fusoque variae maculis ordinariis pallidis.
Larua nuda viridis: linea dorsali candida lineolisque albis sparsis, stigmatibus niueis annulo nigro cinctis, capite viridi.
- ✓ *rhizolit-*
ha. 301. N. cristata alis subdentatis cinereis: lineola baseos intermediaque atris, thoracis crista bifida.
Noctua rhizolitha Wien. Verz. 75. 6.
 Habitat in Quercu Mus. Dom. Schieffernmyller.

Magnitudo praecedentis. Caput cinereum transuerse bifidum. Thorax hirtus, cinereus lunula marginata antica nigra. Crista erecta, bifida. Alae griseae lineola baseos distincta atra, in medio lunulae lineolaque nigrae, apice puncta nigra. Posticae supra fuscæ, subtus cinereæ puncto medio strigaque postica fuscis.

Larua subpilosa viridis albo irrorata: linea dorsali coerulecente.

302. N. cristata alis dentatis griseis: lineolis duabus atris, *conformis* ✓
abdomine subtus brunneo.

Noctua conformis Wien. Verz. 76. 7.

Habitat in Betula alba Mus. Dom. Schieffermüller.

Media. Antennæ nigricantes. Caput et thorax hirta fusca. Abdomen hirtum, in primis subtus brunneum. Alae anticae griseo vix vndatae. In medio alae lineolæ duac vtrinque bifidæ, exteriori adnata macula rufescente. Posticae obscuræ. Subtus omnes cinereæ rufo nitentes puncto medio strigaque postica fuscis.

303. N. cristata alis dentatis cinereis: lineola baseos nigra: adiacente tenuiori albæ. *comma* ✓

Phalaena comma Linn. Syst. Nat. 2. 850. 156. In Sv. 119.

Noctua comma Wien. Verz. 76. 9.

Habitat in Europa.

Alae posticae supra albidae margine fuscæ.

304. N. cristata alis deflexis dentatis cinereo fuscoque variis, thoracis crista bifida. *aduena* ✓

Noctua aduena Wien. Verz. 77. II.

Habitat in Betula alba Dom. Schieffermüller.

Magna cinereo fuscoque varia postice striga abbreviata nigra. In medio maculae ordinariae. Posticæ fuscæ. Thoracis crista eleuata, bifida quasi caniculata.

305. N. cristata alis deflexis fusco griseis vndatis: lineola basilinea. ✓
baseos atra, thoracis crista bifida.

Noctua basilinea Wien. Verz. 78. 72.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Color variat ferrugineis griseisque, distincta lineola parua flexuosa atra baseos. Antennæ albidae.

- radicea.* 306. N. cristata alis deflexis dentatis variegatis: striga postica dentata alba, thoracis crista eleuata bifida.
Noctua radicea Wien. Verz. 81. 15.
 Habitat in graminum radicibus Dom. Schieffermüller.
 Magna. Antennae fuscae. Caput et thorax ferruginea striga antica atra. Alae anticæ dentatae, variegatae lineola atra baseos. In mediq; marginis tenuioris litura alba lineola atra, apice striga valde dentata albida. Posticae basi albidae apice fuscae. Subtus apice rufescentes.
Larua nuda cinerea: maculis eleuatis capite caudaque atris.
- rurea.* 307. N. cristata alis deflexis griseo fuscoque variis, posticis fuscis: margine crassiori albo. *Sp. inf. 148.*
- Myrtilli.* 308. N. cristata alis deflexis ferrugineis albo inaculatis, posticis luteis: fascia lata nigra submarginali. *Sp. inf. 149.*
- Arbuti.* 309. N. cristata, alis deflexis fuscis, posticis nigris fascia flava. *Sp. inf. 150.*

154. PHALAEÑA. *Palpi cylindrici.**Lingua porrecta, membranacea.**Antennæ filiformes.** *Antennis pectinatis.*

- laetaria.* 1. P. bipectinicoris, alis angulatis niveis immaculatis, antennis apice setaceis. Wien, Verz. 98. 9. *Sp. inf. 1.*
- nivearia.* 2. P. pectinicoris alis subangulatis albis: margine posticis anticisque subtus fuscis, posticis puncto centrali nigro. *Sp. inf. 2.*
- vernaria.* 3. P. pectinicoris alis angulatis virescentibus: strigis duabus albis repandis, antennis apice setaceis.
Phalaena vernaria Wien. Verz. 97. 3. *Sp. inf. 3.*
- bupleuraria.* 4. P. pectinicoris alis dentatis viridibus: striga sesquialtera alba, margine fuso punctato.
Phalaena bupleuraria Wien. Verz. 97. 4.

Phalaena sesquistriata Knoch. Beytr. 1. tab. I. fig. 1.
 Habitat in Austriae Bupleuro Dom. Schieffermüller.

Sta-

Statura omnino praecedentis. Alae valde dentatae, vi-rides anticis strigis duabus, posticis vnicis albis. Mar-go posticus fusco punctatus.

5. P. pectinicornis alis angulatis dentatis viridibus: stri-ga vnde undulata obsoleta alba sesquialtera. *Sp. my. 4.* *thymia-ria.*
Wien. Verz. 97. 5.
Schaeff. Icon. 202. fig. 1.
Larua obscura maculis dorsalibus carneis, capite col-larique bidentatis.
Puppa tenuissime folliculata brunnea linea nigra antice acuminata, postice bifida.
6. P. pectinicornis alis angulatis albis: strigis duabus can-didis repandis, antennis apice setaceis. *Sp. my. 5.* *putataria* ✓
Wien. Verz. 98. 10.
7. P. pectinicornis, alis angulatis albidis: strigis duabus flauescensibus obsoletis. *Sp. my. 6.* *friataria*
8. P. pectinicornis alis angulatis albidis: fascia saturatiore striga alba terminata. *margari-taria.*
Phalaena margaritaria Wien. Verz. 95. 1.
Phalaena margaritata Linn. Syst. Nat. 2. 865. 231.
Habitat in Germaniae Carpino Betulo.
Fascia saturatior alae anticae vtrinque, posticae tan-tum postice striga alba terminata.
Larua elongata, 12 poda, variegata: ultimo segmento punctis duabus albis, cæuda bifida.
9. P. pectinicornis, alis angulatis cinereis: striga ferru-ginea ordineque punctorum nigrorum. *Sp. my. 7.* *punctaria* ✓
Reaum. Ins. 2. tab. 29. fig. 1 - 4.
Knoch. Beytr. I. 13. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Europæ Quercu.
Larua geometra cinerea maculis lateralibus flavis rubro-notatis.
Puppa folio alligata supra subcarnea, subtus flauescens.
10. P. pectinicornis, alis angulatis fuscis: strigis purpu-reis, apice pallidis. *Sp. my. 8.* *Dioraria.*
11. P. pectinicornis, alis angulatis omnibus pallidis pul-uerulentis: fascia purpureo recta strigaque fusca re-panda. Schaeff. Icon. tab. 214. fig. 3. *Sp. my. 9.* *amata-ria.*

pennaria. 12. P. pectinicornis alis subdentatis rufescentibus: strigis duabus fuscis punctoque apicis albo Linn. Syst. Nat. 2. 861. 209. Wien. Verz. 103. 12.

Habitat in Germaniae Potona.

Alae anticae rufescentes fasciis duabus punctoque medio fuscis. Pone apicem punctum distinctum album. Posticae rufescentes puncto medio fusco.

Larua solitaria, glabra, rufescens.

falcataria 13. P. pectinicornis alis fulcatis glaucis: anticis vndis fasciaque griseis; puncto fuso. Sp. sig. 10.

Bombyx falcataria Wien. Verz. 64. 2.

Larua dorso virescente fuso punctato, antice aculeis quatuor paruum, cauda acuminata, subtus viridis linea laterali rubra.

culturaria. 14. P. pectinicornis alis subfalcatis luteis: fascia saturatiore, antennis apice setaceis. Sp. sig. 11.

Bombyx sicula Wien. Verz. 64. 1.

strigaria. 15. P. pectinicornis alis angulato caudatis albis: strigis duabus fuscis supra duabus subtus vnicis. Sp. sig. 12.

Phalaena sambucana Clerk. Icon. tab. 50. fig. 3. 4.

sambuca-ria. 16. P. pectinicornis alis caudato angulatis flavescentibus: strigis duabus obscurioribus, posticis apice bipunctatis. Wien. Verz. 103. 1. Sp. sig. 13.

lacertina-ria. 17. P. pectinicornis alis erosis lutescentibus: strigis duabus fuscis. Sp. sig. 14.

Phalaena erosaria Wien. Verz. 103. 4.

equestra-ria. 18. P. pectinicornis alis angulatis: anticis fuscescientibus; fascia lata flava, posticis flavis. Sp. sig. 15.

alniaria. 19. P. pectinicornis alis erosis flavis fuso pulueratis: strigis duabus fuscis. Sp. sig. 16.

Wien. Verz. 103. 2.

syringa-ria. 20. P. pectinicornis alis suberosis: omnibus griseo flavescentibus: strigis repandis fuscis albisque. Sp. sig. 17.

Wien. Verz. 103. 8.

lunaria. 21. P. pectinicornis alis angulato dentatis basi rufis: lunula alba, postice cinereis. Sp. sig. 18.

dentaria. 22. P. pectinicornis alis angulato dentatis supra pallidis: strigis ferrugineis, subtus ferrugineis: lunula obscuriori. Sp. sig. 19.

23. P. pectinicornis alis dentatis griseis: atomis strigis- *roboraria* ✓
que numerosis fuscis. *P. Repandata Linnae.*
Phalaena roboraria Wien. Verz. 101. 1.
Habitat in Quercu Mus. Dom. Schieffermyller.
Magna tota grisea atomis strigisque vndatis fuscis. Sub-
tus alae albidae lunulis fuscis.
Larua griseo fusca: linea dorsali arcubusque singuli
guli segmenti obscurioribus.
24. P. pectinicornis alis dentatis griseis fuscō strigosis: *consorta-*
posticis puncto oblongo ocellari albido. *ria.*
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura omnino praecedentis paullo minor grisea ato-
mis strigisque fuscis distincta puncto oblongo albo
annulo fuscō cincto in medio alae posticae. Subtus
omnes griseae puncto medio strigaque fuscis.
25. P. bipectinicornis, alis dentatis albis fuscō vndatis, *vndaria*
~~et~~ antennis apice setaceis. *Sp. vng. 20.*
26. P. pectinicornis alis angulatis flauis: strigis ferrugi- *dolabra-* ✓
neis: angulo ani violaceo. *Sp. vng. 21.* *ria.*
Wien. Verz. 104. 16.
27. P. pectinicornis, alis angulatis viridibus: anticis stri- *ilyraria*.
~~et~~ gis tribus fuscis. *Sp. vng. 22.*
28. P. pectinicornis alis dentatis viridibus: striga puncto- *monilaria*
~~et~~ rum nigrorum, posticis puncto duplice alba. *Sp. vng. 23.*
29. P. pectinicornis alis rotundatis albis: margine fuscō; *feruida-*
~~et~~ striga vndata alba. *ria.*
Habitat in Africa aquinoctionali Mus. Dom. Banks.
Magna; Antennae pectinate, nigrae. Corpus flave-
scens thorace postice albo. Alae hirtae albae margi-
ne postico fuscō striga valde vndata alba. Costa alae
anticae nigra albo maculata. Subtus omnes albae
margine fuscō.
30. P. pectinicornis, alis anticis griseis: posticis fer- *rondela-*
~~et~~ rugineis. *Sp. vng. 24.* *ria.*
31. P. pectinicornis, alis rotundatis flauescientibus: stri- *vibicaria*. ✓
gis tribus purpureis; anteriore obsoletiore. *Sp. vng. 25.*
Wien. Verz. 117. 2.
32. P. pectinicornis, alis rotundatis flauescientibus: stri- *flauaria*.
gis duabus repandis fuscis.
~~et~~ Habi-

Habitat in India orientali Dom. Vahl.
 Maior. Corpus flauum fronte fulua. Alae omnes flavescentes in medio strigis duabus fuscis repandis. Pone strigas maculae due paruae fuscae. Subtus concolores.

papilionaria. 33. P. pectinicornis alis viridibus subrepandis: striga sesquialtera repanda. *Sp. vng. 26.*

Wien. Verz. 96. 1.

macularia. 34. P. pectinicornis alis fuluis apice nigris: fascia macularia. *Exod. lari alba. Sp. vng. 27.*

Phalaena Helcita Drury Ins. 3. tab. 29. fig. 4.

catenaria. 35. P. pectinicornis, alis rotundatis albis: lunula media in strigaque postica vndata nigra. *Sp. vng. 28.*

flabellaria. 36. P. pectinicornis alis rotundatis albis: anticis apice obscurioribus.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.
 Media. Corpus albidum antennis valde pectinatis fuscis. Alae omnes rotundatae, albae, anticae fusco venosae apiceque obscuriores, posticae immaculatae.

prunaria. 37. P. pectinicornis, alis subdentatis luteis fusco puluerulentis: anticis lunula fusca. Wien. Verz. 104. 17. *Sp. vng. 29.*

furcaria. 38. P. pectinicornis, alis griseo nebulosis: omnibus subtus puncto nigro; lunula alba. *Sp. vng. 30.*

piniaria. 39. P. pectinicornis, alis fuscis flavo maculatis subtus nebulosis: fasciis duabus fuscis. *Sp. vng. 31.*

Wien. Verz. 106. 7.

limbaria. 40. P. pectinicornis alis ferrugineis: limbo nigro, posticis subtus nigris albo striatis. *Sp. vng. 32.*

albidaria. 41. P. pectinicornis, alis rotundatis albis: anticis costa apiceque, posticis macula marginali atris.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Media. Antennae pectinatae apice setaceae, atrae. Caput album collaris flavo. Thorax albus antice niger. Abdomen basi album apice fuscum. Alae anticae albae margine exteriori et postico lato atris, posticae albae macula apicis atra.

confusa. 42. P. pectinicornis, alis rotundatis cinereis: atomis numerosis fuscis.

Phalaena confusa Wien. Verz. 106. 8.

Ch. angularia Sch.?

Habi-

Habitat in Austriae Saluia pratensi Dom. Schieffermüller.
Statura et magnitudo P. piniariae, tota cinerea atomis
numerosis fuscis. Interdum punctum medium sub-
ocellatum, fuscum. *Mas* antennis minus pectina-
tis albidior.

Larua caudata albida, rufo striata, cauda bidentata.

43. P. pectinicornis alis cinereis fusco irroratis; anticus *rora*
puncto medio apice nigris. *Sp. ing. 33.*

Phalaena plumaria Wien. Verz. 106. 9.

Habitat in Loto Dorycnio.

Larua cinerea, segmentis albis, capite pallido: striis
duabus fuscis.

44. P. pectinicornis, alis nigro punctatis maculatisque: *melana-*
anticis albidis posticis flavis. *Sp. ing. 34.*

Knoch. Beytr. I. II. 3. tab. I. fig. 3.

45. P. pectinicornis alis omnibus luteis fusco irroratis. *adspersa-*
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. *ria.*

Statura omnino P. limbareae, at alae omnes supra sub-
tusque luteae atomis numerosissimis fuscis.

46. P. pectinicornis, alis omnibus lutescentibus: strigis *atomaria*
atomisque fuscis. *Sp. ing. 35.*

Phalaena artemisiaria Fyest. Arch. 2. tab. 4.

Wien. Verz. 105. 5.

Habitat in Centaurea Scabiosa.

Conf. *P. glarearia* ex Lathyro pratensi Wien. Verz.
106. 6. aut satis distincta.

47. P. pectinicornis alis lutescentibus: atomis strigisque *prosapia-*
atribus fuscis; tertia maculari. *Sp. ing. 36. via den ria.*

48. P. pectinicornis alis anticus cinereis fusco vndatis: fa- *bipuncta-*
scia media obscuriori; punctis duobus atris. *ria.*

Phalaena bipunctaria Wien. Verz. III. 5.

Phalaena undulata Scop. carn.

Habitat in Lolio perenni Austriae Dom. Schieffermüller.

Media. Antennae fuscae parum pectinatae apice seta-
ceae. Alae anticae cinereae fusco vndatae. In me-
dio fascia lata obscurior et hae puncta duo atra. Po-
sticae striga punctorum nigrorum. Posticae cinereae.

49. P. pectinicornis alis viridi cinereoque variis: strigis *Lichena-*
duabus nigris; anteriore recurva, posteriore vndato *ria.*

flexuosa. *Pictaria* Th.

Pha-

Phalaena Lichenaria Wien. Verz. 100. 8.

Habitat in Austriae Lichenibus Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua tenera. Alae anticae cinereae viridi colore in primis in medio mixto. Striga ante medium atra, recurva et altera valde flexuosa vndata versus marginem. Margo ipse nigro punctatus. Posticae griseae striga vndata punctisque marginalibus fuscis.

Larua scabra viridis aut cinerea luteo varia: lateribus atro maculatis, pedibus anticis macula atra: puncto viridi.

Variat color laruae secundum colorem Lichenum.

cineraria 50. P. pectinicornis alis anticis griseis: strigis duabus nigris, posticis cinereis: striga unica.

Phalaena cineraria Wien. Verz. 100. 10.

Habitat in Rysso candelario Dom. Schieffermyller.

Parua, tenera, grisea, margine nigro punctato.

Larua fusca dorso cinereo: maculis transuersis albis.

pusaria. 51. P. pectinicornis, alis niveis: strigis tribus obsoletis fuscis. Wien. Verz. 107. 4. Sp. ing. 37.

ocularia. 52. P. pectinicornis alis rotundatis flavis: omnibus punctis ocellari flavo. Sp. ing. 38.

annularia 53. P. pectinicornis alis cinereis: striga annulo fasciaque fuscis. Sp. ing. 39. Scuticulata Th?

Phalaena omicronaria Wien. Verz. 107. 3.

Habitat in Acere campestris.

capreola. 54. P. pectinicornis alis griseis: fascia saturatiore; puncto medio lineolaque apicis nigris. an *Oscularia* Schm.

Phalaena capreolaria Wien. Verz. 105. 2.

Habitat in Pino Picea Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura P. desfoliariae at minor. Antennae pectinatae fuscae. Alae anticae griseae siue cinereae atomis fuscis. In medio fascia lata postice sinuata, obscurior et in hac punctum nigrum. In apice lineola nigra. Posticae cinereae strigis atomisque fuscis. Subtus omnes cinereae, anticis punto, posticis punto strigaque punctorum nigrorum.

murina. 55. P. pectinicornis alis griseis: strigis duabus punctoque medio fuscis.

Phalaena murinaria Wien. Verz. 105. 4.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua, tenera. Corpus griseum. Alae omnes griseae, anticae strigis duabus subundatis puncto que medio fuscis. Posticae puncto medio strigaque postica fuscis. Subtus omnes griseac, immaculatae.

56. *P. pectinicornis* alis griseis: atomis fuscis medio al- *defoliaria*. ✓
bis: puncto fuso, femina aptera nigro punctata.
Wien. Verz. 105. 1. Sp. mag. 40.

Roef. Inf. 3. tab. 14. ♀

Roef. Inf. 3. tab. 40. fig. B. ♂

57. *P. pectinicornis* alis cinereis: striga fusca vndata al- *hirsuta-*
bae innata Gen. Inf. Mant. 285. Sp. mag. 41. *ria.*

58. *P. pectinicornis* alis griseo virescentibus fuscis irro- *pedaria.*
tis pedibus albo annulatis, femina aptera.

Habitat in Betula Alno Dom. Hybner.

Obscura. Alae griseae viridi colore nitentes maculis atomisque fuscis. Posticae albidiiores strigis atomis-
que obscurioribus. Pedes omnes grisei albo annulati.

59. *P. pectinicornis* alis cinereo fuscis: striga vndata ob- *hispida-*
scuriore; margine albo punctato, antennis flauis. *ria.* ✓
Phalaena hispidaria Wien. Verz. 99. 4.

Habitat in Austria. Mus. Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis *P. hirtariae* at paullo minor. Corpus hir-
tum griseo fuscum. Antennae flavae. Alae obscu-
rae striga media vndata obscuriore. Margo albo
punctatus.

60. *P. pectinicornis* alis hirtis canis: strigis tribus nigris; *hirtaria.* ✓
posterioris approximatis, antennis atris.
Wien. Verz. 99. 3.

61. *P. pectinicornis* alis nigris nitidulis: strigis obscurio- *horrida-*
ribus. Wien. Verz. 100. 7. *ria.*

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Parua. Corpus atrum, immaculatum. Alae omnes ni-
grae, nitidulae strigis aliquot obscurioribus.

62. *P. pectinicornis*, alis flavescentibus: strigis duabus, *vesperta-* ✓
posteriore limbum obscurum distingue, Sp. mag. 42. *ria.*
Phalaena parallelaria Wien. Verz. 104. 15.

63. *P. pectinicornis*, alis cinereis: anticis fasciis quatuor *Wauaria* ✓
nigris abbreviatis inaequalibus. Sp. mag. 43.

Wien. Verz. 106. 12.

nivearia. 64. P. pectinicornis, alis niveis immaculatis, anticis subtus fuscescens.

Phalaena nivearia Wien. Verz. II6. 4.

Phalaena niveata Scop. carn.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Media. Antennae fuscae. Alae omnes albae supra immaculatae, subtus anticae fuscescentes.

pluviaria 65. P. pectinicornis alis cinereis fusco irroratis: strigis anticarum duabus, posticarum vniqa fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Antennae pectinatae rachi pallida. Corpus cinereum. Alae omnes cinereae parum lutescentes. Anticae strigis duabus, posticae vniqa fuscis. Subtus concolores at anticis loco strigae anticae macula oblonga disci.

prasina-
ria. 66. P. pectinicornis alis viridibus: strigis tribus anticis obscurioribus, postica pallida. Sp. in. 44.

Phalaena cythisaria Wien. Verz. 97. 2.

Habitat in Germaniae Cytiso.

Larua viridis: linea laterali alba, capite collari cauda que bidentatis.

smarag-
daria. 67. P. pectinicornis, alis viridibus: anticis strigis duabus punctoque medio albis.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Statura praecedentis. Antennae pectinatae fuscescentes. Alae omnes virides, anticis striga baseas e lunulis duabus cohaerentibus alba. In medio punctum album et postice striga vndata alba. Posticae immaculatae. Subtus omnes virescentes striga pallida.

ditaria. 68. P. pectinicornis alis viridibus: maculis marginalibus ferrugineis. Sp. in. 45.

Phalaena bajularia Wien. Verz. 97. 6.

Habitat in Quercu Germaniae.

Larua grisea foliolis squamisque obtecta.

viridaria 69. P. pectinicornis alis rotundatis viridibus albo strigosis maculisque marginalibus atris. *Selestatvia*. Th.

pagaria. 70. P. pectinicornis alis rotundatis coeruleo nigris: fascia maculari apicis alba.

Phalaena Panthorea Cram. Inf. 27. tab. 322. fig. C.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Statura omnino P. tripunctariae. Corpus fuscum coeruleo nitidum. Alae omnes fuscae viridi nitentes postice fascia maculari niuea.

71. P. pectinicornis alis fuscis; anticis basi striatis fascia que maculari, posticis basi albis. *Sp. ing. 47.* *tripunctaria.*
72. P. pectinicornis alis rotundatis fuscis flauo subfasciatis, carbonaria apice setaceis.

Phalaena carbonaria Wien. Verz. 108. 5.

Habitat in Bryo murali Dom. Schieffermyller.

Parua. Antennae pectinatae apice setaceae. Caput et thorax nigra. Alae omnes fuscae strigis vndatis, obscurioribus aliisque flauis, quae ad marginem tenuiorem macula magna flava terminantur.

73. P. pectinicornis alis concoloribus nigris: anticis maculis duabus, posticis vnicis flauis. *Sp. ing. 48.* *Iatropharia.*
74. P. pectinicornis alis atris: anticis fascia maculari, posticis puncto medio albo. *ludinaria.*

Phalaena ludicrinia Cram. Ins. II, tab. 128. fig. E.

Edw. Av. 35. tab. 35.

Habitat in India orientali.

Statura et summa affinitas P. tripunctariae.

75. P. pectinicornis, alis concoloribus nigris: fasciis duabus virescentibus strigaque maculari alba. *Sp. ing. 49.* *Catilina.*

76. P. pectinicornis, alis concoloribus albis nigro variis, corpori flauo nigro maculato. *Sp. ing. 50.* *cenaria.*

77. P. pectinicornis alis fuso ferrugineis: strigis tribus fuscis maculaque costali cinerea. *lateraria.*

Habitat in Indiis.

Statura et magnitudo P. moeniariae. Antennae pectinatae, albae. Corpus fuscum. Alae anticae obscure ferrugineae strigis tribus punctoque medio fuscis. Macula cinerea magna costalis inter secundam tertiamque strigam. Margo posticus cinerascit. Posticae obscure ferrugineae. Subtus omnes plumbeae margine postico obscuriore.

78. P. pectinicornis alis rotundatis atris coeruleo striatis maculatisque. *Sp. ing. 51.* *fenestria.*

79. P. pectinicornis alis luteis: margine venisque dilatatis ramosis nigris. *Sp. ing. 52.* *venaria.*

- moenia-* 80. P. pectinicornis alis anticis cinereis: fascia lata fusca; puncto gemino nigro.
ria. *Phalaena moeniaria* Wien. Verz. 112. 1.
Phalaena moeniana Scop. carn.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
 Statira et magnitudo P. chenopodiatae. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae fascia lata postice vni-denta vtrinque flavo marginata fusca. In medio fascia dilutior punctis duobus approximatis nigris. Apex terminatus lineola fusca. Posticae cinereae.
- obliqua-* 81. P. pectinicornis alis atris: anticis fascia obliqua alba,
ria. posticis lata flava.
 Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.
 Magna. Antennae pectinatae nigrae rachi coerulea. Corpus nigrum cyaneo subtus maculatum segmentis abdominalibus margine albis. Alae anticae atrae fascia obliqua alba. Posticae atrae fascia lata flava puncto marginis exterioris atro. Subtus concolores at cyaneo maculatae.
- puluer-* 82. P. pectinicornis alis omnibus testaceo puluerulentis:
ria. fascia lata ferruginea. *sp. inq. 53.*
- fasciaria.* 83. P. pectinicornis, alis omnibus rufescensibus: fascia lata ferruginea: margine albo. *sp. inq. 54.*
Phalaena fasciaria Wien. Verz. 96. 2.
Phalaena prasinaria Wien. Verz. 96. 3. vix distincta.
 Habitat in Europae Pino.
Larua 12 poda, rufa fusco alboque varia, capite rufescente.
- margina-* 84. P. pectinicornis alis albidis puluerulentis: omnibus striga marginali punctorum nigrorum. *sp. inq. 55.*
- betularia.* 85. P. pectinicornis alis omnibus albis: atomis nigris, thorace fascia nigra, antennis apice setaceis. *sp. inq. 56.*
 Wien. Verz. 99. 2.
- nitidaria* 86. P. pectinicornis alis argenteis: anticis strigis duabus obliquis fuscis.
 Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.
 Minor P. betulariae. Corpus album. Antennae parum pectinatae. Alae anticae argenteae, nitidae strigis duabus obliquis fuscis. Posticae immaculatae subtus atomis strigisque postica fuscis.

87. P. pectinicornis alis albis nigro punctatis; fasciis duabus latiis fuscis. prodromaria.

Phalaena prodromaria Wien. Verz. 99. 1.

Habitat in Germaniae Quercu; Tilia.

Statura omnino P. betulariae. Caput album antennis nigris albo annulatis. Thorax hirtus albus fasciis duabus abbreviatis nigris. Abdomen griseum. Alae albe nigro punctatae fasciis duabus fuscis nigro marginatis. *Mas* minor pallidior.

Larua geometra mox cinerea, mox fusca, mox ferruginea, capite carneo.

Puppa folliculata brunnea sub terra.

88. P. pectinicornis alis flavis: striga obliqua sanguinea. *sacraria*.

89. P. pectinicornis alis griseis: anticis fascia lata obscuriore; puncto medio nigro. *elinguaria*.

Wien. Verz. 103. 11.

90. pectinicornis alis plumbeis: strigis tribus punctoque plumbum medio fuscis. *an 4. foliaria* *Tauric.*

Phalaena palumbaria Wien. Verz. 102. 7.

91. P. pectinicornis alis nigricantibus griseo subfasciatis. *lignaria*

Habitat in Saxoniae ligno putrido Mus. Dom. Romani. Alae omnes nigricantes strigis numerosis griseis.

Larua geometra nigra: lineis quatuor punctorum nigrorum.

92. P. pectinicornis alis luteis: margine anticearumque purpurea fasciis duabus purpureis. Wien. Verz. 102. 9. *fr. 60. ria*.

Larua viridis: dorso fuscō; linea pallida.

93. P. pectinicornis, alis griseis: striga obliqua alba macula ferruginea. *artesaria*

Phalaena artesaria Wien. Verz. 102. 2.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Minor. Alae anticae griseae pone medium striga obliqua albida et pone hanc macula ferruginea strigae contigua. Posticæ immaculatae.

94. P. pectinicornis alis flavissimis: strigis tribus marginatis neque fuscis. *aureola*.

Phalaena aureolaria Wien. Verz. 102. 8.

Habitat in Austriae Vicia dumetorum. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae omnes concolores flavae anticis strigis tribus, posticis duabus margineque fuscis.

Larua tenuis, glabra, albida dorso obscuriore: linea fusca.

giluaria. 95. P. pectinicornis alis anticis flauescensibus: fascia obliqua atomisque fuscis.

Phalaena giluaria Wien. Verz. 102. 10.

Habitat in Achillaea Mellefolio Dom. Schieffermyller.

Paullo praecedente maior. Alae anticae flauescentes fascia a medio marginis tenuioris ad apicem ducta posticae albidae.

Larua obscure cinerea ferrugineo lineata lineaque dorsali albida.

fuligina- 96. P. pectinicornis alis atris albo fasciatis, subtus griseis: ria. fasciis fuscis. Sp. ing. 61.

minuta- 97. P. pectinicornis alis cinereis: strigis fasciaque postica ria. fuscis. Sp. ing. 62.

pygma- 98. P. pectinicornis, alis cinereis: basi fusca striga atra ria. terminata.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parua. Antennae pectinatae. Corpus cinereum. Alae anticae basi fuscae et hic color terminatur striga atra, tunc cinereae striga postica vna alteraue fusca, subtus cinereae lunula centrali fusca.

** *Antennis setaceis.*

politata. 99. P. seticornis alis angulato caudatis flavis: anticis fasciis duabus punctatis rufis. Sp. ing. 63.

caudata. 100. P. seticornis alis angulato caudatis albis fusco fasciatis punctisque tribus caudalibus atris. Sp. ing. 64.

fasciata. 101. P. seticornis alis angulatis plumbeis: fascia nivea. En *Phalaena Eleonora* Cram. Ins. 24. tab. 288. fig. E. F. G. Sp. ing. 65.

angulata. 102. P. seticornis alis angulato caudatis strigis striolisque griseis punctoque caudali atro.

Habitat in Africa aequinoctiali.

Parua tenera. Corpus album. Alae omnes albae strigis duabus distinctis et praeterea lineolis plurimis transuersis griseis. Alae posticae caudatae puncto magno caudali atro duobusque lateralibus minoribus. Subtus omnes albae.

103. P. seticornis alis angulatis fusco albo nigro fuluoque *cynata*.
En variis, posticis subtus albis. Sp. *vig. 66.*

104. P. seticornis alis angulatis supra immaculatis subtus *arenata*.
En atomis strigisque fuscis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Media. Alae omnes cinereae, obscurae, immaculatae, anticae acuminatae, posticae angulatae, subtus saturatores fusco irroratae strigaque ante medium, dein aliae punctis, demum aliquot vndatae fuscae.

In alis anticis strigae omnes abbreviatae.

105. P. seticornis alis angulatis cinereis: anticis litura *regulata*.
En fusca. Sp. *vig. 67.*

106. P. seticornis alis falcatis fuluis: punctis duobus fu- *falcata*.
scis inter strigas luteas. Sp. *vig. 68.*

Bombyx hamula Wien. Verz. 64. 4.

107. P. seticornis alis emarginatis griseis: punctis duobus *flexula*.
fuscis inter strigas albidas.

Phalaena sinuata Sp. Inf. 2. 254. 69.

Phalaena flexula Wien. Verz. 64. 3.

Larua virescens, collo gibbo clauato, cauda acuminata, capite pedibus rufescentibus.

108. P. seticornis alis angulatis fuscis: fascia obscuriore, *mantata*.
En anticarum punto ocellato atro. Sp. *vig. 70.*

109. P. seticornis alis angulatis griseo flavoque variis: *liturata*.
En anticis macula media liturisque costalibus albis.

Habitat in India Dom. Lund.

Statura praecedentium. Corpus subtus album. Alae griseo flavoque variae strigis fuscis. Anticae in medio flavescentes macula magna alba et ad costam litrae aliquot, e quibus postica maior, distinctior strigam obsoletam terminat. Ad marginem posticunum macula magna nigricans arcu niveo cincta. Posticae eiusdem coloris at absque macula media costali, in angulum excurrunt. Subtus omnes cinereae puncto centrali nigro.

110. P. seticornis alis angulato dentatis viridibus: posti- *neutra*.
En cis macula media alba. Sp. *vig. 71.*

111. P. seticornis alis angulatis viridibus: macula subocel- *phyllirata*.
En lari fulva. Sp. *vig. 72.*

demandata, 112. P. seticornis alis subangulatis latescentibus: strigis tribus fuscis punctisque medio atro. *Sp. iug. 73.*
Wien. Verz. 104. 10.

explanata, 113. P. seticornis alis dentatis ferrugineis: fascia fusca; ta. *Ex* punto nigro. *Sp. iug. 74.*

rhamna, 114. a P. seticornis alis dentatis fuscifcentibus: fascia media dentata obscuriore; lunula atra, puncto strigaque fuscis.

Phalaena rhamnata Wien. Verz. 109. 2.

Habitat in Austriae Rhamno cathartico Mus. Dom. Schiefermyller.

Magna. Alae omnes obscurae cinereo valde vndatae in primis basi apiceque. In medio alae anticae lunula parua nigra. Subtus omnes cinereae puncto medio strigaque postica vndata fuscis.

Larua viridis linea dorsali fusca, segmentorum marginibus flauis, capite fuso.

dubitata, 114. b P. seticornis alis obscuris fusco cinereoque vndatis: neruis albo punctatis.

Phalaena dubitata Wien. Verz. 109. 3.

Habitat in Austriae Rhamno cathartico Mus. Dom. Schiefermyller.

Nimis praecedenti affinis differt tamen alis obscuris fusco pallidoque vndatis neruis albo punctatis. Alae posticae haud concordes vii in praecedente, sed cinereae neruis albo punctatis apice striga pallida nigraque. Subtus cinereae lunula media punctisque neruorum fuscis.

Larua viridis fusco pallidoque sublineata: linea laterali flava.

cinerata, 115. P. seticornis alis subangulatis cinereis: strigis quatuor fuscis. *Sp. iug. 75.*

dimidiata, 116. P. seticornis alis dentatis antice flauis postice fuscis. *Sp. iug. 76.*

irrorata, 117. P. seticornis alis dentatis flauis fusco irroratis subtus *Ex* macula fasciaque postica fuscis. *Sp. iug. 77.*

carinata, 118. P. seticornis alis dentatis flavo fuscoque variis: striga angulata atra. *Sp. iug. 78.*

viridata, 119. P. seticornis alis angulatis omnibus viridibus: striga pallida, Wien. Verz. 97. 17. *Sp. iug. 79.*

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 225. fig. 5.

Larua carnea: linea dorsali obscuriore, capite collo-
que bidentatis.

120. P. seticornis alis dentatis fuscō griseis: fascia lata *furuata*.
dentata obscuriore.

Phalaena furuata Wien. Verz. 108. 1.

Habitat in Viburno Lantana Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Antennae intus ferrugineae. Alae omnes den-
tatae obscure griseae. Ante medium fascia lata, vtrin-
que dentata obscurior et pone hanc striga obsoleta
pallida. Subtus omnes basi obscurae apice palli-
diores.

*Larua liuida carneo vndata nigroque punctata postice
denticulorum tribus paribus: intermedio minori.*

121. P. seticornis alis dentatis griseis nigro vndatis pun-
ctoque medio subocellari. *liidata.* ✓

Phalaena obscurata Wien. Verz. 108. 3.

Habitat in Rubo Caesio Austriae Mus. Dom. Schieffer-
myller.

Media. Alae omnes valde dentatae, griseac strigis ob-
soletis ~~intervallis~~ nigris. In medio punctum sub-
ocellatum, album. Subtus cinereae striga vndata
apicis nigra.

*Larua fusca albo punctata postice bidentata, capite ci-
nereo.*

122. P. seticornis alis griseis: strigis pallidioribus vnda-
tis obsoletis. *Sp. 80. au magellanica Th.* *obscurata* ✓

Habitat in Myrtillo Sueciae.

123. P. seticornis alis angulatis pallidis: strigis tribus sub *notata*.
fuscis: anticis punctis quatuor approximatis. *Sp. 81.*

Phalaena notata Wien. Verz. 104. II.

Schaeff. Icon. tab. 230. fig. 1.

124. P. seticornis alis subdentatis obscure griseis subtus *nitata*. ✓
pallidioribus: puncto fasciaque fuscis. *Sp. 82.*

125. P. seticornis alis angulatis niueis: anticis macula mar-
ginali, posticis strigis quatuor approximatis fuscis: *arcata*. ✓
Sp. 83.

126. P. seticornis alis angulatis fuscō cinereis fulvo va-
riis: macula media fenestrata punctisque costali-
bus albis. *sponsata*.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Media. Corpus cinerascens fuluo irroratum. Alae anticae obscure cinereæ strigis vndatis obsecurioribus maculisque in primis ad costam majorique in medio fuluis, et in hac lunula magna fenestrata. Puncta practerea quinque niuea in ipsa costa. Posticae angulatae, obscuræ macula media fulua. Subtus omnes albidae striga vndata marginaque postico fuscis.

fuscata. 127. P. seticornis alis angulatis fusca: anticis fascia obsecuriore; macula ocellari albida.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Media. Palpi elongati apice cylindrici. Alae angulatae fuscae, anticae fascia media lata nigra et in hac macula ocellaris albida, versus apicem alae puncta duo atra. Posticae fuscae strigis duabus pallidioribus. Subtus omnes fuscae, anticis macula ocellari albida.

decorata. 128. P. seticornis alis subangulatis cinereis: anticis fasciis tribus, posticis vnicæ flavis auro marginatis. sp. n. 84.

parata. 129. P. seticornis alis pallidis rufo puluerulentis: omnibus puncto ocellari albo. sp. n. 85.

Phalaena punctaria Wien. Verz. 107. 2.

Larua viridis: lineolis lateralibus punctisque rufis.

Emarginata. 130. P. seticornis alis subemarginatis pallidis: fasciis duabus griseis punctoque fuscis. sp. n. 86.

Phalaena lineolata Wien. Verz. 102. 1.

bicolora. 131. P. seticornis alis coerulecentibus striatis: anticis apice atris albo maculatis. sp. n. 87.

grossula. 132. P. seticornis alis albidis; maculis rotundatis nigris: anticis strigis luteis. sp. n. 88.

Wien. Verz. 114. 11.

vulnulata. 133. P. seticornis alis omnibus strigis confertissimis vndatis fusca: W. Verz. 109. 16. sp. n. 89.

hesperata. 134. P. seticornis alis rotundatis concoloribus coerulecentibus: fascia lata alba. sp. n. 90.

flaviecola. 135. P. seticornis, alis concoloribus nigris: disco communia flavo crenato. sp. n. 91.

populata. 136. P. seticornis alis flavo pallidis: anticis subfasciatis, apice subtus fusco contaminatis. W. Verz. 113. 17.

sp. n. 92.

137. P.

137. P. seticornis alis flauis: strigis quatuor vndatis fuscis; posteriori maculari. *Phalaena pyraliata* Linn.
Phalaena pyraliata Wien. Verz. 117. 1.
 Habitat in Austriae Gallio vero Dom. Schieffermyller.
 Statura omnino P. populatae. Alae anticae flauae strigis quatuor, quarum tres vndatae, quarta vero macularis. Subtus puncto medio, striga postica maculaque apicis fuscis. Posticae supra pallidiores striga fusca, subtus puncto medio strigisque duabus fuscis.
138. P. seticornis alis anticis flavecentibus: fasciis tribus comitata. grisibus puncto apicisque lineola fusca. *Phalaena comitata* Sp. vng. 93.
Phalaena comitata Wien. Verz. 112. 3.
Phalaena chenopodiata Wien. Verz. 112. 2. vix differt.
Larua vicii ferrugineoque varia, capite pallido: lineis duabus fuscis.
139. P. seticornis, alis albidis: fasciis duabus ferrugineo ultata. fuscis: postica maculari. *Phalaena pantaria* pectinicornis alis albis: fascia maculari flauicante, abdomine luteo nigro punctato. Linn. Syst. Nat. 2. 863. 218.
Phalaena pantaria Wien. Verz. 115. 12.
Phalaena syluata Scop. carn.
140. P. seticornis, alis albis subtus nigro venosis. *Phalaena dealbata* Wien. Verz. 116. 3. *Phalaena dealbata* dealbata.
141. P. seticornis, alis rotundatis fuluis: punctis striga- aurata. que postica aureis. *Phalaena aurata* Sp. vng. 96.
142. P. seticornis, alis griseo fuscis: fasciis duabus pal- prunata. lidis repandis; postica semiterminali. *Phalaena prunata* Wien. Verz. 113. 19.
Larua cinerea: maculis dorsalibus pedibusque rufis, collari atro.
143. P. seticornis, alis flauissimis: anticis maculis costa- crataega. libus tribus ferrugineis; media subargentea. ta. Wien. Verz. 104. 13. *Phalaena crataega* 98.
144. P. seticornis alis ferrugineo fuscis cinereo substrigo. aurantia- sis, posticis aurantiis: puncto centrali griseo. *Phalaena diversata* Frank. Beytr. 2. 1. 457. tab. Wien. Verz. 315. 14.
 Habitat in Germania Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo et statura P. prunatae. Alae anticae fuscae ferrugineo parum nitentes. Costa cinereo punctata, quae in strigas obsoletas excurrunt. Posticae aurantiae, fusco irroratae puncto medio magno distincto marginaque fuscis. Subtus anticae aurantiae atomis punctoque medio fuscis. Posticae atomis numerosioribus strigaque postica fuscis.

Facmina pallidior alis magis rotundatis.

equestra. 145. P. seticornis alis omnibus nigris, fascia fulua. *Phalaena alpinata* Wien. Verz. 115. 14. Sp. inq. 99.

dimidiata 146. P. seticornis alis atris: anticis fascia fulua, posticis immaculatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino P. jatrophariae at paullo minor. Antennae setaceae. Alae omnes atrae; anticis fascia lata fulua, posticis immaculatis.

lucidata. 147. P. seticornis alis obscure coeruleis: striga punctorum aureorum. Sp. inq. 100.

marginalia. 148. P. seticornis alis omnibus albis: margine exteriori limbo fusco interrupto. Wien. Verz. 114. 10. Sp. inq. 101.

miata. 149. P. seticornis alis griseis: fasciis tribus viridibus; intermedia latiore fusco vndata. Sp. inq. 102.

Phalaena miata Wien. Verz. 113. 21.

rubidata. 150. P. seticornis alis anticis fuscis: fasciis duabus ferrugineis.

Phalaena rubidata Wien. Verz. 113. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

paullo minor. P. miatae. Alae anticae basi fuscae tunc fascia lata ferruginea, demum fuscae ad marginem tenuiorem cinerecentes fusco parum vndatae denique fascia altera rufa postice cinereo vndata apice fuscae.

coeruleata. 151. P. seticornis alis obscure viridibus fusco fasciatis fascisque duabus coeruleis. Sp. inq. 103.

rufata. 152. P. seticornis: alis cinereis postice ferrugineis: striga alba punctisque marginalibus nigris. Sp. inq. 104.

Phalaena obliquaria Wien. Verz. 102. 6.

spartiata. 153. P. seticornis, alis oblongis fuscis: vitta albida, posticis cinereis.

Phalaena spartiata Fyesl. Arch. 2. tab. 5.

Habi-

Habitat in Germaniae Spartio Mus. Dom. Romani.

Distincta alis obliquis longioribus fuscis: vitta pallida,
postice praeterea striga albida.

Larua viridis aut flava: linea laterali alba.

Puppa brunnea.

154. P. seticornis alis anticis cinereis: fasciis tribus fuscis; *Berbera-*
posteriori nigro vndata. *ta.*

Phalaena berberata Wien. Verz. 113. 23.

Habitat in Austriae Berberis vulgari Dom. Schieffler
myller.

Media. Alae anticae cinereae fasciis duabus ante me-
dium fuscis. Pone medium tertia magis obsoletani-
gro vndata. Ala apice terminatur lineola nigra.
Posticæ cinereæ.

Larua scabra fusco rufo alboque variegata.

155. P. seticornis, aliis omnibus nigricantibus: fascia la- *albicilla-*
ta alba immaculata. *Sp. my. 105.* *ta.*

Wien. Verz. 114. 8.

Knoch. Beytr. I. 40. 1. tab. 2. fig. 8.

Habitat in Europæ Rubo Idaeo.

Larua viridis segmentis anticis posticisque linea late-
rali, intermediis lunula dorsali brunneis.

Puppa nuda, fusca.

156. P. seticornis alis omnibus albis immaculatis. *illibata.*

Phalaena illibata Wien. Verz. 116. 5.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffler myller.

Minor P. albicillatae. Alae omnes albae immaculatae.

157. P. seticornis, aliis omnibus nigris albo maculatis; fa- *hastata.*
sciis duabus albis nigro punctatis hastato dentatis.

Wien. Verz. 113. 25. *Sp. my. 106.*

158. P. seticornis aliis omnibus nigris albo subundatis: fa- *triflata.*
sciis duabus albis immaculatis. *Sp. my. 107.*

Wien. Verz. 113. 26.

159. P. seticornis, aliis omnibus flavescentibus: lineis ni- *clathrata*
gris decussatis. *Sp. my. 108.*

Schaeff. Icon. tab. 216. fig. 2. 3.

Wien. Verz. 107. 6.

160. P. seticornis aliis omnibus fusco cinereis: lineis stri- *diuersata*
gisque albis diuersatis.

Phalaena diuersata Wien. Verz. 107. 7.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura omnino P. clathratae. Differt tamen manifeste
alis omnibus concoloribus fusco cinereis lineis baseos
strigisque apicis albis.

grisata. 161. P. seticornis alis griseis: anticis striga fascia puncto-
que fuscis. *Sp. inf. 109.*

fusca. 162. P. seticornis alis rotundatis nigris: striga ferruginea,
~~Ex~~ anticis margine crassiori cinereo. *Sp. inf. 110.*

cinerea. 163. P. seticornis alis griseo cinereis immaculatis.

Phalaena griseata Wien. Verz. 116. 2.

Habitat in Austria Dom. Schieffermüller.

Alae omnes griseae immaculatae. Statura et magnitu-
do P. chaerophyllatae.

*chaero-
phyllata.* 164. P. seticornis atra, alis erectis: anticis apice albis.
Wien. Verz. 116. 1. *Sp. inf. III.*

procellata 165. P. seticornis alis anticis albis: fasciis tribus fuscis;
media dimidiata, postica marginali: macula alba.

Phalaena procellata Wien. Verz. 114. 1.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Magna. Alae anticae albae fasciis tribus altera baseos,
media dimidiata et tertia marginali fuscis. Costa fe-
re tota fusca. Striga vndata maculaque magna albae
in fascia marginali. Posticae albae marginē fusco.
Caput et thorax fusca. Abdomen albidum.

fluctuata. 166. P. seticornis alis cinerascentibus: anticis fasciis tribus
abbreviatis fuscis. Wien. Verz. 114. 1. *Sp. inf. 112.*

reticulata 167. P. seticornis alis anticis fuscis albo reticulatis.

Phalaena reticulata Wien. Verz. 114. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Magnitudo P. fluctuatae. Alae anticae fuscae strigis li-
neisque variis albis reticulatae. Posticae obscure ci-
nereae apice strigis albidis.

bilineata. 168. P. seticornis alis luteis testaceo vndatis; fascia repan-
da, margine fusco alboque. *Sp. inf. 113.*

Phalaena bilineata Wien. Verz. 110. 12.

Habitat in Lichnide dioica.

Larua virescens subimmaculata, interdum albo subli-
neata.

169. P. seticornis alis albis: anticis maculis duabus costalibus fuscis. Sp. 114. bimaculata.
Phalaena terminata Wien. Verz. 116. 6.
170. P. seticornis alis niueis: fasciis duabus ferrugineis; rubiginosa posteriori dimidiata: puncto subocellari atro. nata.
Phalaena rubiginata Wien. Verz. 114. 5.
Phalaena Alstroemeriana Sulz. Inf. tab. 23. fig. 5.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Fascia altera baseos, altera in medio. Margo posticus fuscus striga alba.
171. P. seticornis alis albidis: macula costali fusa; lunula atra. *Oblongata* Th. centauraea.
Phalaena centaureata Wien. Verz. 114. 7.
 Habitat in Centaureae Scabiosae floribus Dom. Schieffermüller.
Parua. Aliae anticae albae atomis aliquot fuscis. In medio costae macula magna fusca et in hac lunula atra. Posticae albae puncto medio nigro.
Larua viridis rubro maculata.
172. P. seticornis alis anticas albidis: fasciis duabus fuscis; adustata; posteriore repanda cinereo vndata. *on Renata* Th.
Phalaena adustata Wien. Verz. 114. 9.
 Habitat in Austriae Euonymo Europaeo Dom. Schieffermüller.
Media. Fascia altera baseos, altera sere marginalis.
Larua viridis: macula marginali alba rubro punctata.
173. P. seticornis alis omnibus viridibus: strigis duabus volutata. albis. Sp. 115. *volutata*.
174. P. seticornis, alis plumbeis: fascia lata fusca flauo fimbriata marginata. Sp. 116. *marginata*.
Phalaena deriuata Wien. Verz. 113. 24.
 Habitat in Germaniae Resa.
Larua viridis flauo annulata: macula collari oblonga ferruginea.
Puppa viridis antice ferruginea.
175. P. seticornis alis griseo fuscis: fascia lata nigra; puncto subocellari atro. Wien. Verz. 112. 6. Sp. 117. *quadrisciata*.
176. P. seticornis alis anticas cinereis: fasciis duabus ferrugineis; posteriore nigro marginata. *propugnata*.
Phalaena propugnata Wien. Verz. 112. 7.

Habi-

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo P. quadrifasciatae. Alae anticae cinereae fascia parua baseos ferruginea. In medio fascia latior, quae vtrinque nigro marginata. Posticae cinereae apice fusco vndatae.

fuluata.

177. P. seticornis alis anticis griseis: fascia media sinuata rufescente.

Habitat Svecia Dom. de Paykull.

Statura praecedentium. Alae anticae obscure griseae litura baseos fasciaque media rufescens. Posticae cinereae.

oceliata.

178. P. seticornis alis albidiis: fascia lata fusca: puncto subocellari atro. Sp. mag. 118.

Phalaena montana a Wien. Verz. 113. 14.

Habitat in Gallio sylvatico.

Fascia alac integra in medio pallidior puncto atro.

Larua fusca lineolis lateralibus albis.

lynceata.

179. P. seticornis alis rotundatis albis: fasciis duabus punctoque apicis fuscis. Sp. mag. 119.

ruficata.

180. P. seticornis alis albidiis: anticis fascia lata fusca, omnibusque puncto centrali nigro.

Phalaena ruficata Wien. Verz. 113. 15.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Affinis praecedentibus at triplo minor. Alae anticae albidae fascia media lata fusca et in hac punctum atrum. Posticae albidae puncto medio atro.

riuulata.

181. P. seticornis alis albidiis: fasciis duabus nigris posteriori terminali. Sp. mag. 120.

mellinata

182. P. seticornis alis flavo testaceis: fascia media obsoleta obscuriore.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae fere unicolores testaceae parum flavescentes. In medio fascia fere obsoleta marginibus obscurioribus. Posticae pallidiores.

ianata.

183. P. seticornis alis cinereis: posticis supra fuscis: fascia punctisque tribus albis. Sp. mag. 121.

bruniata.

184. P. seticornis alis flavescentibus; striga nigra postice pallidioribus, semina aptera nigro punctata.

Wien. Verz. 109. 9. Sp. mag. 122.

Larua viridis pallido sublineata.

185. P. seticornis alis anticis ferrugineo cinereoque fascia- linariata: tis: medio fascia lata apice maculis fuscis.

Phalaena linariata Wlén. Verz. 113. 10.

Habitat in Antirrhino Linaria Mus. Dom. Schieffermyller.

Minuta. Alae anticae basi cinereae fascia lata ferruginea, in medio fascia lata fusca puncto centrali atro, tunc fascia ferruginea cinereae iuncta et in hac maculae duae fuscae. Posticae fusco cinereoque variae.

Larua flava maculis dorsalibus pedibusque rubris.

186. P. seticornis, alis rotundatis viridibus: margine fer- exspe-
ga, rugineo. sp. vng. 123. data.

187. P. seticornis alis anticis testaceis: fasciis tribus griseis; puncto prominulo apicisque lineola supra fusca. cheno-
podiata? *Phalaena mensuraria* Wien. Verz. III. 2. sp. vng. 124.

188. P. seticornis alis ferrugineo fuscoque variis: fascia centummedia grisea C atro notata. sp. vng. 125. notata.

Phalaena russata Wien. Verz. 113. 15.

189. P. seticornis alis fusco griseoque variis: posticis al- hexapter-
bis basi duplicatis. var. ~~Zanata~~ Th. rata.

Phalaena hexapterata Wien. Verz. 109. 10.

Habitat in Fago sylvatica Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Alae anticae griseae fusco vndatae in primis basi apiceque, in medio parum dilutiores lunula fusca. Posticae albae ad basin ala notha, rotundata, alba, immaçulara. Subtus omnes cinereae puncto medio fusco.

190. P. seticornis alis griseis: fasciis duabus trilineatis duplicata fuscis. sp. vng. 126.

Phalaena plagiata seticornis, alis canis: fasciis tribus trilineatis nigricantibus repandis. Linn. Syst. Nat. 2. 869. 248. In Sv. 1271.

Phalaena plagiata Wien. Verz. III. 4.

Schaeff. Icon. tab. 12, fig. 1. 2.

Clerk. Icon. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Europae Hyperico.

Larua fusco ferrugineoque varia: linea laterali flave- scente.

191. P. seticornis alis fuscis postice strigis vndatis flavis. linuata:

sp. vng. 127.

192. P.

- alchemil-* 192. P. seticornis, alis fuscescentibus: anticis vndatis, fascia niuea cinereo vndata lineolaque intra apicem.
Wien. Verz. II2. 8. *sp. ing. 128.*
- pistacata* 193. P. seticornis alis anticis viridibus nigro vndatis: fasciis duabus cinereo ferrugineoque variis.
Phalaena pistacata Wien. Verz. II2. 8.
Habitat in Austriae Tilia Dom, Schieffermyller.
Statura omnino P. alchemillatae. Alae anticeae virides nigro vndatae. Ante medium fascia lata albo ferrugineoque varia et pone medium altera itidem albo ferrugineoque varia. Posticae fuscae, subtus cinereae puncto strigisque fuscis.
- luctuata* 194. P. seticornis alis anticis fusco virescentibus: fasciis duabus albis punctoque centrali nigro.
Habitat Halae Saxonum Dom, Hybner.
Statura praecedentium. Alae anticeae fusco virescentes fascijs ante medium sordide alba in medio punctum nigrum, in medio fascia altera alba vndata fusco trigofoa. Posticae cinereae puncto centrali strigisque fuscis.
- retian-* 195. P. seticornis, alis viridiibus fusco subfasciatiss.
gulata. Wien. Verz. II2. 9. *sp. ing. 129.*
Larua pallide viridis: linea dorsali obscure purpurea.
Habitat in Europae Pyro Malo.
- succentu-* 196. P. seticornis alis albidis: puncto nigro limboque ob-
riata. scuriore. Wien. Verz. II0. 24. *sp. ing. 130.*
- ferrugata* 197. P. seticornis alis purpurascensibus cinereo vndulatis postice macula didyma fusca Wien. Verz. II3. II.
Habitat in Alsine media. *sp. ing. 131.*
Larua grisea: linea laterali fusca.
Conf. *Phalaena spadicearia* Wien. Verz. II3. 12. vix differt.
- maculata* 198. P. seticornis alis flavis nigro maculatis. *sp. ing. 132.*
Wien. Verz. II5. 13.
- cribarta.* 199. P. seticornis alis flavis nigro punctatis: punctis ba-
~~seos~~ subocellatis. *sp. ing. 133.*
- auersata.* 200. P. seticornis alis pallidis: striga baseos fascia media punctoque fuscis. Linn. Syst. Nat. 2, 859. 251. In Sv. 12. 86. Clerk. phal. tab. 5. tig. 7. Wien. Verz. II7. 3.
Habi-

Habitat in Europa,

Fascia in medio omnis alae. Margo parum nigro punctatus,

201. P. seticornis alis omnibus cinereis; strigis nigris fasciaque postica fusca; striga moniliformis cinerea. *moniliata*

Phalaena moniliata Wien. Verz. 117. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae omnes cinereae strigis anticae quatuor posticae tribus nigris. Inter ultimas strigas fascia obsoleta obscurior striga moniliformi cinerea. Margo ipse nigro punctatus.

202. P. seticornis alis fusco cinereis immaculatis.

Phalaena euphorbiata Wien. Verz. 116. 9. *euphorbiata*.

Habitat in Austriae Euphorbia Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua alis immaculatis mox obscurioribus mox pallidioribus.

203. P. seticornis, alis griseis; fascia striga punctisque marginalibus fuscis. *laevigata*

Phalaena laevigata Wien. Verz. 117. 12.

Phalaena laevigata Scop. Ent. carn.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Minuta.

204. P. seticornis alis rotundatis niveis: anticis punto medio fusco margineque nigro punctato. *Sp. in. 134. 249.* *punctata*

Phalaena temerata Wien. Verz. 116. 7.

205. P. seticornis, alis canis: strigis nigris fasciisque undatis albidis subanastomosantibus. *venosata*

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae anticae canae striga baseos incurva atra, ante medium fascia angulata albido nigro undata, in medio striga atra, tunc fascia albida dentibus cum striga nigra cincta. Margo nigro striatus.

206. P. seticornis alis omnibus griseo undatis: punto centrali fusco margineque nigro punctato. *Sp. in. 135.* *mediata*

Phalaena strigilata Wien. Verz. 117. 4. *incanata* L.

207. P. seticornis alis flauissimis: fascia lata fusca retrorsum dentem exserente. *Cupridas Th.* *sociata*

Phalaena fuluata Wien. Verz. 112. 4. *Sp. in. 136.*

Fabr. Insect. T. II.

Q

J. 90

208. P.

- sagittata. 208. P. seticornis alis fuscescentibus: fasciis duabus atris albo marginatis; posteriori dentem exserente.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura et magnitudo P. sociatae. Alae anticae fuscae ferrugineo mixtae. Fascia baseos parua atra albō marginata et in medio atera maior itidem atro albo marginata, quae retrorsum dentem validum exserit. Posticae cinereae striga pallidiore.
- luteata. 209. P. seticornis alis pallide flauis ferrugineo fasciatis punctoque medio fuluo. *Havicata Th.*
Phalaena luteata Wien. Verz. 110. 18.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura P. rubricatae. Alae omnes pallide flauae fasciis plurimis vndatis ferrugineis. In medio alae anticae punctum fuluum.
- centrata. 210. P. seticornis alis flavescentibus fusco vndatis: anticis puncto centrali nigro. *Sp. inv. 137.*
Phalaena remutata Linn. Syst. Nat. 2. 872. 266.
Phalaena remutata Wien. Verz. 117. 5.
Habitat in Vicia sepium.
- cinerata. 211. P. seticornis alis cinereis: puncto centrali margineque postico vndato nigris. *Sp. inv. 138.*
Phalaena decorata Wien. Verz. 117. 13.
- ornata. 212. P. seticornis, alis niueis: puncto medio margineque postico vndato fuscis.
Phalaena ornata Wien. Verz. 117. 14.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Nimis P. cineratae affinis at alae magis niueae et margo posticus minus niger.
- purpurea. 213. P. seticornis alis virescentibus: anticis fasciis duabus purpureis. *Sp. inv. 139.*
Noctua aenea Wien. Verz. 85. 6.
Schaeft. Icon. tab. 205. fig. 4.5.
- rubricata 214. P. seticornis, alis purpurascentibus: strigis vndatis fuscis. *Brunneola Th.*
Phalaena rubricata Wien. Verz. 110. 19.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Parua. Alae omnes purpurascentes strigis quatuor fuscis, quarta pallidiore. Subtus concolores at striga balcos deest.

215. *P. seticornis* alis flavescentibus: strigis numerosis ob-
scerioribus. *Sinuata Th.* *ochreata.* ✓
Phalaena ochreata Wien. Verz. 110. 20.
 Habitat in *Festuca duriuscula* Austriae Dom. Schieffer-
myller.
Parua. Alae omnes flavescentes strigis vndatis obse-
rioribus. Subtus concolores at obscuriores.
216. *P. seticornis* alis fulvis: strigis vndatis fusco ferru-
gineis. *Sp. n. 140.* *corrigata*
217. *P. seticornis* alis omnibus fusco virescentibus: strigis *immorata* ✓
vndatis albis.
Phalaena immorata seticornis alis omnibus lutescenti-
bus: fasciis obsoletis albidis marginisque striga nigri-
cante. Linn. Syst. Nat. 2. §71. 265. In Sv. 1290.
Phalaena immorata Wien. Verz. 107. 8.
 Habitat in *Lonicera Caprifolio* Mus. Dom. Schieffer-
myller.
 Alae omnes fusco virentes strigis quatuor albis ultima
valde vndata.
Larua fusca linea dorsali rufescente, laterali coeru-
lescente.
218. *P. seticornis* alis albidis: fascia baseos lunula media *extre-*
maculaque postica nigris. *mata.*
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Minuta. Alae anticae albidae fascia baseos *Lata nigra*
albo vndata. In medio lunula nigra et versus apice
macula magna fusca.
219. *P. seticornis* alis cinereis: puncto medio fasciaque *scutata.*
postica punctorum ocellatorum fuscis.
Phalaena scutata Wien. Verz. 117. 12.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Parua. Alae omnes cinereat basi subimmaculatae in me-
dio puncto fuscum. Postice striga vndata fusca, cui
adhaerent puncta subocellata. Margo nigro punctatus.
220. *P. seticornis* alis omnibus niveis: strigis vndatis ob-
scerioribus; marginè postico nigro punctato. *immutata* ✓
Phalaena candidata Wien. Verz. 110. 23. *Sp. n. 141. 592*
221. *P. seticornis* alis albis obscurius vndatis: puncto me-
dio nigro, anticis costa ferruginea. *offeata.* ✓
Phalaena offeata Wien. Verz. 110. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Corpus cinereum thorace antice ferrugineo.
Alae omnes pallidæ apice strigis vndatis obscurioribus et in medio punctum nigrum. Costa alac anticæ ferruginea.

albulata. 222. P. feticornis alis anticis niueis: strigis vndatis obscurioribus.

Phalaena albulata Wien. Verz. 109. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Affinis P. immutatae sed distincta alis posticis anticis haud concoloribus sed albis immaculatis. Subtus anticae obscurae, posticae albæ puncto strigis obscurioribus.

nassata. 223. P. feticornis alis anticis fuscis: fascia media vndata niuea; striga fusca.

Phalaena nassata Wien. Verz. 109. 13.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae anticae fuscae, in medio fascia lata alba, et in hac striga parua fusca. Posticae cinereae, subtus albidae margine fusco.

pusillata. 224. P. feticornis alis fuscis cinereo subundatis: lunula media atra.

Phalaena pusillata Wien. Verz. 110. 26.

Habitat in Austriae Iunipero Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Alae anticae fuscae vndis numerosis cinereis. In medio lunula magna atra. Subtus omnes fuscae.

Larua viridis pallido lineata.

Puppa viridis.

nitata. 225. P. feticornis alis ferrugineo fuluis immaculatis.

Ex. Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Parua tenera tota ferrugineo fulua, immaculata.

variegata. 226. P. feticornis alis omnibus purpureis: maculis marginisque flavis. *Sp. inq. 142.*

Phalaena auroralis Wlen. Verz. 124. 39.

diaphanata. 227. P. feticornis alis hyalino albis nigro punctatis, apice strigis fuluis abbreviatis. *Sp. inq. 143.*

cingulata. 228. P. feticornis alis omnibus fuscis: striga niuea. *Sp. inq. 144.*

Phalaena cingulata Wien. Verz. 123. 31.

niueata. 229. P. feticornis, alis striatis niueis immaculatis. *Sp. inq. 145.*

Ex.

230. P.

230. P. seticornis, alis niueis: anticis costa ferruginea. *Sp. iug. 146.* *costata.*
 231. P. seticornis, alis concoloribus rufis: margine ni- *flavata.*
Ex. gro albo punctato. Sp. iug. 147.
232. P. seticornis cinea, capite thoracis alarumque mar. *capitata.*
Ex. gine basi ferrugineis. Sp. iug. 148.
233. P. seticornis cyaneo nigra albo maculata. *Sp. iug. 149.* *gestuata.*
Ex. 4.
234. P. seticornis alis apice flavis: anticis strigis duabus argen-
Ex. argenteis, posticis macula quadruplici nigra. Sp. iug. 150. *tata.*
235. P. seticornis alis atris albo maculatis, ano rufo. *melata.*
Ex. Sp. iug. 151.
236. P. seticornis alis flavis: maculis marginaque postico *sulphu-*
Ex. fusco ferrugineis. Sp. iug. 152. *rata.*
 Habitat Cajennae.
237. P. seticornis alis flavescentibus: margine exteriori *sinuata.*
Ex. posticoque purpureis sinuatis. Sp. iug. 153.
238. P. seticornis alis anticis fusco purpurascientibus: ma- *violata.*
Ex. cula magna flava, posticis flavescentibus.
 Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura omnino praecedentium. Alae anticae fuscae
 purpureo colore nitidulae in primis versus marginem
 posticum. Macula magna marginis tenuioris flava
 strigis tribus nigricantibus costaque flavescentes. Alae
 posticae flavescentes strigis duabus fuscis posteriore
 abbreviata. Subtus subconcolores at multo pallidiores.
 Caput et thorax fusca. Abdomen flavescentes
 ano nigro punctis tribus albis apice fulvo. Subtus
 niuea.

239. P. seticornis alis albis fusco fasciato maculatis, tho- *vrticata.* ✓
 raceanoque flanis. *Sp. iug. 154.*

Phalaena vrticalis Wien. Verz. 121. 12.

240. P. seticornis alis anticis fusco nitidis: fasciis albo *perspi-*
Ex. hyalinis abdomine argenteo: punctis duobus bascos cata.
 atris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura P. vrticatae. Corpus omnino argenteum pun-
 ctis duobus atris ad basin abdominis. Alae concolo-
 res. Anticae fusco nitidae basi fasciis tribus, medio
 fascia obliqua lineaque antice bisida marginis tenuio-
 ris apiceque fascia obliqua hyalinis. Posticae albo
 hyalinae fasciis tribus fuscis.

- funerata. 241. P. seticornis alis rotundatis atris: anticis maculis duabus, posticis vnicia hyalinis. *Sp. nig. 155.*
- securata. 242. P. seticornis alis fuscouscentibus: anticis basi cinereis; *Ex* macula marginis tenuioris atra.
Habitat in Coremandel Dom. Vahl.
Statura et magnitudo P. vrticatae. Caput et thorax flava. Abdomen cinereum. Alae anticae basi cinereae macula magna atra ad marginem tenuorem et postice punctum paruum. Lineolae duae fuluae in medio marginis crassioris, apice fuscae in margine postico dilatiori striga punctorum nigrorum. Subtus fuscae. Posticae fuscae, subtus cinereae.
- limbata. 243. P. seticornis alis rotundatis luteis: puncto ocellari margineque postico fuscis. *Sp. nig. 156.*
- metallata. 244. P. seticornis alis niueis: costa maculaque media *Ex* aurea. *Sp. nig. 157.*
- repanda. 245. P. seticornis alis cinerascentibus, anticis strigis tribus vndatis punctoque medio fuscis.
Phalaena repandalis Wien. Verz. 120. 2.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura praecedentium. Corpus cinereum abdome albido. Alae anticae cinerascentes striga parua ante medium, tunc punto in medio, deinde striga valde flexuosa et tandem striga incurua fuscis. Posticae albo hyalinae striga flexuosa fusca.
- verbasca. 246. P. seticornis alis flavescentibus: anticis strigis tribus punctoque medio fuscis.
Phalaena Verbasca Wien. Verz. 121. 5.
Habitat in Verbascum thapsus Dom. Schieffermyller.
Statura P. vrticatae at paulo minor. Alae omnes flavae, anticis strigis tribus punctoque medio fuscis. Margo fuscouscens ciliis argenteis.
- hyalinata. 247. P. seticornis alis hyalino albis margine nigro cinctis, *Ex* ano lutescente. *Sp. nig. 158.*
- potamo-
gata. 248. P. seticornis alis cinereis albo maculatis: anticis obsolete reticulatis. *Sp. nig. 159.*
- stratio-
lata. 249. P. seticornis alis pallide subfasciatis anticis punctis tribus nigris. *Sp. nig. 160.*
Phalaena stratiotalis Wien. Verz. 123. 23.

250. P. seticornis alis cinereis omnibus conformiter albo *nymphæa-*
maculato reticulatis. *sp. nij. 161.* *ta.*
Phalaena nymphæalis Wien. Verz. 121. 13.
251. P. seticornis alis niueis: posticis fascia terminali nigra; punctis quatuor albis. *sp. nij. 162.* *limmata.*
Wien. Verz. 123. 30.
252. P. seticornis alis fuscis: maculis hyalinis sparsis. *sambuca-*
Phalaena sambucalis Wien. 124. 14. *ta.*
Habitat in Austriae Sambuco Dom. Schieffermüller.
Statura praecedentium. Alae omnes fuscae maculis
hyalinis. Postice striga flexuosa macularis flavescentes.
253. P. seticornis alis niueis: strigis vndatis fuscis punctis- *candi-*
que duobus atris. *data.*
Phalaena niuealis Wien. Verz. 316. 46.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Caput niueum. Alae niueae. Punctum paruum baseos
atrum. Postice strigae tres vndatae fuscae, in qua-
rum anteriore punctum geminatum atrum. Posticae
albae strigis duabus fuscis.
254. P. seticornis alis anticis griseis hyalinis maculatis, perspectatae.
Ex. posticis hyalinis: margine flavo hyalino maculato. *flata.*
sp. nij. 163.
255. P. seticornis alis anticis obscuris: macula punctisque *vitrata.*
Ex duobus hyalinis, posticis hyalinis: margine fuso.
Habitat Tranquebariae.
- Statura omnino P. perspectatae. Alae anticae obscurae
sive sordide flavescentes in medio macula magna an-
ticeque punctis duobus hyalinis. Posticae hyalinae
strigis obsoletis margineque postico late fuscis.
256. P. seticornis alis flauissimis fuso punctatis subtus im- *elenata.*
maculatis. *sp. nij. 164.*
257. P. seticornis alis fulvis: anticis fascia, omnibus apice fuscis. *velotata.*
Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.
Parua. Caput et thorax fusca. Abdomen fuluum apice fuscum. Alae anticae fulvae costa exteriori fascia media margineque postico fuscis. Fascia cum mar-
gine fuso interne coit. Posticae fuscae margine po-
stico tantum fulvo. Subtus concolores.
258. P. seticornis alis flavescentibus: anticis strigis tribus, *reuidata.*
posticis duabus fuscis, subtus albidis immaculatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Statura et summa affinitas P. indicatae at paullo maior
et strigae minus vndatae et uti alae subtus immacu-
latae.

indicata. 259. P. seticornis alis flavis: anticis strigis tribus, posti-
cis duabus vndatis fuscis. Sp. iug. 165

derogata. 260. P. seticornis, alis albis: strigis plurimis fuscis. Sp. iug. 166

cinctata. 261. P. seticornis alis fusco flavoque variis: maculis hya-
linis sparsis. Sp. iug. 167.

fenestrata 262. P. seticornis alis albo hyalinis: strigis numerosis fla-
uescientibus. Sp. iug. 168.

*** *Alis forficatis.*

marginalis. 263. P. palpis recurvatis, alis atris: posticis margine luteo.

Phalaena marginalis Wien. Verz. 69. 13. 317. 48.

Habitat in Europa australiori Mus. Dom. Romani.

Huius generis videtur. Corpus totum atrum nitidum
solo margine alae posticae luteo.

farinalis. 264. P. palpis recurvatis alis politis lutescentibus: strigis
repandis albis basi apiceque glaucis. Sp. iug. 169.

Wien. Verz. 123. 33.

glaucinalis. 265. P. palpis recurvatis, alis glaucis: strigis duabus fu-
scis repandis. Sp. iug. 170.

Wien. Verz. 120. 10.

barbalis. 266. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, femori-
bus anticis barba porrecta. Sp. iug. 171.

Phalaena barbalis Wien. Verz. 120. 9.

Habitat in Trifolio pratensi.

ventilata. 267. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, tibiis an-
ticipi apice fasciculato pilosis.

Habitat in Carinthia Dom. Saldoner.

Affinis videtur P. barbalis. Pedes antici porrecti tibiis
apice fasciculo magno expanso pilorum erectorum
cinereorum. Antennae parum pectinatae. Alae griseae strigis tribus vndulatis fuscis. Posticae cinereae
striga vnicolor terminata.

bombycalis. 268. P. palpis antennis pectinatis breuioribus, alis cine-
reο rufis: strigis duabus albidis, posticis luteis: mar-
gine nigro.

Pha-

Phalaena bombycalis Wien. Verz. 120. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Affinis Bombycibus. Antennae valde pectinatae nigrae.

Corpus cinereum. Alae anticae cinereo rufescentes fascia obliqua pone medium albida. Costa albo punctata. Posticae flavescentes macula magna apicis nigra.

269. P. palpis porrectis longitudine antennarum pectinatarum, alis cinerascentibus: strigis tribus fuscis. *tentacularis*. ✓

Phalaena tentacularis Wien. Verz. 119. 2. Sp. iug. 179.

Habitat in Taraxaco.

270. P. palpis porrectis approximatis thorace longioribus, proboscis griseis: strigis ferrugineis. *proboscidalis*. ✓

Phalaena proboscidalis Wien. Verz. 119. 1.

271. P. palpis porrectis thorace longioribus, alis subgriseis punctis duobus muricatis lineaque apicis nigris. *rostralis*. ✓

Phalaena rostralis Wien. Verz. 119. 3. Sp. iug. 174.

272. P. palpis recurvatis, alis griseis: strigis tribus fusca; intermedia flexuosa. *memoralis*. ✓

Phalaena grisealis Wien. Verz. 120. II.

273. P. alis anticis fuscescens apice cinereis: punctis ocellaribus nigris. *crassalis*.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Maior. Alae anticae fuscae margine tenuiore albo maculato. Margo posticus in primis interne cinerascents punctis aliquot obsoletis ocellaribus fuscis. Posticae fuscae.

274. P. alis nigro coerulecentique variis, posticis nigris. *alpestralis*

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Abdomen atrium cingulis albis. Alae anticae nigro coerulecentibus variegatae. Posticae nigrae margine tenuiore pallescente. Subtus basi cinereae apice fuscae.

275. P. palpis porrectis thorace longioribus, alis griseis: posticis margine crassiori albo. *palpalis*. . .

posticis margine crassiori albo. Sp. iug. 176.

276. P. alis glabris pallidis: strigis obliquis ferrugineis. *fornicalis*. ✓

Phalaena fornicalis Wien. Verz. 122. 17. Sp. iug. 177.

277. P. alis glabris fusco cinereoque variegatis: posticis *sophialis*. cinereis margine postico fuscis.

Habitat in Austriae Sisymbrio sophia. Dom. Schieffernmyller.

Media. Alae anticae fusco cinereoque variegatae, posticæ cinereæ margine postico fusco et in hoc margine puncta aliquot alba.

- variegata.** 278. P. alis glabris fusco cinereoque variis: fascia postica fusca distincta.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Media. Alae anticae cinereo fuscoque variegatae indistinctæ. Apice fascia distincta fusca. Posticæ griseæ. Subtus anticae fuscae, posticæ albidae.

- motitalis.** 279. P. alis pallide cinereis: punctis duobus strigaque postica fuscis.

Habitat in Insula Rotterdam Mus. Dom. Banks.

Statura omnino P. forficalis à minor. Corpus totum cinereum. Alae anticae pallidæ, glabrae, nitidæ puncto paruo ante medium lunula sive puncto maiori in medio et striga postica vndata fuscis. Posticæ pallidæ striga tantum apicis fusca: Subtus omnes albidae.

- vndalis.** 280. P. alis obscure cinereis: strigis tribus obliquis vndatis niueis. Sp. vng. 178.

- sagittalis.** 281. P. palpis recurvis, alis cinereis: macula costali atra, posticis flavis: margine fusco. Sp. vng. 179.

- margari-** 282. P. alis glabris: anticis flavescentibus apice ferrugineo fuscis.

Phalaena margaritalis Wien. Verz. 123. 29.

Phalaena extimalis Scop. carn.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura et magnitudo P. verticalis. Alae anticae flavae atomis maculaque magna apicis fusco ferruginea. Posticæ albæ.

- sericealis.** 283. P. alis glabris flavis: macula media fusca.

Phalaena sericealis Wien. Verz. 122. 18.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernmyller.

Magnitudo et statura fere P. forficalis. Alae anticae ochræcææ macula magna media fusca et in hac puncta duo parua atra. Margo posticus albo punctatus. Posticæ pallidæ.

- trinalis.** 284. P. alis glabris flavis: maculis tribus disci margineque postico fuscis.

Pha-

Phalaena trinalis, Wien. Verz. 317. 47.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Alae anticae flavae margine postico fusco. In medio disci maculae tres fuscae 2. i. posteriori maiori transuerso. Posticae pallidiores margine fusco.

285. P. alis glabris pallidis subfasciatis subtus fusco vnda- *verticalis*: *v*
tis. Wien. Verz. 120. I. Sp. Aug. 180.

286. P. alis cinereis: anticis strigis tribus obliquis fuluis, *salicalis*.
antennis pubescentibus. Sp. Aug. 181.

287. P. alis anticis obscure cinereis: macula media alba. *alpinalis*.
Phalaena alpinalis Wien. Verz. 123. 24.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo praecedentium. Alae anticae ci-
nereae macula media niuea. Posticae fuscescentes
macula maiori niuea. Subtus anticae fuscae macula
media alba, posticae niueae margine postico fusco.

288. P. alis cinerascentibus: puncto medio niueo striga- *punctalis*.
que postica fusca.

Phalaena punctalis Wien. Verz. 123. 25.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Praecedente duplo fere minor. Alae anticae cinera-
scentes, obscurae puncto paruo medio albo et pone
hoc striga vndata obscurior. Posticae uti omnes sub-
tus cinereae.

289. P. alis fuscis; strigis duabus flavescentibus. *nitidalis*. *v*

Phalaena nitidalis Wien. Verz. 129. 36. *Glaucocrota*

Habitat in Austria Doin. Schieffermyller. *Lacini*.

Media. Corpus fuscum. Alae anticae fuscae, nitidi-
lae strigis duabus flavescentibus, quae ad marginem ex-
teriori crassiores. Costa inter strigas purpurascens
flavo punctatus. Posticae fuscae strigis duabus pal-
lidis. Subtus fuscae anticis macula marginali flava,
posticis striga incurua pallida.

290. P. palpis recurvatis, alis cinereis: linea dorsali fa- *dorsalis*.
sciaque postica fuscis. Sp. Aug. 183.

291. P. palpis recurvatis, alis fuscis nitidis: anticis pun- *fuscalis*.
cto subocellari niueo. Sp. Aug. 182.

- pingui-* 292. P. palpis recuruatis, alis cinereis: margine crassiori nigro subfasciato. *Sp. iug. 184.*
nalis. *Phalaena pinguinalis* Wien. Verz. 120. 13.
- ramalis.* 293. P. palpis subrecuruatis, alis oliuaceis: fascia postica dentata pallida.
Phalaena dentalis Wien. Verz. 120. 14.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Magna. Alae anticae oliuaceae, in medio fascia obliqua ad marginem exteriorem repanda dentes numerosos, acutos emittens pallida. Margo posticus fuscus striatus. Posticae pallidae margine parum flavescente. Subtus anticae fuscae, posticae pallidae.
- aenealis.* 294. P. alis fuscis nitidulis immaculatis, capite ferrugineo.
Phalaena aenealis Wien. Verz. 123. 26.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Media inter congeneres. Corpus fuscum capite ferrugineo. Alae anticae fuscae cupro nitidulae, immaculatae, posticae fuscae.
- palealis.* 295. P. alis anticis virecentibus immaculatis.
Phalaena palealis Wien. Verz. 123. 27.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Praecedentibus maior. Alae anticae virides, immaculatae, posticae exalbidae.
- ochrealis.* 296. P. alis flavescentibus immaculatis.
Phalaena ochrealis Wien. Verz. 123. 28.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Minor praecedente. Alae anticae ochraceae, posticae fuscae, immaculatae.
- ferrugalis* 297. P. alis flavis, strigis tribus vndatis ferrugineis. *Sp. iug. 185.*
secalis. 298. P. alis striatis griseo fuscis: macula veniformi Latino inscripta. *Sp. iug. 186.*
Phalaena secalis Wien. 78. 17.
Larua viridis: lineis tribus longitudinalibus fuscis, capite brunneo.
 An potius *Noctua*?
- niuealis.* 299. P. alis griseo fuscis: maculis duabus costalibus albis, corpore niueo. *Sp. iug. 187.*
- elatalis.* 300. P. alis anticis albis: costa interrupta fasciaque submarginali fuscis.

Phalaena elatalis Wien. Verz. 121. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus album. Alae anticae albae costa vsque ad medium fusca, in medio alba punctis duobus fuscis apice fusca. Versus marginem posticum fascia lata fusca. Margo ipse nigro punctatus. Posticae fuscae costa pallida apice fusco punctata, posticae albidae lunula media strigaque postica fuscis.

301. P. alis anticis albis: vitta rosea.

Phalaena pudoralis Wien. Verz. 124. 40.

pudoralis

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua at distincta. Alae anticae albae vitta rosea, quae tamen basin haud attingit. Posticae obscure cinereae,

303. P. alis anticis sulphureis: strigis duabus maculaque *flaualis*.
media veniformi fuscis.

Phalaena flaualis Wien. Verz. 121. 7.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax flava. Abdomen cinereum.
Alae anticae sulphureae striga antica obsoleta, flexuosa, fusca. In medio macula veniformis et pone hanc striga altera. Posticae pallidiores striga unica fusca. Subtus omnes cinereo fuscoque variae.

303. P. alis anticis cinereis: margine postico inaurato. *polygona-*
lis.

Phalaena polygonalis Wien. Verz. 121. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae cinereae costa anticarum vsque ad medium ob-
scurore. Margo posticus fusco aureus. Posticae
apice tantum inauratae.

304. P. alis flavis: fasciis duabus sanguineis; priore ex- *sanguina-*
ternis dilatata, perforata. *sp. v. 188.* *lis.*

Phalaena sanguinalis Wien. Verz. 124. 41.

305. P. alis griseis: striga marginali flava margineque ni- *sticticalis*.
gro ciliari. *sp. v. 189.*

306. P. palpis recurvatis, alis fuscis: fasciis duabus flavis. *fascialis*.

307. P. alis flavescentibus: strigis punto margineque po- *simbrialis*
stico fuscis.

Habitat in Insula Amsterdam Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium at parua. Corpus flavescent.

Alae anticae flavae basi fuscae, tunc striga parua pun-
cto distincto, tunc strigae duae repandae margoque
po-

posticus late fuscus. Posticae flauae puncto striga
margineque postico fuscis.

politalis. 308. P. alis fuscis: fascia media maculaque marginali
flauis.

Phalaena politalis Wien. Verz. 121. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae basi fuscae litura parua flaua, in
medio fascia lata flaua et in hac annuli duo con-
nati fuscii. Apice fuscae macula vna alteraque flaua.

angustalis ~~angustalis~~ 309. P. alis nigricantibus: fascia media anticarum abbre-
~~ius.~~ uiata maculaque costali transuersi albis.

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner,

Corpus nigrum abdominis segmentis margine albis.

frigalis. 310. P. alis griseis: strigis duabus flauis costaque purpu-
rascente. Sp. sig. 191.

recurualis 311. P. palpis recuruatis, alis fuscis, anticis fasciis duabus
~~ius.~~ albis; posteriore abbreviata. Sp. sig. 192.

punctalis. 312. P. alis ferrugineis: striga flaua, margine crassiori
albo punctato. Sp. sig. 193.

Phalaena angustalis Wien. Verz. 120. 7.

curtalis. 313. P. flauo cinerascentibus: striga postica ferruginea.
Phalaena curtalis Wien. Verz. 120. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus cinereum. Alae omnes flauo cinereae
striga fere obsoleta, ferruginea versus marginem
posticum.

cespitalis. 314. P. alis anticis obscuris variegatis: posticis nigris;
strigis duabus flauis.

Phalaena cespitalis Wien. Verz. 123. 32.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnitudo P. purpuralis. Alae anticae colore variant.

fluctualis. 315. P. alis fuscis: anticis puncto strigisque duabus re-
~~ius.~~ pandis albis.

Habitat in Insula Rotterdain. Mus. Dom. Banks.

Statura omnino praecedentium. Corpus fuscum. Alae
anticae fuscae basi pallidiores puncto paruo in me-
dio strigisque duabus vndatis anteriore interrupta
albis, posticae fuscae strigis duabus vndatis albis.
Subtus concolores at pallidiores.

316. P. alis purpurascens: omnibus fasciis duabus luteis. Wien. Verz. 124. 42. 194. *purpuralis.*
Schaeff. Icon. 209. fig. 5. 6. ?
317. P. alis fuscescentibus: macula costali fulua, posticis porphyralis: striga albida. *porphyralis.* ✓
P. porphyralis Wien. Verz. 317. 50.
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
Statura et summa affinitas P. purpuralis. Alae anticae basi obscure fuscae maculis duabus indistinctis obscurioribus, apice obscure purpurascentes. Macula magna costalis fulua colores hos distinguit. Posticae atrae striga alba. Subtus basi albidae striga nigra, apice fuscae strigis albidis.
318. P. alis purpureis: lineola baseos punctisque duobus punicalis. *medialis flavis.* ✓
Phalaena punicalis Wien. Verz. 317. 49.
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
Nunis affinis P. purpuralis. Alae anticae obscure purpureae, lineola baseos et in medio punctis duobus flavis.
319. P. alis flauissimis: striga fusca, apice obscure purpurascens: macula flava punctisque duobus marginalibus albis. *apicalis.*
Habitat Surinami Mus. Dr. Pfug.
Statura et magnitudo P. purpuralis. Caput et thorax flava antennis obscuris. Alae anticae basi flauissimae margine atro strigaque media fusca, apice obscure purpurascentes macula magna flava punctisque duobus marginis albis. Posticae flavae puncto medio apice fuscis.
320. P. alis fuscis: anticis maculis duabus fuluis. *4 punctalis.*
Phalaena 4 punctalis Wien. Verz. 124. 43.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura P. purpuralis. Alae omnes fuscae. Maculae duae fere oppositae fuluae in alis anticis, posticae immaculatae.
321. P. alis cinereo fuscis: strigis anticarum tribus, posticarum duabus vndatis argenteis. *argentalis.* ✓
Phalaena argentalis Wien. Verz. 122. 15.
— *Phalaena leonis.*
322. P.

costalis. 322. P. alis purpurascens: maculis duabus costalibus marginisque posteriori flauis. *Sp. inf. 196.*
Phalaena fimbrialis Wien. Verz. 124. 38.

atralis. 323. P. alis atris: maculis duabus niguis. *Sp. inf. 197.*
Phalaena guttalalis Wien. Verz. 124. 45.
 Schaeff. Icon. tab. 275. fig. 5. 6. at maior.
 Thorax linea laterali flava.

pollinalis. 324. P. alis puluerulentis atris: lineola baseos punctisque duobus albis.
Phalaena pollinalis Wien. Verz. 124. 44.
 Habitat in Austria Mus. Doin. Schieffermyller.
 Nimiris affinis *P. atrali* at alae magis magis puluerulenta, maculae magis approximatae et lineola baseos distincta. Thorax niger, immaculatus.

dentalis. 325. P. alis flavis: fascia purpurea. *Sp. inf. 198.*
~~et al.~~

155. PYRALIS. *Palpi* nudiusculi basi cylindrici, medio dilatato obtusi, apice subulati.

Antennae filiformes.

Bankiana 1. P. alis fuscis: fasciis duabus niguis; posteriore vnitata. *Sp. inf. 1.*

Tortrix olihana Wien. Verz. 120. 1.

Lecana. 2. P. alis pallidis: macula centrali fusca. *Sp. inf. 2.*

unundana. 3. P. alis denudatis albidis: strigis duabus punctoque medio obsolete fuscis. *Sp. inf. 3.*

prasinana 4. P. alis anticis viridibus: strigis duabus obliquis flauocantibus, posticis albis. *Sp. inf. 4.*

Phalaena quercana Wien. Verz. 125. 1.

fagana. 5. P. alis viridibus: strigis tribus obliquis albis, anten- nis pedibusque fulvis. *Sp. inf. 5.*

Phalaena fagana Wien. Verz. 125. 2.

viridana 6. P. alis rhombeis: anticis viridibus immaculatis! Wien. Verz. 125. 3. *Sp. inf. 6.*

storana. 7. P. alis rhombeis: anticis viridibus: margine albo. Wien. Verz. 125. 4. *Sp. inf. 7.*

8. P. alis rhombeis pallide virescentibus, posticis albis: *vernana*. ✓

margine virescente.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Nimis affinis P. viridanae, differt tamen corpore albo, alarum colore teneriori, posticis albis margine tam tum virescente.

9. P. alis rhombeis virescentibus: lineola alba, posticis *Vahliana* atris: macula media margineque albis.

Habitat in Holsatia.

Statura fere Bombycis. Antennae crassae, nigrae. Corpus nigrum. Alae anticae virescentes lineola a basi ultra medium ducta alba. Posticae atrae margine antico et postico maculaque media albis. Subtus omnes atrae margine omni maculaque media albis.

10. P. alis fusca: margine exteriori albido: medio ramum recurvum album exserente. *Sp. vng. 8.*

Phalaena unca Wien. Verz. 129. 1.

11. P. alis plumbatis: lineolis tribus maculaque magna apicis ferrugineis. *Sp. vng. 9.*

12. P. alis griseis: atomis rufescens.

Phalaena sponsana Wien. Verz. 129. 1.

Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae griseae atomis plurimis vix conspicuis rufescens, quae fere strigas obliquas formant.

13. P. alis fusca: strigis cinereis sesquitertiis. *Sp. vng. 10.*

Hattorfia ta.

14. P. alis ferrugineis fusco irroratis.

Phalaena Hermanniana Wien. Verz. 315. 30.

Hermanniana.

Habitat in Austriae Rubo fruticoso Dom. Schieffermyller.

Maior P. rosanae. Alae anticae ferrugineae atomis maculisque rugosissimis fusca. Posticae fuscae.

15. P. alis anticis griseo fuscoque vndatis: puncto medio *inundata* niueo.

Phalaena inundata Wien. Verz. 132. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Corpus fuscum. Alae anticae fusco griseoque tenuissime variegatae et in medio puncto niueo distincto. Posticae fuscae.

- rosana.* 16. P. alis anticis testaceis: fascia obliqua grisea.
Wien. Verz. 128. 10. Sp. ing. 11.
- Burman-* 17. P. alis pallidis: anticis maculis quatuor costalibus
niana. ~~18.~~ atris.
Phalaena Burmanniana Cram. pap. 31. tab. 372. fig. H.
Habitat Surinami.
Magna. Caput ferrugineum. Alae omnes pallidae mar-
gine postico atro.. Maculae quatuor atrae costae
connexae.
- Pasqua-* 18. P. P. alis ferrugineis immaculatis.
gana. *Phalaena Pasquagana* Wien. Verz. 318. 21.
Habitat in Crataego terminali Dom. Schieffermüller.
Statura magna P. rosanae. Caput et thorax ferruginea.
Alae anticae ferrugineae, immaculatae. Posticae ci-
nereae.
- pallidana* 19. P. alis palea flavis: strigis duabus obliquis ferru-
gineis. Sp. ing. 12.
- Smeath-* 20. P. alis exalbidis: fasciis duabus obliquis fuscis; ante-
manniana riore abbreviata, postiore interrupta. Sp. ing. 13.
- ceretana.* 21. P. alis albis: fasciis tribus fuscis; tertia abbreviata.
Phalaena ceretana Wien. Verz. 129. 3.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Magna. Corpus fuscum. Alae anticae albae fascia ba-
seos fusca, secunda in medio obliqua, tertia ad mar-
ginem crassiorem abbreviata. Posticae obscurae.
- decussana* 22. P. alis cinereo nigro argenteoque tenuissime fasciatis:
apice macula subocellari cinerea. Sp. ing. 14.
- ameriana* 23. P. alis anticis testaceis: litura communis ferruginea.
Wien. Verz. 123. II. Sp. ing. 15.
- maculana* 24. P. alis anticis fuscis: maculis quatuor dorsalibus atro-
ferrugineis. Sp. ing. 16.
- fuscanus.* 25. P. alis anticis fuscis immaculatis. Sp. ing. 17.
Phalaena ferrugana Wien. Verz. 128. I.
- Hart-* 26. P. alis anticis griseis: lineola media atra albae adna-
manniana tb. Linn. Syst. Nat. 2. 878. 396. In Sv. 1322.
Tortrix Linneana Wien. Verz. 131. 31.
Habitat in Europa Mus. Dom. Schieffermüller.
Media distincta lineola in medio disco atra, cui interne
adiacet lineola alba; externe macula fusca.

27. P. alis anticis obscure cinereis: maculis duabus marginalibus fuscis. *Ph. nig. 10.* *Forsterana.*
28. P. alis anticis aureis: fasciis duabus obliquis fuscis. *Phalaena Pilleriana* Wien. Verz. 126. 2. *Pilleriana.*
Habitat in Stachys Germaniae Dom. Schieffermüller.
Magna. Alae anticae aureae fasciis duabus fuscis. Posticeae fuscæ.
Variat alis fere totis aureis absque fasciis.
Piller Jesuita olim Professor Theresiani, nunc Praepositus in Hungaria.
29. P. alis pallide testaceis: maculis duabus costalibus *costana.* fuscis.
Phalaena costana Wien. Verz. 127. 5.
Habitat Hafniae Dom. de Scheftedt.
Statura et magnitudo omnino P. Forsteranae at alae magis planæ. Caput et thorax pallide testacea immaculata. Alae anticae pallide testaceæ margine exteriori maculis duabus costalibus punctoque indistinctis nigris.
30. P. alis anticis testaceis: fascia obliqua fusca. *Xylosteana.*
Wien. Verz. 128. 4. *Ph. nig. 19.*
Habitat in Lonicera Xylosteo.
31. P. alis anticis testaceis; margine postico rufo, medio ministrilitera ferruginea: lineola alba. *Ph. nig. 20.* *ministrina.*
Wien. Verz. 128. 5.
32. P. alis anticis fuscescentibus: macula centrali fulua ferrubasi flavis. *Ph. nig. 21.* *ferruginea.*
33. P. alis anticis fusco testaceis: macula media ferruginea. *Phalaena laevigana* Wien. Verz. 129. 12. *laevigata.*
Habitat in Austriae Carpino Dom. Schieffermüller.
Media. Alae anticae obscure testaceæ strigis vix conspicuis maculaque magna media ferruginea. Posticeae fuscae macula apicis ferruginea.
34. P. alis fuscis: arcu communi dorsali anguloque ani niueis. *Pflugiana.*
Habitat Hafniae Dr. Pflug.
Statura et magnitudo P. Vdriannianae. Caput et thorax fusca. Alae fuscae arcu at magno interne crassiori, communi anguloque ani niueis. Postica ad marginem

nem crassiorem strigae aliquot obliquae abbreviatae fere obsoletae; argenteae. Posticae nigricantes Subtus cinerea.

Vdmanniana. 35. P. alis cinereis: macula brunnea communis transversa. Wien. Verz. 130. 8. Sp. iug. 22.

Habitat in Rubo Idaeo.

variega- na. 36. P. alis albis: macula communis dorsali marginaque postico fusca.

Phalaena variegana Wien. Verz. 130. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Média. Caput et thorax alba abdomine flavescente. Alae anticae macula communis in medio dorsi fusca atomis nigris. Margo posticus fusca maculis obscurioribus.

Solan- drana. 37. P. alis pallidis albo subfasciatis: macula communis dorsali ferruginea. Sp. iug. 23.

trapeza- 38. P. alis testaceis: macula communis dorsali cinerea; strigis testaceis.

Habitat Hafniae Dr. Pflug.

Statura praecedentium. Caput cinerascens. Thorax testaceus. Alae testaceae fere unicolores macula magna dorsali cinerea et in hac strigae abbreviatae testaceae. Subtus cinerea.

Eufana- ocellana. 39. P. alis pallidis: fascia baseos maculaque communis dorsali lituraque apicis fusca. Wien. Verz. 330. 7.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Parua. Corpus fuscum. Alae anticae pallide cinereae fascia lata baseos, macula communis versus posteriora lituraque in medio marginis postici fusca. Costa punctis fusca. Alae posticae fuscae.

Strocmia- na. 40. P. alis fusca: maculis duabus dorsalibus cinereis. Sp. iug. 24.

Zoiga- na. 41. P. alis flavis: puncto medio lituraque postica ferruginea. Wien. Verz. 127. 4. Sp. iug. 25.

Schaeff. Icon. tab. 250. fig. 1. 2.

cruciana. 42. P. alis exalbido cinereis: postice macula arcuata ferruginea. Sp. iug. 26.

Phalaena humana Wien. Verz. 122. 3.

43. P. alis flavescentibus: puncto unico ferrugineo. *Kaekri-*
Linn. Syst. Nat. 2. 876. 29t. Wien. Verz. 127. 1. *tziana,*

Habitat in Europae nemoribus.

Magna alis anticae pallide flavis puncto minuto medio
ferrugineo. Posticae fuscae.

44. P. alis fuscis griseis nitidis immaculatis: posticis fu- *Viburnia-*
scis; margine albicante. *na.*

Phalaena viburnana Wien. Verz. 128. 15.

Habitat in Viburno Lantana Dom. Schieffermyller.

Magna statura praecedentium. Caput et thorax fusca.
Alae fuscis griseis, nitidulae, immaculatae, posticae
nigricantes: margine albicante.

45. P. alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo. *cinerana.*

46. P. alis cinereis: fasciis obliquis fuluis albo margi- *obliquana*
natis. *na.*

47. P. alis anticis fuscescentibus: margine exteriori ba- *laetana.*
seos nigro pustulato. *na.*

48. P. alis cinereo fuscoque variegatis: macula communi *profun-*
dorsali alba. *dana.*

Phalaena profundana Wien. Verz. 132. 1.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Affinis P. Brynichanae at alae anticae supra
cinereo fuscoque variegatae. Costa nigro punctata.
Posticae fuscae.

49. P. alis fuscis: macula communi dorsali rhombata alba. *Bruni-*
chana. Wien. Verz. 132. 2.

50. P. alis anticis aureis: macula dorsali communi pun- *Iaqui-*
ctisque costalibus albis. *niana.*

Phalaena Iaquiniana Wien. Verz. 132. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae aurae macula magna communi
albida. Costa albo punctata.

51. P. alis anticis nigricantibus: macula communi dorsali *Traunia-*
flava. *na.*

Phalaena Trauniana Wien. Verz. 132. 3.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae nigricantes in medio macula ma-
gna communi flava, postice striga fore obsoleta aurea
et in hac puncta quatuor costalia flava.

Woebera- 52. P. alis fusco aureoque variis: costa strigis argenteis na.

Phalaena Woeberana Wien. Verz. 126. 9.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura omnino P. arcuanae. Alae anticae strigis fuscais aureisque indistinctis contortuplicatis, apice macula obsoleta fusca lineolis aureis. Costa strigis numerosis argenteis, nitidis. Posticæ fuscae margine interiori baseos albido.

Baro de Woeber Iesuita olim Professor Theresianus, nunc Pastor Viennensis.

arcuana. 53. P. alis luteis: fasciis tribus arcuatis maculaque discitra: punctis tribus argenteis. Wien. Verz. 126. II. Sp. inf. 36.

Lecheana 54. P. alis anticis testaceis characteribus J. L. thoraceque argenteis. Wien. Verz. 126. 3. Sp. inf. 32.

Christier- 55. P. alis anticis flauissimis: venis sanguineis reticulatis. nana. Wien. Verz. 128. 9. Sp. inf. 93.

Buoliana. 56. P. alis anticis fuluis: strigis albis subreticulatis.

Phalaena Buoliana Wien. Verz. 128. 16.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Alae anticae fuluae strigis plurimis albidis basi in primis fere reticulatis, ultima distincta. Posticæ fuscae.

Baro Buol Viennensis.

auellana. 57. P. alis anticis testaceis: fasciis fuscais sesquitertiis. Wien. Verz. 127. 8. Sp. inf. 34

fascianæ. 58. P. alis anticis obscure cinereis: fascia media lituraque apicis fusca. Sp. inf. 37.

Phalaena Heperana Wien. Verz. 128. 3.

Hastiana. 59. P. alis anticis fuscais: striga antrosum obliqua alba. Wien. Verz. 20. 4. Sp. inf. 36.

decimana 60. P. alis anticis fuluis argento strigosis: fascia punctis que tribus flauis.

Phalaena decimana Wien. Verz. App. 300,

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Maior. Caput et thorax fulua. Alae anticae fuluae strigis quinque argenteis secunda interrupta. Fascia lata flaua ad basin. Maculae duae oppositae flauae in medio et quarta magna transuersa ante apicem. Posticæ nigrae.

51. P. alis anticis flavis: fasciis duabus ferrugineis argenteis marginatis subanastomosantibus: posteriore niana. Bauman. ✓
 interrupta. Wien. Verz. 126. 6.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
 Statura praecedentium. Caput et thorax ferruginea.
 Alae anticae flavae fasciis duabus in medio fere anastomosantibus ferrugineis argento vtrinque marginatis. Posticae fuscae.
Baumann senator Lipsiensis.
52. P. alis flavis: strigis argenteis; punctis fuluis. Heiseana.
 Tinea alulla alis flavis: maculis ferrugineis striga argentea cingitis. Sp. Inf. App.
Phalaena tiserana Wien. Verz. 126. 7.
 Habitat in Saxoniae nemoribus Dr. Heise.
 Corpus medium totum cinereum capite solo fuluo. Alae anticae flavae strigis quatuor obliquis argenteis ad margines coeuntibus et vtrinque punctis duobus fuluis inter strigas coeuntibus. Posticae ut omnes subtus cinereae.
53. P. alis anticis ferrugineo fuscoque variis, posticis Variana:
 fuscis apice fuluis.
 Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
 Media. Alae anticae fusco ferrugineoque variae, posticae fuscae apice fuluae. Subtus omnes fuscae apice fuluae.
54. P. alis fuscis: fasciis duabus rubro argenteis, posteriore puncto intruso. Wien. Verz. 127. 13. 37. ✓
Lediana.
55. P. alis canis: macula marginali ferruginea. Schallerriana.
Phalaena canis Wien. Verz. 129. 8.
56. P. alis griseo rufescens: macula marginali fusca puncto medio albo. *rufana.*
Phalaena rufana Wien. Verz. 129. 8.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
 Magna in hoc genere. Caput et thorax fusca. Alae anticae griseo rufescentes macula magna oblonga marginali fusca. In medio alae punctum album, quod maculum fuscum attingit. Posticae cinereae.
57. P. alis cinereis: maculis duabus marginalibus testaceis: baseos minore. Roboriana.
 Habi-

Habitat in Hafniae Quercu Dom. de Sehestedt.

Maiuscula. Caput cinereum antennis nigricantibus.

Thorax cinereus maculis tribus magnis ferrugineo testaceis. Alae anticae obscure cinereae maculis duabus altera baseos minore, altera media, triangulari testaceis. Alae subtus dilutiores.

Modestiana. 68. P. alis anticis flavescentibus: macula marginali posteriorius fusca. Sp. m. 39.

Schreberiana. 69. P. alis anticeis griseis: macula marginali trigona alba. Sp. m. 40.

Holmia-na. 70. P. alis anticis luteo ferrugineis: macula marginali trigona alba. Wien. Verz. 127. 16. Sp. m. 41.

Saldona. 71. P. alis anticis virescentibus: vitta abbreviata flava, posticis atris: macula baseos albida.

Vahlianavar. Habitat in Austria Dom. Saldoner.

S.S.S. 10. Media. Corpus fuscum abdomine apice cinereo. Alae anticae virescentes vitta a basi vitta medium flavescente. Posticae atrae macula magna margineque albis. Subtus omnes atrae macula margineque omni albis.

Rolandriana. 72. P. alis anticis pallide testaceis: strigis obliquis ferrugineis: posticis duabus coeuntibus.

Phalaena Rolandriana Linn. Syst. Nat. 2. 873. 309. In Sv. 1325. Wien. Verz. 128. 13.

Habitat in Verastro albo.

Inter strigas vittas ad marginem teruiorem coeuntibus macula ferruginea costae.

gnomana 73. P. alis anticis flavis: fascia obliqua testacea maculaque postica marginali ferruginea. Sp. m. 42.

Phalaena gnomana Wien. Verz. 127. 7.

oporana. 74. alis anticis ferrugineis fusco maculatis reticulatisque. Wien. Verz. 128. 2. Sp. m. 43.

Gerningana. 75. P. alis rufescensibus: fasciis duabus obliquis fuscis; posteriore terminali.

Phalaena Gerningana Wien. Verz. 318. 23.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Nimis affinis P. oporanae. Antennae pectinatae. Alae anticae rufescentes fasciis duabus latis fuscis, anteriore in medio, posteriore marginali.

76. P. alis anticis fuscis cinereis: punctis fuscis; centrali *ilicana*.
solitario atro. *Ap. iug. 44.*
77. P. alis anticis griseis: strigis duabus mediis cinereis *riuagana*
punctoque fuluo.
Phalaena riuagana Wien. Verz. 130. 17.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Magna. Alae griseae, ~~tex.~~ obscuriores mox punctis
aliquot fuscis adspersae, in medio strigae duae vndatae
cinereae et inter has punctum paruum fuluum.
Posticae fuscæ.
78. P. alis anticis niueis: maculis atomisque nigris spar- *confusa-*
fis. Wien. Verz. 130. 14. *fana.*
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Magna. Alae anticae niueae maculis paruis atomisque
innumeris nigris. Posticae cinereæ. Corpus ni-
ueum.
79. P. alis anticis cinereis: atomis numerosissimis fuscis. *strigula-*
Wien. Verz. 130. 15. *na.*
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Statura et magnitudo omnino praecedentis, at corpus
fuscum et alae cinereæ atomis fuscis.
80. P. alis anticis cinereis: linea flexuosa atra disci. Wien. *Steinkel-*
Verz. 130. 16. *nerana.*
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
Magna. Alae anticae cinereæ, in medio disci linea
magna flexuosa atra. *Steinkelner*, Jesuita olim Professor Theresianus.
81. P. alis anticis canis: atomis nigris sparsis posticis *Logiana.*
exalbidis. Wien. Verz. 130. 4. *Ap. iug. 45.*
82. P. alis anticis niueis subtus fuscis. *Ap. iug. 46.* *Gouana.*
83. P. alis anticis argenteis: strigis duabus obliquis eleua. *niueana.*
margine postico nigro punctato.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
Magna. Corpus album. Alae anticae argenteæ strigis
duabus obliquis e squamis eleuatis. Margo alac po-
sticus striga punctorum nigrorum. Posticae supra
fuscæ.
84. P. alis anticis fuscis: margine interiori albo punto- *cristana.*
que medio fasciulato eleuato.
Phalaena cristana Wien. Verz. 129. 10.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae anticae fulcae marginē tenuiori late albo: In medio punctum album e fasciculo pilorum eleuatorum fuscorum. Posticae cinereae. Caput et thorax albida.

Tunber- 85. P. alis anticis cinereis: punctis quatuor eleuato fasciculatis atris. *Sp. imp. 47.*

Tinea Lobella Wien. Verz. 138. 9.

punctula- 86. P. alis anticis scabris fuscis: vitta media interrupta obscure cinerea.

Phalaena punctulana Wien. Verz. 130. 13.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax fusca. Alae anticae punctis numerosis eleuatis, sparsis, nigris, fuscescentes vitta lata obscure cinerea in medio interrupta. Posticae obscurae.

asperana. 87. P. alis anticis basi albis apice fuscis scabris. *Sp. imp. 48.*

eleuana. 88. P. alis anticis cinereis scabris: macula baseos fusca.

Phalaena scabra Wien. Verz. 130. 12.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax cinerea. Alae anticae cinereae punctis eleuatis sparsis scabrae. Macula magna baseos fusca. Posticae albidae immaculatae.

duplana. 89. P. alis anticis pallidis: punctis duobus approximatis baseos nigris. *Sp. imp. 49.*

squamana 90. P. alis virescentibus scabris. *Sp. imp. 50.*

Phalaena scabra Wien. Verz. 130. 9.

Romana- 91. P. alis virescentibus albo scabris: lunula media atra.

Habitat in Germania australiori Dom. Romanus.

Affinis praecedenti. Alae anticae virescentes punctis plurimis eleuatis albis. In medio lunula magna atra. Alae posticae fusco cinereae. Abdomen cinereum linea laterali fusca.

borana. 92. P. alis cinereo fuscoque variis: punctis eleuatis nigris sparsis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Magna. Caput cinereum. Thorax fuscus Iubo antico cinereo. Alae anticae basi cinereae striga e punctis fasciculatis eleuatis nigris, apice fuscae macula magna

gna ad angulum ani liturisque costalibus cinereis.
Puncta plurima parua sparsa eleuata atra. Subtus
albidae.

93. P. alis rhombeis: anticis viridibus; characteribus *literana*.
atris. Sp. inf. 51.
94. P. alis subcaudatis flavis fusco reticulatis fasciaque la- emar-
ta fusca: margine crassiori late emarginato. Sp. inf. 52. *gana*.
95. P. alis subcaudatis griseis: margine interiori fulvo *caudana*: exteriori emarginato. Sp. inf. 53.
96. P. alis anticis cinereis fusco subfasciatis scabris: an *scabrana*: margine exteriori postice exciso. Sp. inf. 54.
97. P. alis anticis flavis: maculis duabus costalibus sul- *quercana*: phureis. Sp. inf. 55.
98. P. alis flavescentibus fulvo adspersis: fascia lata fusca *Grotiana* extrorsum bifida. Sp. Inf. App. 508.
99. P. alis albidis: macula triangulari communi baseos *Paykul-*
atra. *liana*.
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
- Media. Corpus album. Alae anticae albidae macula magna baseos triangulari communi atra. Margo posticus fuscescit.
100. P. alis cinereis litura media sanguinea: puncto' albido. *ocellana*.
m. inf. 56.
101. P. alis anticis luteis ferrugineo reticulatis: medio *Forskah-*
litura fuscescens. Wien. Verz. 127. 6. Sp. inf. 57. *liana*.
102. P. alis anticis flavis luteo reticulatis duplii xx no- *Loeflin-*
tatis. Sp. inf. 58. *giana*.
103. P. alis anticis luteis flavo punctatis: fasciis quatuor *Berg-*
argenteis; tertia bifida. Sp. inf. 59. *mannia*:
Phalaena Bergmanniana Wien. Verz. 120. 5.
104. P. alis anticis luteis apice aureis.
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
Parua. Corpus fusum, immaculatum. Alae anticae fuscae apice fulvae siue aureae; nitidae. Posticae vii omnes subtus fuscae, immaculatae.
105. P. alis anticis griseis: macula punctisque duobus cen- *Teatiana*
tralibus nigris. Sp. inf. 60.

- Schumacherana.* 106. P. alis anticis nigris: fascia media atomisque posticis albis.
Habitat in Hafniae nemoribus Dom. de Sehestedt.
- Statura omnino P. Fabricianae at paullo maior. Caput et thorax nigra. Alae anticae nigrae fascia media parua sinuata atomisque plurimis posticis albis. Subtus fuscae punctis quatuor costalibus albis.
- Penkleriana.* 107. P. alis anticis cinereo fuscoque reticulatis: macula apicis fuscis grisea; strigis duabus argenteis.
Habitat in Austria Mus. Dqtn. Schieffermüller.
Media. Corpus cinereum. Alae anticae fusco cinereoque, subtilissime reticulatae. In medio macula obscura annulis duobus fuscis. In apice macula magna grisea fusca strigis duabus argenteis, quae tamen marginem exteriorem variegatum haud attingunt.
Penkler Baro Viennensis in Theresiano studia et entomologium colens.
- Altroemiana.* 108. P. alis albidis: anticis macula media laterali fusco ferruginea. *Sp. mag. 61.*
Tinea monilella Wien. Verz. 138. II.
- Fabriciana.* 109. P. alis anticis nigricantibus: anticis pari punctorum albidorum. *Sp. mag. 62.*
Phalaena urticana Wien. Verz. 132. 7.
- pariana.* 110. P. alis fuscis strigis duabus atris margineque brunneo.
Phalaena pariana alis brunneis fascia glauca strigaque antica politicaque atris. Linn. Nat. 2. 880. 323. In Sv. 1341. Clerk. Icon. tab. 10. fig. 9.
Phalaena puriana Wien. Verz. 132. 8.
Habitat in Europe hortis.
Magnitudo et statura omnino P. Fabricianae at puncta alba defunt, vix unum alterumue ad costam.
- Conwagana.* 111. P. alis ferrugineo fuscis argento punctatis maculaque dorsali flauicanthe. *Sp. mag. 63.*
Phalaena montana Wien. Verz. 127. 14.
- Bierkan-drana.* 112. P. alis fusco aureoque variis: strigis cinereis basi argento lineatis apice punctatis.
Tinea Bierkandrella alis fuscis nigro undulatis: punctis sparsis argenteis. Thunb. Ins. Svec. 24. tab.
Habitat in Inuia Saletina Sveciae Dom. de Paykull.

Statura et summa affinitas P. Conwaganae. Antennae albo nigroque annulatae. Thorax aureus linea laterali argentea. Alae basi aureae lineolis duabus argenteis, tunc striga cinerea interne bitida, denique fusco cinereo fuluoque variae punctis argenteis numerosis. Caput et pedes alba punctis fusco argenteis. Abdomen fuscum.

Larua viridis lateribus flauescentibus rete fabricat et metamorphosin saliens sub terra se condit.

113. P. alis atris: macula magna communis strigis atomisque coerulescenti argenteis. Sp. iij. 64. Schlechte-diana.
114. P. alis fuluis apice nigris fuluo maculatis. Sp. ii. 65. Koeniga-na.
115. P. alis fuscis: maculis duabus aureis. Sp. iij. 66. aurana.
116. P. alis nebulosis postice macula rubra aurea. Sp. ii. 67. pomana. Wien. Verz. 126. 10.
117. P. alis testaceis: fasciis punctisque argenteis: medio litura atra. Sp. iij. 68. Schulzia-na.
118. P. alis griseo fuscis: puncto medio albo: pupilla Lipsiana. atra.
- Phalaena Lipsiana* Wien. Verz. 129. 9.
Habitat Lipsiae Mus. Dom. Schieffermüller.
Media. Alae anticae griseo fuscae atomis paucis nigris. In medio alae punctum orbiculatum album pupilla atra. Posticae cinereae.
119. P. alis fuscis: fasciis tribus cinereis; secunda introrsum bifida. Sp. iij. 69. riuellana.
- Phalaena undulana* Wien. Verz. 131. 22.
120. P. alis fusco alboque variis: margine exteriori albo abietana. punctata.
Habitat in Sueciae Abiete Dom. de Paykul.
Media. Caput et thorax fusca. Alae anticae fusco alboque variegatae costa sola punctis distinctis albis.
121. P. alis fuscis: fasciis tribus cinereis; secunda extorsum bifida. vndana.
- Phalaena riuulata* Wien. Verz. 131. 21.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Affinis P. riuellanae at duplo minor et fascia secunda extrorsum bifida.

vnguica. 122. P. alis cinereis subfasciatis apice acuminato recurvatis: margine exteriore postico transuerso albo striatis. *Sp. n. sp. 70.*

Scopolia- 123. P. alis fuscis: arcubus duobus dorsalibus albis. *Phalaena Scopoliana* Wien. Verz. 129. II.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magnia. Caput et thorax fusca. Alae anticae ferrugineae fuscae. In medio arcus magnus dorsalibus albus, et versus apicem alias magis cinereus minusque arcuatius. Liturae aliquot paruae albidae ad costam.

dorsana. 124. P. alis fuscis: arcu dorsali albo apiceque strigis argenteis. *Sp. n. sp. 71.*

Phalaena lunulana Wien. Verz. 127. 14.

strigana. 125. P. alis flavescentibus apice strigis ferrugineis argenteisque: puncto triplici atro. *Sp. n. sp. 72.*

Phalaena politana Wien. Verz. 129. 16.

Phalaena Hohenwartiana Wien. Verz. 129. 15.

Habitat in Hyperico quadrangulo Dom. de Paykull.

Variat alis fuscis et flavescentibus semper tamen strigis punctisque apicis.

Lundana. 126. P. alis basi fuscis: linea semicirculari pallida apice auratis: margine crassiori argenteo flavoque strigato.

Phalaena Badiana Wien. Verz. 126. 8. *Sp. n. sp. 73.*

Cynosba- na. 127. P. alis anticis fuscis apice albis. *Sp. n. sp. 74.*

Phalaena roborana Wien. Verz. 131. 34.

Mygindana. 128. P. alis anticis griseis: strigis posticis fuluis.

Phalaena Mygindana Wien. Verz. 131. 28.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Corpus cinereum. Alae anticae cinereae ponere medium strigis aliquot distinctis fuluis. Posticae obscure cinereae.

tripun- dana. 129. P. alis anticis fuscis apice albis: margine punctisque tribus distinctis fuscis.

Phalaena tripunctana Wien. Verz. 131. 35.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura omnino P. Cynosbanae. Alae anticae basi fuscae apice albae margine tamen postico fusco. Ante marginem interne maculae duae fuscae et inter has et marginem puncta tria fusca.

130. P. alis fusco rufoque variis: striga dorsali abbrevia- *Mitterba-*
ta alba. *chiana.*

Phalaena Mitterbachiana Wien. Verz. 129. 17.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Alae anticae fusco rufae. In medio striga com-
munis dorsalis abbreviata alba. Margo exterior et
posticus albo liturati.

131. P. alis fuscis argenteo subfasciatis. *sp. iug. 75.*

refinana. ✓

132. P. alis fuscis: maculis duabus flavis,

mediana. 

Wien. Verz. 128. 14.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Corpus fusca. Alae anticae fuscae macula
magna oblonga baseos ad marginem interiore et
alja versus apicem orbiculata flavis. Posticae ni-
gricantes.

133. P. alis anticis fuscis apice cinereis: maculis duabus *achatana*
ferrugineis.

Phalaena achatana Wien. Verz. 131. 27.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media. Caput et thorax fusca. Alae anticae basi fuscae
immaculatae apice cinereae maculis duabus magnis
ferrugineis, altera ad marginem tenuiorem ante api-
cem, altera in ipso apice marginis crassioris. Costa
albo punctata. Posticae cinereae.

134. P. alis depresso fuscis: punctis tribus centralibus *applanata.* ✓
Phalaena punctata Clerk. Icon. tab. 2. fig. 15. *sp. iug. 76.*

135. P. cinerea, alis depresso: disco communi baseos atro. *Boebera-*
Phalaena nisella alis, superioribus cinereo nebulosis: *na.*
macula communi ouata nigra. Linn. Syst. Nat. 2. 288.

136. *sp. Sv. 1377.*

Habitat in Daniae Quercu Dom. Lund.

Statura et magnitudo P. applanae. Antennae albo ni-
groque annulatae. Caput et thorax cinerea, imma-
culata. Alae anticae a basi vltre medium interne
nigrae margine exteriori cinereo, apice cinereac
margine obscuriore. Corpus cinereum, pedibus ni-
gricantibus.

136. P. alis depresso griseis: anticis subtus fuscis.

Heraclea-
na. ✓

Schaeff. Ins. 1758. tab. 2. fig. 3. 4. monogr. *sp. iug. 77.*

137. P. alis depresso fuscis, capite thoraceque niuels.

depressa- ✓

sp. iug. 78.

136. TI- na.

156. TINEA. *Palpi quatuor inaequales.*
Antennae setaceae.

cerella.

1. T. alis griseis postice emarginatis: dorso canaliculato fuscō. *sp. n. sp. 1.*

gigan-
tella.

2. T. alis anticis cinereo flavescentibus: posticis albisimmaculatis.

Tinea gigantella Wien. Verz. 135. 27.

Habitat in Austria Dom. Schieffernayller.

Magna in hoc genere. Palpi porrecti. Caput et thorax flavescentia. Abdomen cinereum. Alae anticae cinereo flavescentes, immaculatae. Posticæ albae.

colonella.

3. T. alis oblongis cinereis: punctis duobus atris antistrigam curuam undulatam obsoletam. *sp. n. sp. 2.*

Tinea colonella Wien. Verz. 133. 1.*sociella.*

4. T. alis oblongis cinereis antice albidis: striga undata nigra, postice obscuris striga undata nigra.

Tinea tribunella Wien. Verz. 319. 62. *sp. n. sp. 3.**centu-*
riella.

5. T. alis oblongis fuscō subfasciatis: macula flavescente.

Tinea centuriella Wien. Verz. 319. 63.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernayller.

Statura praecedentis at paullo minor. Alae cinereæ litura marginali in medio fusca, postice fascia una altera fusca et in hac macula magna flavescens. Posticæ cinereæ margine fuscō.

spissicella.

6. T. alis oblongis griseis antennarum articulis duobus inferioribus incrassatis. *sp. n. sp. 4.*

gelatella.

7. T. alis fuscō cinereis: anticis vitta alba. *sp. n. sp. 5.*

Tinea ligatella Wien. Verz. 319. 60.*euony-*
mella.

8. T. alis anticis niueis: punctis 50 nigris. Wien. Verz. 138. 18. *sp. n. sp. 6.*

padella.

9. T. alis anticis plumbeis punctis 20 nigris. Wien. Verz. 139. 19. *sp. n. sp. 7.*

plumbella

10. T. alis anticis plumbeis: macula media punctis numerosis apiceque fuscis.

Tinea plumbella Wien. Verz. 139. 34.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffernayller.

- Nimis affinis T. padellae. Differt tamen alis puncto medio maiori distincto et apice fuscis.
11. T. alis anticis albis: linea communis sinuata repanda sequella: maculisque lateralibus nigris. *Sp. vng. 9.*
12. T. alis anticis argenteis: lineola baseos arcuque com- *nitidella:* muni dorsali fuscis.
- Tinea nitidella* Wien: Verz. 137. 58.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Parva statura T. cornellae. Alae anticae argenteae nitidae lineola baseos luntillaque communi fuscis.
13. T. alis nigreis; fascia punctisque numerosis fusco cornellæ. aureis: *Sp. vng. 10.*
- Tinea sparsella* Wien: Verz. 141. 66.
14. T. alis luteis: anticis punctatis nigris trifariis; thorace antice posticeque fulvo. *Sp. vng. 11.*
Noctua irrorea Wien: Verz. 68. 6.
Habitat in Lichene patietino aliisque.
Larua hirta nigra maculis dorsalibus rhomboidalibus lateralibusque oblongis hauiis.
15. T. alis luteis: anticis nigro punctatis; posticis maculatis thorace atror. *Noctua rosicida* Wien: Verz. 68. 7.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Affinis T. irroellæ at duplo minor. Corpus totum atrum at solo fulvo. Alae anticae trifariam nigro punctatae, posticae maculis marginalibus fuscis.
16. T. alis anticis atris: punctis ferrugineis flavisque *pastulella:* numerosis.
- Phalaena punctella* Cram. Inf. 31. tab. 372. fig. L.
Habitar. — — — — —
Alae posticae pallescentes limbo nigro.
17. T. alis cinereis: puncto medio strigaque punctorum perlata. abbreviata nigris.
Habitat in Austria Dom. Schieffermyller.
Statura et magnitudo T. lutarella. Alae omnes supra pallide cinereae puncto nigro in medio versus marginem interiorem: et pone hoc striga obliqua e punctis quatuor nigris, quae tamen marginem tenuorem haud attingit.

- tinetella*. 18. T. alis albidis fusco lineatis apice strigis duabus fuscis. *Sp. inf. 12.*
- lutarella*. 19. T. alis supra luteis immaculatis: anticis subtus limbo fuso. *Sp. inf. 13.*
- Noctua lutarella* Wien. Verz. 68. 3.
Habitat in Europae Pino.
- Larua pilosa coerulescens nigro punctata: fasciisque abbreuiatis flauis albisque.*
Variat interdum margine alae posticae aut supra aut vtrinque fuso. *Noctua unita* Wien. Verz. 68. 2. at vix distincta videtur.
- mesomella* 20. T. alis anticis pallidis: margine flavo punctisque duobus fuscis. *Sp. inf. 14.*
- Noctua eborina* Wien. Verz. 68. 5. " "
- guttella*. 21. T. alis atris: anticis punctis albis numerosis. Sp. Inf. App. 509.
Tinea anthracinella Wien. Verz. 319. 60.
Habitat in Europae Sedo acri.
Antennae pectinatae.
- Oxyacan-* 22. T. alis fusco nebulosis: striga albida margineque posthella. *Sp. inf. 15.*
- vinetella*. 23. T. alis anticis fuscis: lineolis tribus argenteis; intermedia longiori interrupta.
Habitat Dresdae Mus. Dom. Romani.
Statura omnino T. pinetellae. Palpi valde porrecti longitudine thoracis. Alae fuscae lineis tribus aut quatuor argenteis. Posticae tenuissimae, nigrae, valde fimbriatae.
- argyrella* 24. T. alis striatis argenteis fusco nitidulis.
Tinea argyrella Wien. Verz. 135. 28.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Magna. Caput et thorax argento nitida. Abdomen cinereum. Alae argenteae, fusco nitidae. Posticae cinereae.
- Pinetella*. 25. T. alis anticis flavis: maculis duabus albissimis; anteriore oblonga, posteriore ouata. *Sp. inf. 16.*
Knoch. Beytr. 4. fig. 7.
Wien. Verz. 134. 7.
- pratella*. 26. T. alis anticis cinereis: linea albissima postice ramosa apice striis obliquis. *Sp. inf. 17.*
- Tinea pratella* Wien. Verz. 135. 29.

27. T. alis cinereis: linea albissima margine postico nigro punctato. Wien. Verz. 134. 4. *Sp. sig. 18.* *pascuella.*
28. T. alis cinereis: linea vicia albissima abbreviata. *culmella.* Wien. Verz. 134. 9. *Sp. sig. 19.*
29. T. alis fuscis: linea vicia albissima. Wien. Verz. 134. 5. *margari-*
tella. Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura omnino praecedentis. Differt tamen alis anticis linea vicia, siue vitta lacte alba postice latiore. Posticae cinereae.
30. T. alis anticis fuscis: linea vicia interrupta albissima. *conchella.* *Tinea conchella* Wien. Verz. 134. 6. Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Affinis omnino praecedenti at linea albissima in medio interrupta maculas duas format ferè ut in *T. pine-*
tella. Alae posticae cinereae.
31. T. alis anticis fusco alboque variegatis: posticis cinereis. Wien. Verz. 134. 16. *falsella.* Habitat in Saxonia Dom. Schieffermyller.
Caput et thorax cinerea. Abdomen fuscum, nitidum. Alae anticae striis fuscis albisque indistinctis, abbreviatis. Posticae cinereae, iumaculatae.
32. T. argentea, antennis fusco annulatis. *Sp. sig. 20.* *argen-*
Tinea perlilla Wien. Verz. 134. 11. *tella.*
33. T. alis anticis griseo fuscis immaculatis. *trifella.* *Tinea trifella* Wien. Verz. 134. 17. Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Statura praecedentium. Corpus ut alae anticae griseo fuscae, immaculatae. Posticae cinereae.
34. T. alis anticis flavis: lateribus sanguineis. Wien. *carnella.* Verz. 138. 13. *Sp. sig. 21.*
Schaaff. Icon. tab. 247. fig. 2. 3.
35. T. alis anticis cinereis: costa inaequali purpurascen- *Daphnel-*
te punctisque mediis atris. *la.* *Tinea Daphnella* Wien. Verz. 135. 37.
Habitat in Austriae Daphne. Dom. Schieffermyller.
Magna. Caput et thorax albida. Alae anticae cine-
reae costa inaequaliter purpurascente. In medio li-
cera fusca punctis duobus subocellaribus atris exte-

riore minuto. Margo posticus atro punctatus. Posticæ cinereæ.

Strigella. 36. T. alis anticis cinereo flaveſcentibus: striga marginali argentea. *Sp. iug. 22.*

Tinea chrysonuchella Wien. Verz. 134. 8.

Puncta aliquot atra ante marginem alae anticae.

✓ *margi-* 37. T. alis anticis griseis: margine crassiori albo; palpis porrectis incrassatis. Wien. Verz. 319. 65. *Sp. iug. 23.*

ad Aluatino pertinet.

38. T. alis lanceolatis cinereis: vitta fusca.

Tinea mucronella Wien. Verz. 136. 45.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Palpi porrecti. Corpus cinereum. Alae anticae lanceolatae, acuminatae, cinereæ vitta lata fusca ante marginem exteriorem. Posticæ exalbidae.

nigrella. 39. T. nigra, alis fuscis, abdomine rufo. *Sp. iug. 24.*

maurella. 40. T. nigra, alis anticis atris nitidulis.

Tinea maurella Wien. Verz. 142. 11.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Corpus nigrum. Alae anticae atrae, nitidulae, immaculatae.

anella. 41. T. alis anticis griseis: vitta obsoleta ferruginea punctisque duobus centralibus subocellatis.

Tinea anella Wien. Verz. 135. 30.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput et thorax cinerea; immaculata. Abdomen ferrugineum. Alae anticae griseæ costa obscuriore. Vitta obsoleta ferruginea ante costam et in medio puncta duo albida annulo fuscæ cincta. Posticæ cinereæ.

Fagella. 42. T. alis anticis griseis: strigis atomisque fuscis.

Tinea Fagella Wien. Verz. 134. 34.

Habitat in Austriae Fago sylvatica Dom. Schieffermyller.

Maior. Mas alis griseis striga antica posticaque punctis que mediis fuscis.

Fæmina alis anticis lanceolatis obscurioribus fuscis irroratis.

dryptella. 43. T. alis griseis: linea dimidiata albissimâ strigaque posticæ vndata argentea. *Sp. iug. 25.*

44. T. alis cinereis: strigis duabus angulatis fuscis argenteis marginali. *Sp. vng. 26.* gramella. ✓
45. T. alis coerulecentibus latere dorsali albis, thorace *salicella*. cristato. *Sp. vng. 27.*
- Phalaena salicana* Wien. Verz. 131. 37.
46. T. alis niueis: latere dorsali fusco. *dorsella.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magna statura omnino T. salicellae. Corpus niueum.
Alae antice niueae marginis tenuioris in primis versus apicem late fusco.
47. T. alis coerulecenti cinereis: pectinis vitta, media pusiella, maculisque rhombis contiguis atris.
Phalaena pusiella alis superioribus albis: punctis linearibus communi longitudinali dentata atra, inferioribus nigris. Linn. Syst. Nat. 2. 884. 347.
- Phalaena pusiella* Sp. Inf. 291. 8.
- Phalaena scalacella* Sp. Inf. 294. 28.
Wien. Verz. 140. 55.
48. T. alis fuscis: maculis albissimis; anteriore falcata *foenella*, posteriori veniformi. *Sp. vng. 29.*
49. T. alis anticis albidis: fasciis duabus tertiaque termini nigricantibus. Linn. Syst. Nat. 2. 885. 353. crataegella. la.
- Wien. Verz. 142. 7.
Habitat in Europae Crataego.
Magnitudo T. tapezellae.
50. T. alis anticis cinereis: fasciis duabus ferrugineis nigro marginatis. *palumbella.*
Tinea palumbella Wien. Verz. 138. 15.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Magna. Corpus griseum. Alae antice cinereae fasciis duabus cinereis, quarum anterior punctis duobus in medio strigaque postica notata, posterior antice striga vndata marginata. Posticae cinereae.
51. T. alis anticis fuscescentibus: strigis duabus lunulaque *abietella*, media pallida.
- Tinea abietella* Wien. Verz. 138. 16.
Habitat in Austriae Abiete Dom. Schieffermyller.
Statura magna praecedentis. Corpus griseum. Alae antice fuscescentes strigis duabus vndatis pallidis, quarum posterior antice nigro marginata. In medio lunula.

lunula pallida. Margo posticus nigro punctatus. Posticae cinereae.

tetricella. 52. T. alis griseo fuscis nitidulis immaculatis.

Tinea tetricella Wien. Verz. 138. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Alae omnes fusco nitidulae, immaculatae.

tapezella. 53. T. alis nigris postice albis, capite niuco. Wien. Verz. 142. 13. Sp. inf. 30.

pellionella 54. T. alis canis medio punto nigro, capite griseo.

vestinella. 55. T. alis cinereis: costa alba, apicibus adscendentibus plumosis. Wien. Verz. 139. 40. Sp. inf. 32.

sarcitella. 56. T. alis cinereis, thorace utrinque punto albo. Wien. Verz. 139. 41. Sp. inf. 33.

stigma-tella. 57. T. alis sublinearibus ferrugineis: macula costali alba. Sp. inf. 34.

limbella. 58. T. alis ciliatis exalbidis: limbo maculisque fuscis. Sp. inf. 35.

flauifron-tella. 59. T. alis anticis fusco cinereis immaculatis, capite flavo.

Tinea flauifrontella Wien. Verz. 143. 22.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Magna. Caput flavum. Thorax et alae anticae cinereae, immaculatae. Posticae albidae.

mellonella 60. T. alis canis postice purpurascens: striga alba, scutello nigro apice candido. Wien. Verz. 134. 2. Sp. inf. 36.

cuculla-tella. 61. T. alis argenteis: arcu dorsali fuscis. Sp. inf. 37.

arcella. 62. T. alis niueis: arcu communi maculisque duabus marginalibus fuscis. Sp. inf. 38.

arbutella. 63. T. alis rufis: strigis argenteis; intermediis bifidis. Sp. inf. 39.

tessella. 64. T. alis nigris: fasciis duabus remotissimis tessellatis. Sp. inf. 40.

clematella 65. T. alis anticis niueis: lineola baseos fascia media punctoque apicis nigris. Sp. inf. 41.

66. T. alis einereis: vitta fusca, palpis porrectis, anten- bicostellata. ✓
Tinea pyropella Wien. Verz. 137. 53.
67. T. alis anticis testaceis; linea longitudinali alba, paranthe-
Tinea genistella Wien. Verz. 137. 52. ? *Sp. iug. 43.* sella.
68. T. alis linearibus testaceis, antennis mediocribus. elongella. ✓
Tinea ciliella Wien. Verz. 136. 51. *Sp. iug. 44.*
69. T. alis linearibus pallide testaceis rufo irroratis. hemeda-
Tinea hemedactylella Wien. Verz. 144. 41. stylella. ✓
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Parua. Statura praecedentium. Alae lineares, anti-
 cae testaceae apice rufescentes, posticae fuscae.
70. T. alis anticis linearibus fuscis: maculis tribus flavis. cylindrel-
Sp. iug. 45. *Pedella deim.* la.
71. T. alis anticis, linearibus testaceis: punctis quatuor punctella,
 fuscis. *Sp. iug. 46.*
Tinea glaucitella Wien. Verz. 144. 40.
72. T. alis fusco cinereis: lineola media fascia que posti- undella,
 ca vndatis albis. *Sp. iug. 47.*
73. T. alis nigris: anticis striga argentea. *Sp. iug. 48.* cinctella. ✓
Tinea ligulella Wien. Verz. 319. 79.
74. T. alis nigris: margine tenuiori basi albis; punctis funerella. ✓
 duobus nigris.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Media. Alae anticae nigrae margine interiori ultra
 medium albo punctis duobus nigris distinctis. Ma-
 cula alba in medio marginis exterioris. Posticae ni-
 grae basi albae. Caput album puncto verticis nigro.
 Thorax albus punctis tribus anticis nigris.
75. T. alis nigricantibus: fasciis duabus; posteriore ob- leucatella. ✓
 soletiore capite albis. Wien. Verz. 139. 42. *Sp. i. 49.*
76. T. alis fusco argenteoque vndatis, posticis fuscis: strobilella ✓
 margine albo. Wien. Verz. 135. 24. *Sp. iug. 50.*
77. T. alis griseo fuscis: anticis albo lineatis, posticis striatella. ✓
 ciliatis immaculatis.

Tinea striatella Wien. Verz. 135, 26.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Parua. Caput et thorax nigra. Alae obscure griseae linea longitudinali alba a basi fere ad apicem ducta, alia obliqua brevis ad basin aliaque ad apicem. Posticae pilis longioribus ciliatae, fuscae, immaculatae,

peftinella. 78. T. alis cinerascentibus; arcu punctoque dorsalibus albidioribus.

Habitat in Suecia Dom. de Paykul.

Alae cinerascentes, nitidulae lunula media punctoque posticq communibus albidis.

Faemina magis obscura.

*2 pun-
tella.* 79. T. alis fuscocinereis; puncto marginali albo,
sp. inf. 51.

*4 pun-
tella.* 80. T. alis fuscis: punctis duobus albidis. *sp. inf. 52.*

Tinea atrella Wien. Verz. 140. 69.

dodecella. 81. T. grisea nigro punctata, alis pallido-fasciatiss: punctis trium parium fuscis. *sp. inf. 53.*

combrella. 82. T. alis fuscis: atomis albidis numerosis irroratis.

Phalaena combrella alis fuscis: atomis albis irroratis.
Linn. Syst. Nat. 2. 902. 404. In Sv. 1422. Wien. Verz.
136. 39.

Habitat in Europae Pino sylvestri.

obscurella 83. T. alis obscure fuscis nitidulis immaculatis.

Habitat in Sueciae Dom. de Paykul.

Parua tota obscure fusca, parum nitens, immaculata, Differt omnino a T. tetricella.

fuscella. 84. T. alis fuscocinereis: punctis duobus dorsalibus nigris. *sp. inf. 54.*

*tripun-
tella.* 85. T. alis cinereis: punctis disci tribus fuscis.

Tinea tripunctella Wien. Verz. App.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Media alae anticae cinereae, nitidulae punctis disci tribus fuscis 2. 1. Margo posticus nigro punctatus. Posticae pallidiores. Caput, thorax anusque ferruginea.

86. T. alis fusco cinereis nitidulis immaculatis. Wien. *cinerella*. ✓
Verz. 138. 25. 40. sp. 55.
87. T. alis nigris: basi maculaque marginali sulphureis. *bracteella*
Wien. Verz. 138. 24. 41. sp. 56.
Habitat in ligno Carpini Betulac. ✓
Larua subpilosa 14 poda, cinerea, capite caudaque fuscis sub reticulo intra corticem Carpini.
88. T. alis anticis atris; lunulis duabus punctoque flauo-*cuspidella*, uescentibus.
Tinea cuspidella Wien. Verz. 140. 58.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Media. Corpus atrum thoracis margine antico flauo-
scente. Alae anticae atrae lunula baseos et apicis flauis et in posteriori hac punctum flauum. Posticae valde ciliatae nigrae.
89. T. alis anticis fuscis; disco flauo; puncto subocella-*dimitri atro*. Wien. Verz. 141. 73. *diella*,
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Parua. Caput et thorax flaua. Abdomen fuscum. Alae anticae fuscae disco flexuoso flauo postice marginem exteriorem attingente. Punctum paruum subocellatum atrum in medio alae.
90. T. alis fuscis: macula communis dorsali duplice alba. *trigonella*, ✓
J. 40. sp. 57.
91. T. alis fuscis: maculis duabus dorsalibus albis, capite fulvo antennis pectinatis. *muscalella*,
Tinea muscalella Wien. Verz. 143. 28.
Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
Media. Caput fuluum antennis pectinatis fuscis. Alae fuscae maculis duabus communibus albis, anteriore maiore, Punctum paruum ad marginem exteriorem.
92. T. alis fuscis: macula rhombica nigra. *rhomboidea*, ✓
J. 41. sp. 59.
93. T. alis nigro albo argenteoque nebulosis, capite albo. *gemmella*,
J. 42. sp. 59.
94. T. alis fusco nitidulis: fasciis duabus albis; posteriore interrupta, capite rufo. *bifasciella*
Habitat in Dania Dom. de Sehestedt.

Media. Caput rufum. Alae anticae fuscae, nitidae fasciis duabus albis, anteriore ad marginem crassiore dilatata, posteriore e maculis duabus oppositis composita. Postice cinereae, immaculatae.

- capitella.* 95. T. alis fuscis: maculis tribus flavescentibus, capite ferrugineo. Sp. n. 60.

- rupella.* 96. T. alis fusco aureis: maculis quatuor marginalibus albis, capite rufo.

Tinea rupella Wien. Verz. 320. 45.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Media. Caput rufum. Alae fusco aureae maculis quatuor magnis albis, duabus ad marginem exteriorem, duabus ad interiorem.

- praelatella.* 97. T. alis violaceis: striga punctisque duobus oppositis albis.

Tinea praelatella Wien. Verz. 320. 46.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura praecedentis. Alae violaceae, nitidulae striga media maculisque duabus versus apicem oppositis albis. Caput ferrugineum.

- sulphurella.* 98. T. fusca, capite, thorace alarum basi maculaque costali sulphureis. Sp. n. 61.

- compositella.* 99. T. alis fuscis: macula dorsali communi, argentea e strigis quatuor composita. Sp. n. 62.

- minutella* 100. T. alis atris: maculis duabus ferrugineis suboppositis. Wien. Verz. 140. 50. Sp. n. 63.

- Petirella.* 101. T. alis subgriseis: litura dorsali flava apiceque punctis tribus nigris. Wien. Verz. 136. 31. Sp. n. 65.

- Listerella.* 102. T. antennis mediocribus albo annulatis, alis griseo fuscis: punctis apicis nigris. Linn. Syst. Nat. 2. 896. 432. In Sv. 1395. Wien. Verz. 139. 30.

Habitat in Europa.

Alae anticae griseo fuscae. Puncta aliquot nigra ad marginem posticum.

- Fuesletta.* 103. T. alis auratis argenteo subfasciatissimangulo ani macula atra; punctis tribus argenteis. Sp. n. 66.

- Geoffroyella.* 104. T. alis flavescentibus argenteo striatis: maculis duabus sulphureis marginalibus, antennis mediocribus. Sp. n. 67.

105. T.

105. T. alis fuscescentibus lineolis fasciaque albis. *Denisella.*
Tinea Denisella Wien. Verz. 138. 25.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura omnino praecedentis. Palpi magni recurui, albi margine fuscō. Alae anticae pallide fuscæ lineolis duabus baseos, in medio fascia lata ad marginem crassiorem late bifida et versus apicem striga obliqua abbreviata albis. Posticae nigricantes, immaculatae.

106. T. antennis breuibus albo annulatis, alis liuidis: *Mouffetella*.
atomis oblongis fuscis. Wien. Verz. 140. 57. *sp. n. 66.*

107. T. alis fuscis: linea vicia aurea antrorum arcuata. *Albinella.*
sp. n. 69.

108. T. alis auratis: strigis duabus argenteis. *sp. n. 70.* *Seppella.* ✓
gen. nov. n. 42.

109. T. alis cinereis: strigis tribus abbreviatis lineolis. *Eperella.*
sp. n. 71. que duabus apicis argenteis fuscō marginatis. *Zudzen.*

110. T. alis auratis: fasciis duabus punctisque tribus argenteis. *Goedartella.*
Wien. Verz. 143. 29. sp. n. 72.

111. T. alis nigris: fasciis tribus argenteis transuerso di- *Meria-*
varicatis. Wien. Verz. 143. 31. *sp. n. 73.* *nella.*

112. T. alis nigris: fasciis quatuor argenteis arcuatis; secunda recta. *Wilkella.*
sp. n. 74.

113. T. alis auratis: strigis tribus nigro argenteis: tertia externe bifida. *Schieffermyllerella.*
sp. n. 75.

114. T. alis planis auratis: limbo atro punctisque argenteis numerosis. *Bergstraessella.*
sp. n. 76.

115. T. alis flavis: fasciis quatuor argenteis; tertia superne bifida. *Lyone-tella.*
sp. n. 77.

116. T. alis albis: lineolis duabus argenteis, posticeque *Bonnevndatis.* *tella.*
sp. n. 78.

117. T. alis nigris: disco aureo; striga lineis duabus posticis punctisque tribus argenteis. Wien. Verz. 138. 21. *Schaefferella.*
Caput argento nitidum. *sp. n. 79.*

118. T. alis nigris: punctis albis sparsis, antennis albo annulatis. Linn. Syst. Nat. 2. §96. 434. Wien. Verz.
 138. 12.

Habitat in Europæ hortis.

Alae nigrae punctis albis.

119. T.

- Stroe-mella.* 119. T. alis atris: punctis quatuor argenteis maculisque quatuor marginalibus flavis. Sp. m. 80.
- Gleiche-nella.* 120. T. alis planis atris: fascia media maculisque duabus apicis oppositis argenteis. Sp. m. 81.
- Tinea metallica* Wien. Verz. 144. 34.
- Cydoniella* 121. T. alis aurcis: lineola baseos punctisque quatuor parium albissimis.
- Tinea Cydoniella* Wien. Verz. 144. 35.
- Habitat in Pyro Cydonia Austriae Dom. Schieffermüller.
Minuta. Alae anticae auratae lineola baseos punctis-
que octo marginalibus per paria dispositis.
- Rhediella* 122. T. alis nigris apice fuluis: strigis interruptis ar-
genteis. Sp. m. 82.
- Herman-nella.* 123. T. alis auratis: lineolis argenteis apice fuscis Spec.
Inf. App. 509.
- Roesella.* 124. T. alis nigro auratis: punctis nouum argenteis con-
uexis submarginalibus. Wien. Verz. 143. 30. Sp. m. 83.
- Leuwen-hockella.* 125. T. alis auratis: striga baseos punctisque quatuor op-
positis argenteis.
- Tinea Leuwenhockella* Wien. Verz. 141. 7.
- Tinea Leuwenhockella* alis superioribus fuscis: fasciis
duabus macula lineaque argenteis. Linn. Syst. Nat. 2,
897. 437. In Sv. 1400.
- Habitat in Europae hortis Dom. Schieffermüller.
Parua. Antennae nigrae ante apicem albae. Alae an-
tiae aurea striga baseos paribusque duobus puncto-
rum argenteorum. Apex alae nigricat.
- Linneella.* 126. T. alis fusco auratis: punctis quatuor argenteis ele-
vatis. Sp. m. 84.
- Rajella.* 127. T. alis auratis: maculis septem argenteis; secunda
tertiaque connatis. Wien. Verz. 143. 32.
- Forste-rella.* 128. T. alis fusco auratis; arcu dorsali lineolisque mar-
ginalibus argenteis, apice macula atra; pupilla ar-
gentea. Sp. Inf. App. 509.
- Schrebe-rella.* 129. alis auratis basi fasciis duabus maculisque duabus api-
cis argenteis nitidissimis.
- Kleman-nella.* 130. T. alis auratis: strigis quatuor argenteis; posticis
duabus interruptis punctoque terminali atro. Sp. Inf.
App. 509.

131. T. alis auratis: maculis fasciaque media purpureis. *Tunbergella.*
 Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
 Parua. Corpus nigrum. Antennae breues nigrae. Alae anticae aureae, nitidae. Maculae duae purpureae ante medium ad marginem crassiores. In medio fascia lata purpurea ad marginem crassorem bisida, versus apicem denique adhuc macula purpurea. Alae posticae auratae, immaculatae.
132. T. alis aureo argenteis: apice obtuso vistulato sub ocellato. *Harrietta.*
133. T. alis fusco argenteis: fascia postica aurata. *Drurella.*
134. T. alis pallide argenteis: puncto terminali atro. *Cramarella.*
135. T. alis auratis: lineola apicis maculisque septem marginalibus argenteis. *Blancarella.*
136. T. alis rubro aureis: macula communis flava. *fibulella.*
Tinea fibulella Wien. Verz. 143. 33.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
 Minuta. Capitulum cum antennis brevibus nigrum. Alae anticae rubro aureae, nitidae macula magna communis flava.
137. T. alis anticis fusco cinereoque griseis: striga alba: *exiguella.*
Tinea exiguella Wien. Verz. 143. 21.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.
 Minuta.
138. T. alis auratis postice atris: fascia argentea. *aurella.* ✓
 Wien. Verz. 142. 9.
139. T. alis argenteis postice subcaudatis fusco striatis punctoque atro. *Clerkella.*
140. T. aptera lacuis nigra. *Lichenella.*

157. ALVCITA. *Palpi* duo ad medium bifidi: lacinia interiori acutissima.

Antennae setaceae.

- Xylostella* 1. A. alis cinereo fuscis: vitta dorsali communi sinuata alba. Wien. Verz. 137. 54.
Tinea sifymbrella Wien. Verz. 140. 46. vix differt.
- ephippella* 2. A. alis pallide auratis: vitta dorsali niuea; fascia aurea.
Tinea pruniella Wien. Verz. 141. 75.
- dentella.* 3. A. alis fuscis apice falcatis: vitta dorsali communi unidentata alba.
Tinea harpella Wien. Verz. 136. 50.
- syluella.* 4. A. alis flavo auratis; fasciis duabus fuscis obliquis.
- lucella.* 5. A. alis flavis immaculatis, capite thoraceque niueis.
Tinea antennella Wien. Verz. 135. 19.
- alpella.* 6. alis flavis: maculis oliuaceis.
Tinea alpella Wien. Verz. 135. 21.
 Habitat in Austriae montosis Dom. Schieffermüller.
 Statura omnino A. lucellae. Caput et thorax flava immaculata. Alae anticae flavae maculis aliquot oliuaceis. Costa punctata. Posticae cinereae.
- flauella.* 7. A. alis fusco aureis: vitta abbreviata maculaque flavis.
Tinea majorella Wien. Verz. 140. 1.
 Habitat in ligno antiquo Querci.
 Vitta alae anticae ad marginem interiorem.
 Laruae tres annos ante metamorphosin attingunt.
- vittella.* 8. A. alis cinereis: vitta dorsali margineque postico nigris. Wien. Verz. 135. 42.
- nyctemera-*
rella. 9. A. alis anticas niueis: vitta communi dorsali dentata maculisque costalibus atris.
Tinea nyctimerella Wien. Verz. 130. 38.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Caput et thorax alba. Alae anticae niueae vitta dorsali dentata atra costaque atro maculata, ad basin litura, in medio macula magna puncto albo, tunc macula transversa fere geminata et tandem lineola apicis. Posticae fuscac.

10. A. alis fusco nitidis: marginibus niueis. *margi-*

 11. A. alis fuscis: vitta communi dentata alba, thorace niueo: punctis duobus atris. *nella.*
^{2 punctis} *pun-*
Tinea Echiiella Wien. Verz. 140. 54. *ella.*
12. A. alis albo nigroque variis, capite niueo. Wien. *granella.*
 Verz. 141. 77.
13. A. alis albidis apice fusco variis. *Betuli-*
 Habitat in Bolito betulino Sueciae Dom. de Paykull. *nella.*
 Statura omnino A. granellae at duplo maior. Caput et
 thorax albida. Alae postice adscendentibus basi albi-
 dae apice variegatae.
14. A. alis niueis: maculis duabus marginalibus fasciaque *niueella.*
 nigris, capite albo.
15. A. alis pallidis: puncto nigro apice adscendentibus. *tappella.*
 Wien. Verz. 142. 12.
16. A. alis anticis emarginatis sulphureis: strigis abbre- *Perficella*
 uiatis obscurioribus.
Tinea Porsicella Wien. Verz. 319. 67.
 Habitat in Austriae Porsica Mus. Dom. Schieffermyller.
 Statura et magnitudo T. asperellae. Caput et thorax
 flava. Abdomen cinereum. Alae anticae apice emar-
 ginalatae sulphureae strigis duabus abbreviatis margi-
 nis tenuioris obscurioribus. Posticae cinereae ciliis
 albis.
17. A. alis anticis albidis: maculis duabus communibus *asperella.*
 nigricantibus apice emarginatis.
Phalaena asperella alis albidis: macula communi fu-
 sca, apicibus nigro punctatis retusis. Linn. Syst. Nat.
 2. 891. 397. In Sv. 1447. Wien. Verz. 136. 46.
 Habitat in Europa.
 Media. Alae anticae albidae apice late emarginatae
 emarginatura fusca. In medio dorsi maculae duas
 communes fuscae. Posticae cinereae.
18. A. niuea, alis rufo auratis: macula costali baseos al- *costella.*
 ba fusco punctata. *sp. sing. 13.*

scabrella. 19. A. alis fusco cinereis: punctis nigris eleuatis scabris.

Tinea bifissella Wien. Verz. 319. 68. Sp. Inv. 16.

Alas anticæ apice emarginatae.

aristella. 20. A. albida, alis linea argentea. Sp. Inv. 15.

caudella. 21. A. alis subcaudatis testaceis: linea postica fusca. Sp. Inv.

Enzen-bergella. 22. A. alis emarginatis fuscis: vitta media argentea.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Media. Palpi porrecti. Alae angustæ, fuscae vitta media argentea, quæ tamen marginem posticum hanc attingit. In vitta hac lineolæ aliquot fuscae. Margo posticus alae emarginatus. Posticae cinereæ, immaculatae.

Swam-merdam-mella. 23. A. alis pallidis immaculatis, antennis longissimis.

Wien. Verz. 141. 2. Sp. Inv. 17.

pilella. 24. A. alis fuscescentibus immaculatis, antennis longissimis:

Tinea pilella Wien. Verz. 142. 6.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennæ albidæ basi flavescentes.

Robér-tella. 25. A. antennis longissimis albis; alis fuscis: angulo ani albo. Sp. Inv. 18.

Frischella. 26. A. antennis mediocribus apice albis, alis fusco auratis.

Tinea aeneella Wien. Verz. 319. 82. Sp. Inv. 19.

Erxel-bella. 27. A. antennis mediocribus unicoloribus, alis anticis fu-

scio aureis; posticis nigris; capite fulvo.

Habitat Goettingæ Dr. Schulz.

Nimis affinis videtur A. Calthellæ. Antennæ mediocribes, pallescentes. Caput fuluum. Thorax et alae anticæ fusco aureæ margine postico obscuriore. Pedes postici longiores, fului:

Calthella. 28. A. atra; alis anticis totis aureis; capite ferrugineo.

Tinea rufimetella Wien. Verz. 142. 16.

prometella. 29. A. antennis mediocribus, alis anticis fusco aureis;

posticis flavis: margine nigro;

Tinea

Tinea promulella Wien. Verz. 142. 17.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Statura et magnitudo A. calthellae distincta alis posticis flavis margine nigro.

30. A. alis atro aureis: fascia flava, antennis longis. Wien. Degeerella. Verz. 143. 21. ✓

31. A. antennis mediocribus, alis nigris: fascia alba. Podaella.

32. A. antennis longioribus nigro aureis: fascia aurea. Sulzella. Linn. Syst. Nat. 2. 896. 427. Wien. Verz. 143. 24. ✓

Habitat in Europa.

Nimis A. Degeerellae affinis. Antennae matis usque ad basin incrassatae, mediocres, faeminae longissimae.

33. A. alis viridi aureis, corpore atro, antennis longis vindella. albis.

Tinea vindella. Wien. Verz. 142. 4.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Vix satis ab A. Reaumurella distincta.

34. A. alis nigris extrorsum deauratis, antennis longissimi- Reaumu- mis. Wien. Verz. 143. 22. retta. ✓

35. A. alis cupro aureis nitidis, antennis longissimis. caprella. cuprella. ✓

Tinea cuprella Wien. Verz. 320. 44.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Vix satis distincta ab A. Reaumurella. Differt tantum alarum colore rubro cupreo.

36. A. alis auratis: fascia fusca, antennis apice albis. fasciella. ✓

Tinea Schieffermüllerella Wien. Verz. 142. 20.

37. A. alis auratis flavo striatis: fascia media flava cupro striatella. marginata. ✓

38. A. alis anticis auratis: maculis duabus sulphureis op- sulphu- positis, posticis flavis. retta. ✓

39. A. alis anticis ferrugineo flavis: strigis duabus ab- formo- breuiatis obliquis albis; posteriore maiore. sella. ✓

Tinea formosella Wien. Verz. 140. 47.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.

Media. Alae anticae flavo ferrugineoque variae. Strigae duae ad marginem crassiores abbreviatae, oblique posteriore maiore. Posticae fuscae. Antennae albo annulatae.

- festiculla*. 40. A. alis anticis albis: maculis duabus fuscis apice flauis.
Tinea festicula Wien. Verz. 319. 80.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Parua. Palpi albi basi fuscii. Caput nivium. Alae anticae fere lineares basi albae apice flavae in medio maculae duae fuscae annulo albo cinctae vna pone alteram. Posticae fuscae.
- oppositella*. 41. A. alis fuscis: maculis duabus oppositis flauis, posticis fuscis.

158. PTÉROPHORVS. *Palpi* duo lineares.

Lingua exserta membranacea.

Antennae setaceae.

- monodactylus*. 1. P. alis patentibus linearibus indiuisis.
- ochroda-*
dactylus. 2. P. alis patentibus linearibus indiuisis: anticis griseis, posticis nigris.
Alucita ochroda-
dactyla Wien. Verz. 145. 1.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Parua. Abdomen basi rufescens. Alae inimaculatae.
- didactylus*. 3. P. alis fissis fuscis: strigis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis Wien. Verz. 145. 2.
- calodactylus*. 4. P. alis fissis fuscis: anticis subfalcatis fissis fulvo maculatis, posticis tripartitis.
Alucita calodactyla Wien. Verz. 146. 4.
 Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermüller.
 Statura praecedentium. Alae anticae cinereo fuscae apice obscuriores macula magna fulua. Margo interior dentatus, posticus fissus. Posticae tripartitae nigrae. Pedes albo annulati.
- tridactylus*. 5. P. alis fissis pallidis: lineis albidis, anticis bifidis, posticis tripartitis.
- rhododactylus*. 6. P. alis fissis flavescentibus: strigis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis.
Alucita rhododactyla Wien. Verz. 146. 5.

Habi-

Habitat in Saxoniae Rosis Dom. Zschuck.

Alae anticae flavae basi obscuriores strigis duabus albis anteriore obliqua vsque ad strigam posteriorem fasci. Posticae tripartitae lobis duobus anterioribus flavescentibus, tertio albo macula magna ante apicem ferruginea. Corpus ferrugineum thoracis lateribus flavescentibus.

7. P. alis patentibus fissis cinereo nebulosis, posticis fusco nebulosis. *tessellatus.* ✓

Alucita leucodactyla Wien. Verz. 146. 7. ?

8. P. alis patentibus fissis testaceis: puncto fusco. Wien. *pterodactylus.* ✓

- Verz. 146. 6. *migadactylus.*

9. P. alis fissis albido maculatis: anticis fissis, posticis tripartitis. *migadactylus.*

Alucita migadactyla Wien, Verz. 146. 8.

Habitat in Austria Mus. Dom. Schieffermyller.

Statura praecedentium. Corpus album. Alae anticae albidae fusco maculatae, posticae fuscae. Pedes albi fusco maculati.

10. P. alis niveis: anticis bifidis, posticis tripartitis. Wien. *pintatus.* ✓

Verz. 146. 9. *dactylus.*

Schaeff. Icon. tab. 214: fig. 4.

11. P. alis fissis cinereis: singulis sexpartitis. Wien. Verz. *hexadactylus.* ✓

146. 10.

CLASSIS VII.

R Y N G O T A.

159. FVLGORA. Os rostro elongato: vagina quinque articulata.

Antennae breues, capitatae.

- laterna-* 1. F. fronte rostrata recta, alis liuidis: posticis ocellatis. Stoll. Cicad. tab. 1. fig. 1.
- ferrata.* 2. F. fronte rostrata adscendente quadrifarie ferrata.
- diadema.* 3. F. fronte rostrata muricata, apice trifido, alis nigris rubro marginatis.
Fulgora armata Drury Ins. 3. tab. 50. fig. 4.
 Stoll. Cicad. 1. tab. 5. fig. 22.
- candela-* 4. F. fronte rostrata adscendente, elytris viridibus luteo maculatis, alis flauis apice nigris.
- phospho-* 5. F. fronte subulata rostrata adscendente, corpore griseo glauco.
- noctuina.* 6. F. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore viridi, alis hyalinis.
- lucerna-* 7. F. fronte rostrata prominente, corpore supra viride scente subtus flauo.
- flammea.* 8. F. fronte rostrata adscendente tereti truncata. Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 7.
- tenebrosa* 9. F. fronte rostrata recta truncata, elytris griseis scabris.
- obscurata* 10. F. fronte rostrata recta truncata, elytris cinereis nigro maculatis. Stoll. Cicad. 1. tab. 6. fig. 28.
- adscen-* 11. F. fronte rostrata subulata adscendente, elytris ferrugineo fuscis albo punctatis.
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Parua. Rostrum porrectum subulatum supra nigrum, subtus flauum. Caput subtus flauum strigis duabus obliquis nigris, supra linea dorsali nigra. Thorax ob-

obscurus. Elytra ferrugineo fusca punctis paruis numerosis albis. Alae hyalinae. Corpus flauum abdominis limbo supra nigro.

12. F. fronte rostrata adscendente, elytris ferrugineo fusca: fasciis duabus puncto que postico viridibus.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis et forte mera eius varietas. Caput conicum, sulcatum apice rostratum, flauum dorso fuscum. Thorax obscurus. Elytra ferrugineo fusca fasciis duabus puncto que marginali versus apicem viridibus. Corpus flauum abdomine supra rufo.

13. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis viridibus. *truncata.*

14. F. fronte porrecta plana flavescentia, thorace elytris planaque ferrugineis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput porrectum, supra planum, flavescentia margine parum ferrugineo, subtus vnfuscum. Thorax ferrugineus margine antico flauo. Elytra ferruginea apice hyalina. Alae hyalinae, nitidae. Corpus flauum abdomine supra ferrugineo.

15. F. fronte porrecta plana, elytris viribus apice hyalinis. *pallipes.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis. Caput porrectum planum, nigrum margine omni albido. Thorax virescentia litura antica nigra. Elytra laevia, viridia basi parum flavescentia apice hyalina et ante apicem striga macularum nigrarum. Abdomen supra fuluum anno nigro, subtus flauum. Alae hyalinae. Pedes pallidi.

16. F. fronte conica inaequali, elytris hyalinis: striga *hyalinata* atra.

17. F. fronte conica, elytris fusca: margine exteriori *festina*. virescente, punctis nigris fulvisque, alis basi rubris.

18. F. fronte conica bisulcata, elytris hyalinis; macula *senestrata* marginali fusca.

19. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis. Stoll. Cicad. I. tab. II. fig. 51.

- minuta.* 20. F. fronte conica, capite thoraceque flavescentibus linea dorsali, elytris albidis.
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
Parua statura. Cicadae at omnino huius generis. Antennae breues, crassae, extrosum crassiores. Corpus totum flavescentis linea capitinis thoracisque dorsali alba. Elytra pallida.

160. MEMBRACIS. *Labium* corneum elongatum apice membranaceum, subulatum.

Antennae subulatae fronti insertae.

- inflata.* 1. M. thoracis folio inflato testaceo reticulato.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magnitudo et statura M. foliatae. Thoracis folium magnum, inflatum, inane, pellucidum, testaceum nervis obscurioribus reticulatum punctisque septem nigris utrinque notatum. Corpus flavescentis. Elytra hyalina margine tenuiori obscuriori.
- rhombea.* 2. M. foliacea, folio rhombeo postice latiore.
- fronditia.* 3. M. thorace foliaceo: dorso repando sinuato apice porrecto obtusissimo. Stoll. Cicad. I. tab. 6. fig. 3. A. B. C.
- foliata.* 4. M. thorace foliato rotundato flavo: fascia maculaque atris. Stoll. Cicad. tab. I. fig. 2.
- lunata.* 5. M. thorace foliaceo rotundato atro: lunulis tribus albis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Statura omnino M. foliatae at minor et alia. Corpus totum atrum. Thoracis folium magnum, compressum, rotundatum, atrum lunulis tribus albis, quarum posteriores interdum connatae.
- fasciata.* 6. M. thorace foliaceo rotundato atro: fasciis duabus: anteriore fulva, posteriore alba.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Statura praecedentium. Thoracis folium elevatum, compressum, rotundatum, postice acutum, atrum ante-

tice fascia latissima fulua, postice fascia minori alba. Corpus atrum, immaculatum. Tibiac posticae ferratae.

7. M. thorace foliaceo viridi immaculato. *bracteata*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Thoracis folium eleuatum, compressum, ante obtusum, postice acutum, viride, immaculatum, Corpus flavescentia. Elytra alaque albo hyalina, immaculata.

8. M. thorace foliaceo antice posticeque acuto griseo. *squamiger.*

9. M. thoracis cornu supra caput porrecto compresso ca- *hastata.*
rinato, corpore griseo.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Corpus paruum omnino griseum. Thorax antice valde porrectus, compressus, carinatus apice truncatus, postice longitudine abdominis.

10. M. thoracis cornu supra caput porrecto incuruo, cor- *lanceo-*
pore atro: maculis duabus dorsalibus albis. *lata.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua, Thorax supra caput valde porrectus, compressus, incurvus, postice productus, acutus, ater maculis duabus dorsalibus albis. Corpus atrum, immaculatum. Tibiae anticæ valde compressæ.

11. M. thorace tricorni postice productio longitudine *spinosa:*
alarum.

12. M. thorace tricorni: cornu intermedio longiori com- *acumi-*
presso. *nata.*

13. M. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilata- *aurita.* ✓
to rotundato.

14. M. thorace bicorni postice productio abdome longiori atro: *margi-*
nate. *nata.*

Stoll, Cicad. I. tab. II, fig. 53. B.

Habitat in China.

Magna in hoc genere. Thorax porrectus antice cornibus duobus porrectis, arcuatis postice productus abdome longior subulatus, niger margine exteriori flavescente. Alae fuscæ.

- horrida.* 15. M. thorace bicorni postice producto biclauato apice trispinoso.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Media. Caput nigrum lineis tribus flauicantibus. Thorax antice gibbus spinis duabus elongatis acutis, ater margine albo, postice valde productus, niger biclauatus vel in medio et apice tuberculo magno elevato, globoso, apicis spinis tribus elongatis acutis ante apicem albis. Elytra obscure hyalina. Pedes pieci.
- trifida.* 16. M. pilosa, thorace quadricorni postice producto trifido: laciniis subulatis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magnitudo M. Tauri. Caput atrum linea media alba. Thorax pilosus, antice gibbus, ater linea media lateralique interrupta albis. Cornua duo elongata, arcuata, acuta in margine antico et pone haec duo alia breviora erecta basi connata, postice valde productus, fornicatus, trifidus laciniis distantibus subulatis acutis, intermedia longiore. Elytra albo hyalina fascia media fusca et in hac punctum hyalinum. Abdomen coccineum ano nigro.
Larua testacea spinis plurimis dorsalibus nigris.
- clavata.* 17. M. thorace quadricorni postice producto trifido: laciniis lateralibus ante apicem clauatis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Farua. Caput nigrum ore flauescente. Thorax niger antice cornubus duobus porrectis arcuatis acutis et pone haec duo breviora basi connata, postice productus, fornicatus, trifidus laciniis distantibus intermedia longiori, subulata, lateralibus ante apicem clava valida, ouata. Elytra albo hyalina. Abdomen pallidum ano obscuriore. Pedes flauescentes.
- punctata.* 18. M. thorace bicorni albo punctato postice producto abdomine longiori.
- ✓ cornuta.* 19. M. thorace bicorni nigro postice subulato longitudine abdominalis, alis fuscis.
- Taurus.* 20. M. thorace bicorni fusco postice producto filiformi longitudine abdominalis, cornubus arcuatis.

21. M. thorace bicorni viridi: arcu lineolaque albis, postice subulato longitudine abdominis, alis albis. *Vitulus.*
22. M. thorace subinermi postice producto, abdomine 2 punctabreniore testaceo, elytris macula baseos nigra. *ta.*
23. M. thorace bicorni postice producto, margine albo, *Bonasia.*
alis puncto baseos flavo.
24. M. thorace inermi laeui virescente: margine flavo, *conuoluta*
postice producto abdomine longiori.
25. M. thorace inermi ferrugineo postice producto ca-*mutica.*
rinato longitudine abdominis.
26. M. thorace inermi virescente postice subulato longi-*inermis.*
tudine abdominis.
27. M. thorace inermi fusco postice producto abdomine *Genista.* ✓
dimidio breuiore.

161. TETTIGONIA. Os rostro vagina biar-
ticulata gulae in-
ferta.

Antennae fataceae.

1. T. thorace viridi nigro sublineato, alis albis posticis *grossa.*
macula baseos flava.
2. T. capite thoraceque nigris ruso maculatis, elytris ni-*fasciata,*
gris: fascia abbreviata alba.
Stoll. Cicad. 1. tab. 4. fig. 17.
Habitat in Iaua.
Magna. Caput nigrum lunulis duabus rubris. Tho-
rax niger maculis duabus marginis anterioris rufis.
Elytra nigra fascia lata alba, quae tamen marginem
exteriorem haud attingit. Alae atrae, immaculatae.
Abdomen brunneum.
3. T. grisea elytris aqueis: margine postico nigro pun-*grisea.*
ctato, costa antice alba.
4. T. thoracis margine dilatato acuto, alis atris: margi-*limbata,*
ne albo.
Stoll. Cicad. 1. tab. 12. fig. 57.

- dilatata.* 5. T. thoracis margine dilatato atra, alis albidis.
- spinosa,* 6. T. thorace vtrinque vniispinoso fuscæ, elytris obscuris: striga maculari nigra.
Habitat in Sumatra Mus. Dom. Banks.
- Magna. Corpus fuscum vix maculatum. Thorax margine parum dilatato spinaque parua acuta armato. Squamae abdominales elongatae longitudine fere abdominis oblongo ouatae, testaceae basi spina valida incumbente acuta armatae. Alae obscurae neruis nigris et ante marginem maculae quatuor, quarum tres exteriore concatenatae fere strigam constituant.
- vaginata.* 7. T. testacea, elytris albidis: costa nigra.
Habitat in Sumatra Mus. Dom. Banks.
- Corpus magnuin, testaceum, immaculatum. Elytra obscure albida, immaculata at costa atra. Squamae abdominales elongatae fere longitudine corporis ouatae, fornicatae, testaceae basi spina valida acuta incumbente armatae.
- Tibicen.* 8. T. scutello emarginato, alarum costa virescente.
- septende-* 9. T. nigra, elytris albis: costa flava.
- cim.*
- catena.* 10. T. thorace variegato, elytris hyalinis antice neruis punctatis, postice strigis duabus vndatis fuscis.
- pustulata.* II. T. atra, capite thoraceque rubro maculatis, elytris fuscis basi obscurioribus: venis testaceis.
Habitat in America meridionali Dom. Vahl.
- Magna. Caput atrum maculis tribus frontalibus rubris. Thorax ater margine antico lateralibusque rubro maculatis. Abdomen atrum segmentorum marginibus maculis duabus testaceis. Anus testaceus. Pedes atri femoribus macula testacea. Alae omnes obscurae basi obscuriores venis testaceis.
- maculata.* 12. T. atra, thorace elytris aliquo maculatis.
- frigidula.* 13. T. villosa elytris griseis, alis flavis omnibus margine hyalino.
- singulata* 14. T. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdome atro: fasciis flavis,

15. T. thorace fuscō viridique variegato, pectore albo *villoſa*, villoſo.
16. T. thorace variegato, clytris hyalinis: costa flave. *cruentata* scente, abdomine atro; fasciis sanguineis.
17. T. atra, clytris basi flavo maculatis, ano flavo. *conspurcata*.
18. T. nigra immaculata, abdominis incisuris sanguineis. Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 11. *haemata*. ✓ des.
19. T. clytris intra marginem punctis sex concatenatis *Orni*. anastomosis interioribus fuscis. ✓
- Larva* edulis.
20. T. clytris linea flexuosa, alis margine hyalino. *repanda*. ✓
21. T. grisea, thoracis linea alba, clytris albo reticulatis. *reticulata*
22. T. atra, alis albis basi nigris: venis testaceis. *atrata*.
23. T. nigra abdomine sanguineo, clytris alisque testa. *testacea*. cels: venis nigris. ✓
- Stoll. Cicad. I. tab. 8. fig. 41. C.
- Habitat Tranquebariae.
- Media. Caput et thorax nigra immaculata. Abdomen omnino sanguineum. Alae omnes testaceae venis nigris.
24. T. nigra ore thoracis maculis duabus abdomineque *sanguinolenta*. sanguineis.
25. T. clytris fusco aureis, tibiis anticus incrassato denta. *splendida*. rufis.
26. T. clytris hyalinis: costa sanguinea, abdomine linea *mota*. dorsali sanguinea.
27. T. violacea, alis apice fuscis. *violacea*.

162. CICADA. *Os labio rotundato apice setaceo.**Antennae filiformes sub oculis insertae.*

- perspicil-* 1. *C. atra*, alis macula ocellari albo hyalina, abdomine apice flavo.
Stoll. Cicad. 1. tab. 1. fig. 5.
- ocellata.* 2. *C. elytris compressis adscendentibus viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis.*
- limbata.* 3. *C. elytris deflexis viridibus: margine rubro; interiori basi nigro punctato.*
- margi-* 4. *C. flava, elytris deflexis nigris: linea laterali alba,*
nata.
- phalaenoides.* 5. *C. exalbida, alis deflexis patulis, elytris antice nigro punctatis.* Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 9.
- bipunctata-* 6. *C. exalbida, elytris deflexis, thoracis margine antico punctis duobus impressis.*
- retusa.* 7. *C. exalbida immaculata, capite antice retuso.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum exalbidum, immaculatum. Caput antice obtusum, truncatum margine eleuato.
- grisea.* 8. *C. grisea, elytris deflexis, capite apice puncto nigro.*
- punctata-* 9. *C. elytris deflexis viridibus, punctis tribus albidis,*
ta.
- viuida.* 10. *C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica.*
- minuta.* 11. *C. elytris deflexis viridibus: dorso scabro, capitis margine postico thoraceque linea dorsali sanguinea.*
- cunicula-* 12. *C. alis deflexis hyalinis: striga fascia punctisque fusca, ano lunato.*
Omnes praecedentes forte proprii generis.
- lanata.* 13. *C. elytris apice nigris: punctis coeruleis, frontis lateribus rubris, ano lunato.*
Stoll. Cicad. 1. tab. 1c. fig. D. 49.

14. C. elytris deflexis viridibus fulvo subfasciatis, alis al- *tomentosa*
bis: fasciis duabus atris.

15. C. fusca, abdomen virescente, ano lanato niueo. *barbata*.

16. C. atra, thorace maculis quatuor griseis, abdominis *atrata*.
margini flavo: punctis niueis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo C. lanatae. Caput nigrum anten-
nis sub oculis insertis testaceis. Thorax niger ma-
culis quatuor dorsalibus griseis. Elytra atra, imma-
culata. Alae nigrae macula magna ante apicem albo
hyalina. Abdomen nigrum margini flavo punctis
niueis. Segmentorum margines etiam flavi. Pedes
nigri genubus flavis.

17. C. capite thorace scutelloque nigro punctatis, elytris *ferrugi-*
nua, alis atris.

Habitat in Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

Media. Caput glaucum fascia ad basin rostri puncto
frontis et verticis atris. Thorax subcinereus puncto
antico duobusque posticis cum scutello communibus
atris. Scutellum concolor punctis duobus baseos
communibus solitarioque versus apicem atris. Alae
ferrugineae apice parum dilutiores. Corpus ut et
alae nigrum.

18. C. nigra, elytris apice cinereo hyalinis. *obtusa*.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino C. ferruginea. Caput obtusissimum
thoraxque nigra, immaculata. Elytra nigra apice
cinereo hyalina. Alae hyalinae. Corpus nigrum
abdomine subtus pallido ano nigro.

19. C. capite thoraceque rufis, elytris fuscis apice ci- *aurulenta*
nereis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput rufum
puncto verticali nigro. Thorax rufus fascia lata
fusca. Elytra complicata fusca apparent at expansa
rufa griseoque variegata, apice cinerea. Alae ob-
scureae. Abdomen rufum. Pedes fuscii.

20. C. capite thorace fusco aureis nigro variis, elytris *lycica*
hyalinis apice obscurioribus: macula aurea.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statu-

Statura praecedentium. Caput obscure aureum lineola media punctoque lateralii nigris. Thorax aureus lineola antica fascia media margineque postico nigra. Elytra hyalina nigro nervosa apice obscuriores macula magna aurea annulo atro cincta. Corpus fuscum femoribus posticis flauis.

- villosa.* 21. C. viridis, elytris deflexis exalbidis, ano lanato.
elongata. 22. C. thorace rubro flavo lineato, elytris longissimis nigro punctatis.
vittata. 23. C. flava vitta ferruginea longitudinali dupli repanda dentata.

lateralis. 24. C. nigra, clytris latere albis.

variegata 25. C. supra nigra, scutello elytrorum maculis duabus dorsalibus margineque exteriori flavescentibus.

fenestrata 26. C. supra nigra, capite scutelloque flauis, elytrorum marginem hyalino.

flavipes. 27. C. nigra, capite pedibusque flauis, elytris apice hyalinis nigro striatis.

Habitat in Insula Rotterdajn Mus. Dom. Banks.

Statura, magnitudo et summa affinitas C. fenestratae. Caput obtusum, flavidum, postice nigrum. Thorax et scutellum atra, immaculata. Elytra atra macula baseos ad marginem exteriorem hyalina apiceque hyalina nigro striata. Corpus nigrum pedibus omnibus flauis.

leuco- 28. C. nigra oculis albis.

phtalmia. 29. C. capite thoracisque basi flavescentibus.

leucoce- 30. C. elytris flauis: linea nigra dupli longitudinali in-
phala: terrupta.

inter- 31. C. pallida capite thoraceque nigro punctatis, elytris
rupta. lineatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. interruptae. Caput et thorax pallida punctis plurimis sparsis nigris. Elytra pallida lineis

lincis varie anastomosantibus nigris. Pedes pallidi
femoribus fascia nigra.

32. *C. flauescens*, elytris cinereis: vitta abbreviata atra. *abbreviata.*
Habitat Hafniae Dom. Lund.

Statura praecedentium. Caput et thorax flauescens,
immaculata. Elytra cinerea vitta fere marginali a basi
ultra medium ducta margineque anguli ani atris.
Abdomen pectusque disco atro. Pedes flauescentes.

33. *C. nigra* capitis margine postico thoraceque flauis. *flauicollis*

34. *C. elytris viridibus* capite flavo: punctis nigris. *viridis.*
Variat rarius elytris coerulecentibus.

34. *C. supra nigra nitida*: punctis coerulecentibus. *laeta.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Minor *C. viridi*. Caput et thorax subtus flauescens,
supra nigra macula magna utrinque bifida, coerule-
scens. Elytra nigra nitida punctis tribus coerule-
centibus et postico marginali antice coccineo postice
flauescens. Abdomen et pedes flauescens anno
coccineo.

36. *C. elytris rufescens*: maculis duabus viridibus *4 guttata*
apice hyalinis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Caput rufum punctis quatuor paruis nigris.
Thorax virescens margine antico rufo. Elytra lae-
via nitida rufescens maculis quatuor magnis qua-
dratis viridibus apice hyalinis. Abdomen supra ru-
fum. Subtus vti et pedes flauescens.

37. *C. nigra*, capitis thoracis elytrorumque margine coc- *margi-*
cineis. *nella.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput nigrum margine coccineo. Thorax ni-
ger margine coccineo. Elytra nigra nitidula margi-
ne exteriori laete coccineo. Corpus nigrum tibiis
pallescens.

38. *C. viridis*, capite thoraceque carneis. *Laniota.*

39. *C. nigra* capite fasciis duabus flauis, elytris albo striatis. *striata;* *coccyg.*
Habitat in Kiliae plantis.

Statura *C. viridis*. Caput subtus flauum supra nigrum
fasciis duabus flauis, altera ante apicem, altera ba-
ses

seos. Elytra nigra striis plurimis albis. Corpus nigrum. Pedes flavescentes.

ignita. 40. C. virescenti nitidula, capite scutello abdomineque fuluis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parua. Caput fuluum punctis quatuor nigris. Thorax viridi nitidulus utrinque parum flavescentis puncto nigro. Scutellum fuluum. Elytra viridi nitidula, immaculata. Corpus virescens abdome fulvo.

turca. 41. C. atra, abdome flavo, alis apice fuscis: lunula hyalina.

maura. 42. C. nigra, pectore abdomeque sanguineis.

nebulosa. 43. C. nigra, elytris hyalinis basi fuscis.

hyalina. 44. C. fusca, elytris fascia abbreviata marginaque postero hyalinis.

pellucida. 45. C. grisea, elytris fascia media hyalina.

Cynosba- 46. C. fusca, alis albo hyalinis: margine fusco punctato-
tis.

Serratu- 47. C. flava, elytris albis: puncto fasciisque duabus nigris.
lae.

neruosa. 48. C. alis fuscis: nervis albo nigroque punctatis.

variegata. 49. C. atra viridi variegata, alis hyalinis: punctis tribus costalibus nigris.

lyncea. 50. C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocellis tribus nigris, elytris hyalinis: margine flavescente.

fulgida. 51. C. flava, elytris fusco auratis.

punctata. 52. C. elytris flavescentibus fusco punctatis.

Rosae. 53. C. flava alis albis apice fusco striatis.

maculata. 54. C. grisea, elytris punctis apiceque fuscis, alis albis apice fuscis.

Habitat in Europâ.

Statûra et magnitudo C. Rosae. Caput et thorax grisea inmaculata. Elytra grisea fusco maculata apice que

que fusca neruis albo nigroque punctatis. Alae albae immaculatae apice fulcescentes. Abdomen atrum corniculo parvo infexo, caudaque bifida sub ano inserta. Pedes flavi.

55. C. flava, elytris fuluo pictis: maculis quatuor nigris aurata, posticeque auratis.

56. C. alis viridi luteis, apicibus nigricantibus inauratis. Vlmi.

57. C. elytris pallide auratis albo nigroque punctatis. nitidula.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parua. Rostrum nigrum lineola media flavescente. Caput flauum punctis quatuor atris in medio. Thorax antice flavesiens, postice fuscescens. Scutellum flauum. Elytra pallide aurea punctis aliquot albis nigrisque imprimis ad margines.

58. C. grisea, capite depresso piano apice fuso. cuspidata

59. C. flavesiens elytris sanguineo apice fuso maculatis. Quercus.

163. CERCOPIS. Os labio abbreviato, truncato, emarginato.

Antennae filiformes sub oculis insertae.

1. C. elytris fusco griseis: macula marginali fulua cinerea. grossa.

Lc.

2. C. atra, elytris vtrinque vitta marginali sanguinea. marginata.

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Hunter.

Magna. Caput atrum macula frontali sanguinea. Thorax ater linea media margineque sanguineis. Scutellum triangulum, acutum, atrum linea media sanguinea. Elytra laevia atra vitta ad marginem exteriorem et interiorem sanguineis, quae antice coeunt. Abdomen atrum ano sanguineo. Pedes rubri geniculis nigris.

3. C. thorace atro: fascia fulua, elytris fuluis: maculis marginatis apiceque nigris.

ca.

- sanguino-* 4. *C. atra*, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis.
lenta.
- Schach.* 5. *C. nigra*, elytris fuscis: fascia interrupta sanguinea.
Habitat in America septentrionali Mus. Dr. Hunter.
Statura praecedentis. Caput et thorax nigra, immaculata. Scutellum nigrum in margine sanguineo. Elytra fusca puncto baseos fasciaque postica in medio interrupta sanguineis. Alae hyalinae. Corpus nigrum abdominis basi sanguineo. Pedes nigri.
- cruentata* 6. *C. rufa*, elytris nigris: fasciis duabus flauis.
ta. Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 10. C.
- carnifex.* 7. *C. sanguinea*, thorace macula, elytris fasciis duabus nigris.
- varia.* 8. *C. capite thoraceque virescentibus*, elytris fuscis: maculis duabus baseos strigaque postica flauis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Caput et thorax obscure viridia, immaculata. Elytra fusca maculis duabus oblongis baseos strigaque postica flauis. Corpus atrum ab domine rufo marginne atro.
- afasciata* 9. *C. flava* fasciis quatuor fuscis.
ta.
- spumaria.* 10. *C. fusca*, elytris maculis binis lateribus albis.
- aurata.* 11. *C. cinereo aurea* nitida immaculata.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Corpus medium totum pallide aureum, nitidum.
- margi-*
nata. 12. *C. nigra*, capite thorace elytrorumque margine albis.
Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.
Statura praecedentium. Caput et thorax albida punctis duobus thoracis paruis ferrugineis. Elytra nigra margine late albido. Abdomen nigrum margine albo. Pedes nigri albo maculati.
- lineata.* 13. *C. flavescentis*: coleoptris, striis tribus nigris.
- coleoptra-*
ta. 14. *C. elytris totis coriaceis alas obtegentibus* griseis fuscis irroratis. Sp. 9.

15. C. grisea immaculata, alis albis. *rufica.* ✓
16. C. nigra elytris albo maculatis. *gibba.*
17. C. nigra flavo maculata, elytris fuscis: puncto marginali albo. *biguttata* ✓
- Cicada biguttata* Sp. Inf. 325. 22.
18. C. flauescens, elytris obscuris: fascia maculisque duabus oppositis albidis. *fasciata.* ✓
- Habitat Kiliae Dom. Daldorf. *Sci. variegata* je Th.
Statura et magnitudo praecedentis. Caput, thorax, scutellum, pedes flauescens. Abdomen atrum. Elytra obscura fascia media maculisque duabus pone fasciam marginalibus oppositis flavis. Alae hyalinae.
19. C. cinerea, elytris fascia obliqua fusca. *unifasciata.*
20. C. flauescens: elytris fuscis: fasciis duabus albis. *bifasciata* ✓
21. C. nebulosa, vertice punctis duobus ab domine que *Populi* basi atris.

164. NOTONECTA. Os rostro arcuato.

Labium conicum, elongatum, subulatum.
Antennae sub oculis insertae.

1. N. elytris griseis: margine fusco punctato apice bifidis. *glauca.*
Stoll. Cimic. 2. tab. 12. fig. IX. X.
2. N. grisea postice nigra, scutello atro; vtrinque puncto baseos atro. *americana.*
3. N. elytris albis immaculatis apice rotundatis. *nigra.*
4. N. grisea, capite fusco, elytris truncatis. *minutissima.*

165. SIGARA. Os rostro breuissimo.

Vagina conica transuersim
striata lateribus spinosa.

Antennae breuissimae.

lineata.

1. S. elytris fuscis: lineis duabus abbreviatis flauis.

Habitat Cajenae Dom. v. Rohr.

Statura S. striatae at paullo maior. Caput flauum oculis nigris. Thorax fuscus margine antico, lateribus lineaque dorsali flauis. In margine antico maculae duae et inter has puncta duo fuscæ. Scutellum fuscum apice flauum. Elytra nitida; fuscæ lineis duabus flauis, altera a margine exteriori baseos ad medium marginis interioris ducta, altera marginalis a basi ad medium. Apex elytrorum albo hyalinus. Corpus flauum tibiis anticis geniculisque reliquorum pedum nigris.

striata.

2. S. elytris pallidis: lineolis transuersis undulatis numerosissimis fuscis. Stoll. Cimic. 2. tab. 15. fig. XIII. B.

coleoptra. 3. S. elytris totis coriaceis fuscis: margine exteriori flauota.

166. NEPA. Os rostro arcuato.

Labium nullum.

Antennæ palmato diuise sub oculis insertæ.

grandis. 1. N. fusca flauo maculata.

Stoll Cimic. 2. tab. 7. fig. IV.

Inuenitur etiam caudata setis duabus pilosis, compressis, brevibus.

annulata. 2. N. ecaudata subrotunda pallide fuscæ, tibiis anticis pallidis fuscæ annulatis.

rufistica. 3. N. ecaudata fusca, thoracis elytrorumque margine antico albido.

Nepa plana Sulz. Hist. Inf. tab. 10. fig. 2.

Stoll. Cimic. 2. tab. 7. fig. VI.

4. N. cauda bifeta, scutello rugoso, alis niueis. *fusca.*
 Stoll. Cimic. 2. tab. I. fig. I.
 Habitat in Indiae orientalis aquis.
 Cauda longitudine corporis.
5. N. cauda bifeta corpore ouato, cauda longitudine cor- *grossa.*
 poris.
 Habitat in China Dom. Lund.
 Differt a sequentibus maior. Corpus totum cinereum
 abdomine solo supra rubro in medio nigro ano ci-
 nereo. Cauda bifeta villosa longitudine corporis.
6. N. cauda bifeta, corpore ouato, cauda corpore longiore. *rubra.*
Nepa rubra fusca abdomine supra alarumque neruis
 rubris. Linn. Syfl. Nat. 2. 713. 2. Mus. Lud. Vlr. 165.
Scorpio aquaticus Stoll. Cimic. 2. tab. 7. fig. V.
 Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
 Statura omnino N. cinereae at duplo maior. Corpus
 depresso, planum, cinere fuscum, thorace in-
 aequali. Abdomen supra rufum linea dorsali nigra,
 Cauda corpore longiore.
7. N. cauda bifeta corpore dimidio breuiore, corpore *cinerea.*
 ouato. Stoll. Cimic. tab. I. fig. II. a.
8. N. cauda bifeta nigra, thorace scutelloque ferrugineo *maculata.*
 maculatis.
9. N. cauda bifeta, corpore linearie. *linearis.* *linearis.*
 Habitat et in Indiae orientalis aquis.

167. NAVCORIS. Os rostro subinflexo.

Setae tres inaequales.*Labium* porrectum, rotun-
datum.*Antennae* breuissimae sub
oculis insertae.

1. N. abdominalis margine serrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 12. *cimicoi-*
des.
 fig. VIII. C. B.

2. N. abdominalis margine integro. *nepaefor-*
mis.

168. ACANTHIA. *Rostrum* sub capitis apice insertum.*Labium* nullum.*Antennae* ante oculos insertae.*tellularia*. 1. A. aptera. Stoll. Cimic. 2. tab. 19. fig. 131.*Zosteræ*. 2. A. nigra, elytris coriaceis abdomine longioribus apice hyalino striatis.*atra*. 3. A. atra nitida elytris apice pallescentibus.
Habitat Kiliae.

Duplo minor A. Zosteræ. Corpus totum atrum nitidulum oculis valde prominulis. Elytra coriacea apice pallida.

coriacea. 4. A. aptera, elytris coriaceis nigro griseis.*clavipes*. 5. A. aptera nigra, pedibus piceis: femoribus anticis incrassatis dentatis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Magnitudo A. Zosteræ tota nigra, obscura, minime nitens. Pedes omnes picei femoribus anticis incrassatis dentatis.

pedestris. 6. A. aptera, elytris coriaceis connatis abbreviatis cinereis, ano setoso.*clavicornis*. 7. A. elytris reticulato punctatis, antennis clauatis.*Lavateræ*. 8. A. nigra elytris abdōmineque basi rufis.

Habitat in Barbariae Lavateris Dom. Vahl.

Parua in hoc genere. Caput, thorax, scutellum, antennae, pedes nigra, obscura, immaculata. Elytra rufa apice littura nigra. Alae albae, immaculatae. Abdomen nigrum primo segmento subtus rufo.

Serratus. 9. A. nigra; elytris pallescentibus, alis apice fuscis.*fasciata*. 10. A. atra, elytris pallescentibus: fasciis duabus abbreviatis nigris.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parua.

Parua. Corpus totum atrum, nitidum. Antennarum articuli duo priores ferruginei apice nigri ultimo nigro toto. Thorax sulco transuerso impressus. Elytra palefcentia fasciis duabus altera in medio, altera ad apicem nigris suturam tamen haud attingentibus. Pedes flauescentes femoribus posticis annulo nigro.

11. A. fusca, thorace albo tr̄imaculato, abdomine subtus maculata albo : margine nigro punctato.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

- Parua.** Caput rotundatum, fuscum. Thorax fuscus maculis tribus magnis albis lateralibus marginalibus. Scutellum et elytra fusca, immaculata. Alae albidae. Abdomen subtus album margine nigro variegato. Pedes albidi.

12. A. elytris sordidis albo punctatis, corpore nigro. littoralis.

13. A. elytris pallidis, corpore oblongo, femoribus anticis crassissimis.

14. A. thorace lunato: margine prominente, abdomine lunata. ferrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 13. fig. 84.

15. A. membranacea, abdominis margine imbricatum se- corticalis; eto, corpore nigro.

16. A. membranacea thorace abdomineque lobatis ciliato para- spinosis. Sp. In. App. 510. doxa.

17. A. nigra, abdomine laeui brunneo, alis pallidis. laeuis.

18. A. membranacea, thorace denticulato, capite spino. Betulae; fo, elytris antice dilatatis.

19. A. ahdomine marginato fuso apice flauescente, tibiis crassipes. anticis incrassatis.

20. A. membranacea, abdome flavo: fascia nigra, the- crosa. racis margine sinuato, tibiis anticis incrassatis.

21. A. ferruginea, thorace marginato: margine antice umbracu- scutelloque albis. lata.

22. A. thoracis margine ferrato, corpore griseo, alis serrata. albis fuso maculatis.

23. A. atra, elytris albis: arcu apicis nigro. sylvestris.

Cimex sylvestris oblongus niger alis elytrisque albo fu- scoque variis, pedibus rufis. Linn. Syst. Nat. 2. 731. III. En. Su. 965.

Habitat in Europae syluis.

Parua. Antennae ferrugineae articulorum apicibus nigris. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra alba apice nigra macula magna flava. Margo interior flavescentia macula nigra. Alae albidae macula apicis nigra. Pedes ferruginei. Corpus atrum.

Cardui. 24. A. scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris.

Pyri. 25. A. thorace trialato, scutello foliato, elytris reticulatis basi gibbis.

rhombea. 26. A. thorace acutangulo, abdomine dilatato rhombeo postice sexdentato.

169. CIMEX. *Labium elongatum, subulatum, annulatum.*

Antennae filiformes ante oculos insertae.

* *Scutellati scutello longitudine abdominalis.*

Stockerus 1. C. scutellaris ovatus, corpore viridi: maculis nigris, abdomine ferrugineo.

Stoll. Cimic. 2. tab. 3. fig. C.

nobilis. 2. C. scutellaris oblongus coeruleo auratus nigro maculatus. Stoll. Cimic. I. tab. I. fig. I.

regalis. 3. C. scutellaris, thorace scutelloque aureis, thorace punctis duobus, scutello maculis duabus coerulescentibus.

imperialis 4. C. scutellaris thorace scutelloque rufis, abdomine cyno: neo: margine sanguineo:

Nigellae. 5. C. scutellaris niger obscurus thorace antice abdominalis margine pedibusque albis.

Cimex rusticus scutellaris niger obscurus, abdominalis margine ferrugineo, pedibus albis. Sp. Inf. 2. 339. 5. Habitat in Barbariae Nigella Dom. Vahl.

Elytra interse fanguinea.

Cerinthe. 6. C. scutellaris niger obscurus immaculatus.

Habitat in Africæ Nigella sativa. Dom. Vahl.

Statura et magnitudo C. Nigellæ, at totus ater obscurus, immaculatus.

7. C. scutellaris virescens: maculis annularibus nigris. *annulus.*
Cimex Argus Drury, Ins. 3. tab. 46. fig. 9.
8. C. scutellaris supra testaceus, thorace punctis duobus, 6 puncta-
 scutello quatuor cyaneo nigris. *tus.*
9. C. scutellaris supra rufus: maculis difformibus nigris. *Druraei.*
10. C. scutellaris subpurpurascens fuluo punctatus. *Fabricii.*
11. C. scutellaris niger punctis ocellaribus fuluis numero- *Argus.*
 rosis.
Cimex Argus Stoll. Cimic. 2. tab. 7. fig. 50.
 Habitat Surinam.
- Statura et magnitudo omnino C. Fabricii. Corpus sub-
 tus flatum nigro variegatum supra nigrum maculis
 plurimis fuluis annulo flavo cinctis.
12. C. scutellaris atro aeneus, scutello vtrinque macula *Schulzii.*
 baseos coccineo.
13. C. scutellaris cyaneus, scutello abdomineque rufis *paganus.*
 cyaneo maculatis.
14. C. scutellaris glaucus, thorace scutelloque punctis *illustris.*
 duobus fuscois. Stoll. Cimic. tab. 24. fig. 156.
15. C. scutellaris supra cyaneus, capite thoraceque linea *lineola.*
 dorsali, scutello punctis duobus rubris.
16. C. scutellaris niger: lineis tribus flauescientibus. *trilinea-*
tus.
17. C. scutellaris ruber, thorace lineis quinque, scutello *nigroli-*
 tribus nigris, abdomine flavo: punctis nigris. Stoll. *neatus.*
 Cicad. 2. tab. 11. fig. 9.
18. C. scutellaris supra rufus, thorace punctis decem, seu *semi-pun-*
 tello lineis quatuor nigris. Stoll. Cimic. 2. tab. 11. fig. 8. *ctatus.*
19. C. scutellaris cyaneus, scutello basi apiceque flave- *anchora-*
 scientibus, abdominis margine flavo nigro punctato. *go.*
20. C. scutellaris, corpore flauescente, supra lituris lon- *grammi-*
 gitudinalibus nigris. *cus.*
21. C. scutellaris rufus: atomis numerosissimis albis. *pedemon-*
 S 5 *tanus.*
22. C. tanus.

softatus. 22. C. scutellaris griseus, alarum costa basi pedibusque rufis.

Habitat in Insula Rotterdam. Mus. Dom. Banks.

Statura et summa affinitas C. maura. Antennae cinereae. Caput griseum margine flavescente. Thorax griseus vel potius flavescentis atomis numerosissimis rubris irroratus margine immaculatus. Scutellum longitudine corporis, subcarinatum, griseum macula una altera obsoleta fusca. Alae basi flavescentes costa ferruginea, qui color terminatus puncto nigro, apice exalbidae. Pectus canaliculatum ad receptionem rostri. Pedes rufescentes.

maurus. 23. C. scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis.

hotten- 24. C. scutellaris ferrugineus immaculatus.

totia. 25. C. scutellaris griseus albo striatus.

aboli- 26. C. scutellaris fuscus, capite thoracisque antico ferru-
neatus. gineis, subtus albo fuscoque varius.

rufisticus. Habitat Tranquebariae.

Medius. Antennae ferrugineae apice fuscae. Caput ferrugineum linea media fusca. Thorax fuscus margine antico ferrugineo. Scutellum fuscum, immaculatum. Corpus subtus fusco alboque varium. Pedes testacei.

irroratus 27. C. scutellaris virescens fusco irroratus.

lanatus. 28. C. scutellaris aeneo niger griseo hirtus. Stoll. Cimic.
2. tab. 9. fig. 61.

scara- 29. C. scutellaris, corpore toto aeneo.

baooides.

pallipes. 30. C. scutellaris nigro aeneus, scutelli abdominisque margine pedibusque pallidis.

Cimex acaroides scutellatus ater, thorace scutello ab-
domineque albo marginatis. Thunb. nou. sp. 2. 29.

flavipes. 31. C. scutellaris nigro aeneus: margine omni pedibus-
que flavis.

32. *C. scutellaris ater nitidus, capite lituris duabus, thorace scutellique margine pedibusque flavis.* *Vahlii.*
Habitat in India orientali Dom. Vahl.
Medius. Capitum atrum lituris duabus magnis flavescentibus. Thorax gibbus, ater, nitidus margine linearaque obliqua ante marginem flavescentibus. Scutellum atrum nitidum margine flavescente. Abdomen atrium, singulo segmento vtrinque lineis duabus apice coeuntibus flavis. Pedes flavi.
33. *C. scutellaris, scutello fuliginoso: lituris quinque nigris, postica alba.* *fus.*
34. *C. scutellaris niger, scutello lineolis duabus baseos litura punctoque apicis albis.*
35. *C. scutellaris obscurus, scutello scabro ante apicem tuberculato.* *tuberculatus.*
36. *C. scutellaris ater, scutello basi pedibusque griseis.* *inunctus.*
37. *C. scutellaris, thorace spinoso, corpore ouato livido, ano bidentato.* *Arabs.*
38. *C. scutellaris, thorace subangulato, corpore supra solidus viridi, subtus flavo, ano bidentato.*
- ** *Spinosi, thorace vtrinque spina armato.*
39. *C. thorace spinoso griseus, thoracis spinis porrectis taurus: compressis truncatis.*
40. *C. thorace spinoso viridis, clytris fusca: margine cernuus: albo, thoracis spinis obtusis subbifidis.*
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*
Magnus. Caput viride antennis ferrugineis articulo ultimo flavo. Thorax viridis spinis duabus elongatis rotundatis nigris apice obtusis, subbifidis. Scutellum viride. Elytra obscure rufa vel fusca margine exteriori albo. Subtus virescens pedibus ferrugineis.
41. *C. thorace acute spinoso griseus, antennis rufis.* *bidens.* ✓
42. *C. thorace obtuse spinoso fusca, scutello apice albidio, abdominis margine maculato, pedibus rufis.* *sanguinipes.*
43. *C. thorace obtuse spinoso griseus, pedibus rufis.* *rufipes.* ✓
44. *C. thorace obtuse spinoso subvirescente, clytris griseis: macula fusca, clypeo emarginato.* *luridus.* ✓

- nigricornis.* 45. C. thorace obtuse spinoso subferrugineus, spinis antennisque nigris.
- nigrifrons.* 46. C. thorace obtuse spinoso supra griseus, capite spinisque nigris, antennis annulo albo.
Habitat in China Dr. Pflug.
- Statura et magnitudo praecedentis. Caput nigrum ely-
peo emarginato. Thorax griseus spina vtrinque ob-
tusa nigra. Scutellum griseum fascia in medio inter-
rupta obsoleta fusca. Elytra grisea. Alae albae ma-
culula fusca. Antennae nigrae annulo ante apicem al-
bo. Corpus subtus flauescens pedibus griseis.*
- ittericus.* 47. C. thorace spinoso oblongus supra rufescens subtus flauus.
- punctatus* 48. C. thorace subspinoso fuscus, abdominis margine va-
riegato, tibiis annulo albo.
- varius.* 49. C. thorace obtuse spinoso supra rufus subtus flau-
escens, scutello nigro basi apiceque albo.
Habitat in Hispania Dom. Vahl.
- Statura et magnitudo C. albipes. Antennae nigrae. Ca-
put nigrum lineis duabus rubris anticè coeuntibus.
Thorax rufus margine lineolisque duabus abbrevia-
tis anticis nigris. Scutellum nigrum basi album ma-
culis duabus paruis bascos maiori que apicis nigris.
Apex albus. Elytra rufa, immaculata. Abdominis
margo nigro rufoque maculatus. Corpus subtus fla-
uescens abdomine lineis tribus punctorum fuscorum.
Pedes rufi.*
- albipes.* 50. C. thorace subspinoso supra nigricans, thoracis mar-
gine scutellique apice albis.
- dentatus.* 51. C. thorace acute spinoso ferrulato, corpore cinereo
nigroque vario.
- florida-* 52. C. thorace spinoso niger rubro varius, scutello ma-
nus. culis tribus rubris.
- armatus.* 53. C. thorace acute spinoso, scutello nigro: punctis duo-
bus apiceque testaceis, antennis pedibusque rubris.
- haemor-
rhous.* 54. C. thorace spinoso niger, abdomine rufo, elytris
punctis linearibus quinque nigris.
- 2 pustu-
latus.* 55. C. thorace spinoso niger, elytris liuidis, capite pun-
ctis duobus coccineis.

56. C. thorace spinoso niger, scutello lunula apiceque *punicus.*
rubris.
57. C. thorace spinoso liuidus, scutello Y flano inscripto. *Epsilon.*
58. C. thorace spinoso viridis: fascia flavicante, capite *clypeatus.*
clypeato.
59. C. thorace dentato spinoso supra viridis, capite tho- *albicollis.*
racisque antico scutellique basi flavis.
60. C. thorace obtuse spinoso subvirescens, antennis ni- *haemor-*
gris, sterno porrecto. *rroidalis.*
61. C. thorace acute spinoso fuscus, scutello apice elytris *spinidens.*
marginis albis.

Habitat: Tranquebariae Dom, Hybner.

Magnus fuscus. Spinae thoracis magnae acutae in me-
dio postico dente parvo auctae. Scutelli apex uti
margo elytrorum albūs. Subtus pallidior. Pedes
pallidi.

62. C. thorace spinoso griseus, scutello punctis duobus *oculatus.*
flavis, tarsis anticis apice compresso membranaceis.
63. C. thorace spinoso griseus, tibiis albo annulatis. *annulatus*
64. C. thorace crenato obtuse spinoso scutelloque pun- *& puflula-*
ctis duobus rufis. *tus.*
65. C. thorace obtuse spinoso virescens, thorace maculis *macula-*
quatuor, scutello elytrisque apice fuscis. *tus.*
66. C. oblongus, thorace acute spinoso virescens, anten- *pugnax.*
nis rufis.
67. C. thorace acute spinoso virescens, abdomine lineis *emeritus.*
duabus albis.
68. C. thorace aente spinoso scutelloque flavescentibus ni- *gladiator*
gro punctatis, elytris punctis albis scabris.
- Stoll. Ciminic. 2. tab. 2. fig. 12.
69. C. thorace acute spinoso ferrato fuscus, clypeo acu- *furcatus.*
minato bifido.
70. C. thorace aente spinoso fuscus: margine flavo, sub- *pugilla-*
tus folius nigro punctatus. *tor.*
71. C. thorace acute spinoso fuscus, scutello apice rufo, *vittor.*
pedibus pallidis nigro punctatis.

ciliatus. 72. C. thorace ciliato obtuse spinoso nigro: margine fasciaque postica flauis, femoribus posticis serratis.

bellator. 73. C. thorace spinoso supra fuscus subtus flauescens, antennis atris albo annulatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Medius. Antennarum primus articulus albus nigro varius, reliqui atri, albo annulati. Caput, thorax, elytra alae fusca, immaculata. Scutellum fuscum apice atrum. Abdomen supra fuluum margine fusco albo maculato. Corpus et pedes flauescentia.

armiger. 74. C. thorace acute spinoso griseus, scutello punctis duobus, antennis pedibusque pallidis.

scorbuticus. 75. C. thorace obtuse spinoso fuscus, pedibus pallidis nigro punctatis.

delirator. 76. C. thorace acute spinoso flauescens nigro punctatus, thorace postice elytrisque fuscis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus. Antennae fuscae articulorum apicibus flauis. Caput flauescens stemmatibus duobus. Thorax ante flauis punctis tribus nigris, in medio flauis atomis innumeris fuscis, impretilis, postice acute spinosus, ferrulatus fuscus. Scutellum, elytra, alaeque fusca, immaculata. Corpus flauescens lineis quatuor punctorum nigrorum, anno tamen immaculato. Pedes flavi nigro punctati.

melacanthus. 77. C. thorace acute spinoso obscure ferrugineus: spinis atris, abdome atro vittis flauescentibus.

aggressor. 78. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, corpore flauescente: spinis subconcoloribus.

vittatus. 79. C. thorace subspinoso virescens, elytris vitta submarginali flava.

hamatus. 80. C. thorace acute spinoso viridis, abdome ferrato: denticulis nigris.

Habitat in India orientali Dom. Slanbusch.

Magnus. Antennae nigrae. Rostrum longitudine corporis. Corpus virescens capite thoracisque antico magis flauescentibus. Thorax acute spinosus spina retrorsum subarcuata, nigra. Sternum porrectum, compressum, obtusum. Abdomen flauescens vtrinque

que linea punctorum nigrorum. Margo abdominis denticulis quinque acutis nigris serratus. Pedes flavescentes.

81. C. thorace acute spinoso, ano quadridentato, cor- defensor: pore viridi: spinis nigris. *Goreus*
82. C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acu- margi- to, antennis rufis. Stoll. Cimic. 2. tab. 5. fig. 37. *natus*. *Goreus*
83. C. thorace obtuse spinoso dentatoque, capite quadri- spiniger. *Goreus*
84. C. thorace acute spinoso oblongus supra fuscus subtus pugnator. *Goreus*
flaescens, antennis rufis apice nigris.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Statura et magnitudo praecedentis. Antennae rufae apice clavatae nigrae. Corpus supra obscurum, subtus flaescens, immaculatum. Thorax acute spinosus.
85. C. thorace subspinoso cinereus, alis fuscis, pedibus fascicu- latus. *Goreus*
86. C. thorace acute spinoso supra rufus, subtus fla- insidiator. *Goreus*
vescens.
- Habitat in Barbaria Dom. Vahl.
- Maior C. quadrato. Caput, antennae, thorax, scutellum, elytra rufa, immaculata. Alae albidae. Thorax postice spina acuta, valida. Corpus subtus vti et pedes flaescentes.
87. C. thorace obtuse spinoso, supra fuscus, subtus fla- quadra- uescens, abdomine quadrato. Stoll. Cimic. 2. tab. 5. fig. 36. *Goreus*
88. C. thorace acute spinoso dentatoque, elytris obscuris hastatus. *Goreus*
striga postica alba.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Statura C. quadrati at minor. Corpus supra obscurum fascia elytrorum postica alba, fuscus magis pallidum. Thorax non solum acute spinosus, sed denticulis plurimis acutis armatus.
89. C. thorace acute spinoso bipunctato, elytris punto velox- baseos strigaque fluis.
90. C. thorace subspinoso, elytris fuscis albo reticulatis, Merianae abdōminis basi spinoso. *Goreus*

- valgus.* 91. *C. thorace spinoso ferratoque, femoribus posticis incuruis tibiisque posticis vnidentatis.*
Variat abdominis basi inermi et quadridentato.
Plures huius sunt aut species aut varietates.
- tragus.* 92. *C. thorace spinis compresso lunatis ferratis, tibiis posticis membranaceo ferratis.*
Habitat in China Dr. Pflug.
Statura et magnitudo C. valgi. Antennae mihi desunt.
Caput paruum, carinatum. Thorax pallide fuscus punctis eleuatis obscurioribus, scaber, margine utrinque dilatato, lunato, compresso, obtuso utrinque serrato pallidiore. Elytra pallide fusca puncto paruo medio obscuriore. Alae fuscae. Pedes fuscii femoribus posticis incrassatis, dentatis tibiisque incuruis intus membranaceis, dentatis.
- tenebro-*
fus. 93. *C. thorace serrulato, femoribus posticis incuruis clavatis, abdome basi trispinoso.*
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.
Statura et magnitudo C. valgi. Corpus fuscum. Thoracis margo subserratus. Abdomen basi spinis tribus intermedia crassiori, obtusiori, lateralibus acuris. Femora postica magna, incurua, clavata. Tibiae intus ferrulatae, vnidentatae.
- fuluicor-*
nis. 94. *C. thorace spinoso serrato fuscus, femoribus bidentatis, posticis multidentatis.*
Habitat in India orientali.
Magnus. Corpus fuscum obscurum antennis pedibusque ferrugineis. Thorax serratus acuteque spinosus. Femora quatuor antica bidentata, postica multidentata.
- femora-*
tus. 95. *C. thorace serrulato, femoribus posticis incuruis dentatis tibiisque posticis compressis.*
- curuipes.* 96. *C. thorace acute spinoso, femoribus omnibus apice bidentatis, posticis incuruis.*
- clauipes.* 97. *C. thorace ferrato obscurus, femoribus multo spinosis: posticis incrassatis.*
Habitat in China Dom. Lund.
Triplo minor praecedentibus. Caput et thorax fusca tuberculis aliquot eleuatis, obtusis. Thoracis margo acute ferratus. Elytra scabra, obscura macula versus

sus apicem pallida. Femora multidentata, postica incrassata. Tibiae compressae apice serratae dente primo maiori.

98. C. thorace acute spinoso nigro: fascia flava, tibiis posticis membranaceis dentatis. *membranae*
99. C. thorace spinoso immaculato nigricans, elytris fascia albicante, tibiis posticis membranaceis dentatis. *phyllopus*
Stoll. Cimic. 2. tab. 8. fig. 54.
100. C. thorace subspinoso nigro: maculis duabus fuluis, *aenius*, elytris fascia flava, tibiis posticis membranaceis dentatis.
101. C. thorace subspinoso: fascia alba, elytris fuscis: *gonagra*, puncto cinereo.
102. C. thorace subspinoso oblongus rufus: fascia albida *Kermesina*, nigro punctata, femoribus posticis multidentatis. *nus*.
103. C. thorace subspinoso oblongus niger, thorace fascia *australis*, antica rubra, tibiis posticis basi membranaceis.
104. C. thorace acute spinoso oblongus supra niger, thorace lineis, elytris cruce ferrugineis.
105. C. thorace acute spinoso oblongus rufus, elytris nigri, *sandius*, grisea: cruce ferruginea.
106. C. thorace spinoso viridis, capite fascia elytrorum *lactius*, abdominisque femoribusque flavis, elytris atris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnus oblongus. Caput laete flavum antennis nigris. Thorax spinosus, scaber, obscure viridis, immaculatus. Elytra atra fascia lata flava. Alae atrae. Corpus subitus viride nitens fascia abdominis lata flava. Pedes nigri femoribus flavis.

107. C. thorace spinoso niger, thorace arcu antico, elytris fascia corpore maculis albis. *lynatus*.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis. Caput fuscum linea utrinque sub oculis alba. Thorax spinosus, fuscus arcu magno antico albo. Elytra nigra fascia media alba. Scutellum et alae nigra, immaculata. Corpus fuscum maculis plurimis albis. Pedes fuscii.

clatus.

108. *C. thorace acute spinoso viridi: margine ferrugineo, elytris striatis viridibus corpore ferrugineo.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Præcedentibus minor. Antennæ nigrae annulo magno albo. Caput ferrugineum supra nigro varium basi viride. Thorax acute spinosus, viridis margine antico et laterali ferrugineis. Elytra sericea, striata, viridia. Alae fuscae. Corpus ferrugineum pectori vtrinque viridi maculato. Pedes ferruginei femoribus posticis annulo genubusque nigris.

- balteatus.* 109. *C. thorace subspinoso oblongus ferrugineus, elytris linea transuersa flava, femoribus posticis multidentatis.*

- sinuatus.* 110. *C. thorace acute spinoso liuidus, tibiis posticis compressis sinuatis nigris.*

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino *C. ferripes* at maior. Antennæ fuscae articulo ultimo pallescente. Caput liuidum. Thorax acutissime spinosus, liuidus. Elytra liuida. Corpus liuidum abdominis marginé spinis elongatis arcuatis ciliato. Pedes liuidi femoribus posticis elongatis spinis duabus atris. Tibiae compressæ in medio sinuatae nigrae. Tarsi liuidi.

- ferripes.* 111. *C. thorace acute spinoso oblongus rufus, femoribus posticis dentatis.*

- dentipes.* 112. *C. thorace spinoso elongatus, femoribus posticis elongatis serratis, corpore fuscō subtus lateribus albīs.*

Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.

Statura omnino et somma affinitas *C. linearis*. Differt tamen lateribus pectoris et abdominis late albīs.

- linearis.* 113. *C. thorace acute spinoso elongatus fuscus, femoribus posticis elongatis denticulatis.*

- crenulatus.* 114. *C. thorace dentato rufo: macula nigra, femoribus posticis dentatis, corpore atro.*

- spinofus.* 115. *C. elongatus ruber, thorace quadrispinoso.*

*** *Ovati, thorace mutico.*

- aurantius* 116. *C. ovatus aurantius, capite thoracis marginé antico abdominis maculis marginalibus pedibusque atris.*

Cimex aurantius Sulz. Hist. Inf. tab. 10. fig. 10.

Stoll,

Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 39.

Habitat in Iaua.

Magnus. Caput cum antennis atrum. Thorax aurantius margine antico atro. Scutellum aurantium, im- maculatum. Elytra aurantia macula media fusca. Alae fuscae. Abdominis margo aurantio nigroque variis. Pedes atri.

117. C. ouatus supra nigricans, thorace postice aurantio, punctatum. elytris albis: punto nigro.

Cimex nigripes Sulz. Hist. Inf. tab. 10. fig. 9.

Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 40.

Habitat in Iaua.

Magnus. Thorax aurantius margine antico nigro. Scutellum apice rufescens. Elytra albida punto medio magno nigro.

118. C. ouatus supra sanguineus, scutello maculis duabus, nigripes: elytris vnico nigris.

Stoll. Cimic. 2. tab. 2. fig. 10.

119. C. ouatus viridis, capite thoraceque antice flave- *torquatus* ✓ scentibus.

120. C. viridi aeneus, thorace fascia antica sanguinea, *rutilans*. scutello elytrisque antice flavescentibus.

Stoll. Cimic. 2. tab. 18. fig. 122. A.

121. C. ouatus viridi aeneus albido punctatus, tibiis antice dilatato membranaceis, *guttatus*.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Magnus. Caput oblongum, viride linea dorsali mar- gineque albidis. Thorax punctatus, vix spinosus, viridis, punctis albis sparsis numerosis. Scutellum et clytra thoraci concolora. Alae nigrae. Abdominis margo viridi alboque varius. Corpus subtus flavescentis strigis punctisque viridibus. Femora antica supra viridia subtus flavescentia. Tibiae membra- naceae, nigrae annulo albo. Pedes secundi paris desunt, tertii paris femoribus flavis, tibiis nigris annulo flavo.

122. C. ouatus supra flavius: punctis viridibus, subtus vi- *viridalis*. ridis.

- prasinus.* 123. *C. ouatus viridis immaculatus*, antennis apice albo fuscoque annulatis.
Stoll. Cimic. 2. tab. 19. fig. 127.
- dissimilis.* 124. *C. ouatus supra viridis subtus ferrugineus.*
- iuniperinus.* 125. *C. subrotundus viridis margine vndique scutelloque apice flauo.*
- fimbragdulus.* 126. *C. ouatus viridis*, scutello punctis tribus baseos flavis.
- Beryllus.* 127. *C. ouatus pallidus thoracis margine aurantio, elytris macula ferruginea lineolisque marginalibus nigris.*
Habitat in India orientali Doin. de Slanbusch.
Medius. Antennarum articulus primus secundusque pallidi tertius basi pallidus apice niger, 4. 5. basi pallidi, apice ferruginei. Caput pallidum margine tenuissimo striisque duabus dorsalibus flexuosis nigris. Thorax antice pallidus nigro punctatus, postice obscurior margine aurantio. Elytra pallida macula magna postica ferruginea. Margo lateralis lineolis transuersis nigris. Abdomen et pedes nigra, abdominis margine supra lineolis per paria approximatis rufis.
- calidus.* 128. *C. ouatus supra fuscus subtus testaceus, antennis nigris.*
Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.
Medius. Antennæ nigrae, Caput testaceum. Thorax obscurus, viridi fuscus antice parum testaceus margineque exteriori tenuissime nigro. Scutellum, elytraque viridi fusca, obscura. Alae striatae nigrae. Abdomen supra cyaneum, nitidum, subtus testaceum. Pedes testacei.
- coelebs.* 129. *C. ouatus fusco griseus*, scutello punctis tribus apiceque flavescentibus.
- iratus.* 130. *C. ouatus viridi fuscus*, thorace fascia flava.
Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.
Parvus. Antennæ nigrae articulis basi apiceque albis, Caput obscure viride, immaculatum. Thorax obscure viridis fascia in medio lata flava. Scutellum et elytra obscure viridia. Subtus flavescentes pectore punctis tribus nigris. Pedes flavi.

131. *C. subrotundus griseus*: margine vndique sanguineo. *dumosus*. ✓
132. *C. rotundatus flavescentis*, capite lineis scutello punctis tribus nigris. *tripunctatus*.
133. *C. ouatus griseo fuscoque varius*, alis albis fuso atomatis punctatis. *atomarius*.
134. *C. ouatus griseo nigroque varius*, alis albis nigro nubilus. *striatus*.
135. *C. ouatus flavescentis*, elytris apice puncto ocellari tristriatus atro, abdomine lineis tribus albis.
- Habitat agro Paedmontano. Dom. Allioni.
- Statura parua *C. nubilus*. Caput et thorax flavescentia, immaculata. Elytra basi flavescentia apice rufescens puncto subocellari atro, et hic color rufescens in medio extenditur. Subtus flavescentis abdomine lineis tribus albis. Pedes flavescentes.
136. *C. rotundatus luteo nigroque varius*, thorace luteo: 6 punctis sex nigris. *punctatus*.
137. *C. ouatus griseus*, scutello vitta nigra. *signatus*.
138. *C. ouatus fuscus*, scutello punctis duobus flavis, elytris puncto nigro. *grauis*.
139. *C. ouatus viridis*, thoracis abdominalisque margine cinctus. *sanguineo*.
140. *C. ouatus virescens*, thorace fascia sanguinea. *rubrofasciatus*.
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Statura et magnitudo omnino *C. cincti* totus supra virescens, subtus flavescentis. Thorax postice obscurior fascia sanguinea.
141. *C. ouatus viridis*, thoracis abdominalisque marginibus, antennis pedibusque sanguineis. *cruentus*.
142. *C. ouatus obscurus* thoracis abdominalisque margine geniculatae flavescente, ano pedumque geniculis ferrugineis. *tus*.
Habitat Cajennae Dom. Dallorf.
- Magnus. Caput obtusum, nigrum. Thorax antice punctis aliquot impressis niger margine laterali flavescente. Elytra nigra margine baseos flavescente. Scutellum nigrum apice paullo rufescens. Corpus nigrum maculis obsoletis rotis ad basin abdominalis. Anus et pedum geniculi ferruginei.

- mixtus.* 143. C. ouatus punctatus griseus nigro maculatis, abdominis margine nigro: punctis flauis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Magnus. Antennae fuscae articulis basi apiceque ultimo toto pallidis. Corpus totum supra cinereum punctis impressis nigris irroratum et praeterea macula magna marginalis utrinque in thorace, alia fere fasciam constitutam in scutello et tertia in medio elytrorum. Alae fuscae. Subtus flavescentes margine late nigro punctis flauis. Pedes variegati.
- tripterus.* 144. C. ouatus flavo rufoque varius, antennis nigris ultimo articulo apice albo.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Statura praecedentis et paullo minor. Antennae nigrae apice-albae. Corpus supra flavum ferrugineo densissime variegatum, subtus flavum maculis marginalibus fuscis. Pedes variegati.
- griseus.* 145. C. ouatus griseus, abdominalis lateribus albo nigroque variis, ventre antice spinoso.
- interflavus.* 146. C. ouatus griseus, abdominalis margine nigro maculato.
- papillofus.* 147. C. ouatus fuscus, antennis nigris, sterno gibbo compresso.
Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 2.
Thorax postice elongatus scutelli basin tegens. Abdominis margo spinosus.
- funebris.* 148. C. ouatus ater, antennis pedibus aliquo concoloribus.
- ruficornis* 149. C. rotundatus ater, antennis rufis.
- baccarum* 150. C. ouatus subfulvus abdominalis margine fusco maculato.
- eribrum.* 151. C. ouatus fuscus, thorace scutelloque punctatis, abdominalis punctis genibusque flauis.
- breuicor-nis.* 152. C. ouatus obscure cuprens, antennis breuibus compressis femoribus anticis dentatis.
Habitat in China Dom. de Sehestedt.
Statura omnino praecedentium. Antennae triarticulatae, compressae, nigrae. Caput nigrum, valde canaliculatum. Thorax antice tuberculo eleuato obtuso, seu

scutellum et elytra obscure cuprea, immaculata. Alae
fordide albae. Abdōmen supra nigrum, subtus cu-
preum. Pedes nigricantes, senioribus anticis intus
dentatis.

153. *C. ouatus glaucus*, elytris apice puncto nigro. *glaucus.*

154. *C. rotundatus supra sanguineus*, capite scutelli basi *Ianus.*
alisque atris. *Sp. II. S. 85.*

Cimex afer Drury. Ins. 3. tab. 46. fig. 7.

Cimex Janus Stoll. Cimic. 2. tab. 6. fig. 41.

155. *C. ouatus nigro rubroque rarius*, capite alisque ni- *ornatus:*
gris. Stoll. Cimic. 2. tab. 2. fig. 11.

156. *C. ouatus nigro rubroque varius*, thorace punctis sex *festivus:*
nigris, alis fuscis: margine albido.

157. *C. ouatus*, thorace abdomineque rufis, thorace ma- *rutilus.*
culis quatuor, abdome fasciis nigris.

158. *C. ouatus nigro pallidoque varius*, scutello nigro: *cruciatus:*
cruce alba.

159. *C. ouatus flavescentes*, capite disco communi pedibus- *discoidens*
que nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo *C. ornati*. Caput cum antennis
nigrum, immaculatum. Corpus flavescentes disco com-
muni supra atro marginé omni flavo. Pedes nigri
senioribus basi flavis.

160. *C. rotundatus supra niger*, thorace ruso: punctis *biocula-*
duobus nigris, scutello margine ruso. *tus.*

161. *C. rotundatus viridis* *immaculatus.*

grani-
neus.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Parvus. Corpus totum viride immaculatum. Supra
paullo obscurius, subtus paullo pallidius.

162. *C. rotundatus viridis*, elytris griseis: macula fusca *fimbria-*
marginaque viridi. *tus.*

Habitat in Chin: Dr. Pflug.

Parvus. Antennae pallide articulorum apicibus ni-
gris. Caput, thorax, scutellum viridia, punctata, im-
maculata. Elytra grisea macula media fusca, quae
ferat fasciam constituit marginaque exteriori viridi.
Alae cinereae macula bascos fusca. Subtus viridis li-
nea media flava. Anus porrectus apice emarginatus.

- 2 punctata*. 163. *C. ouatus obscure rufus, scutello punctis duobus apicibus, ab dominis margine nigro punctato.*
- bicolor*. 164. *C. ouatus niger, elytris nigro alboque variis, alis albis.* Stoll. Cimic. tab. 32. fig. 224.
- oleraceus*. 165. *C. ouatus coeruleo aeneus, thorace lineola, scutello apice elytrisque puncto albo rubroue.* Stoll. Cimic. 2. tab. 5. fig. 32. 33.
- pictus*. 166. *C. subrotundus supra ater, thorace lineis tribus, scutello linea punctisque quatuor, elytris margine ferrugineis.*
- histrionis*. 167. *C. ouatus varius, capite abdomineque atris albo lineatis.*
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
 Statura et magnitudo *C. picti*. Antennae ferrugineae.
 Caput atrum orbita oculorum lineis quinque duabus intermediis abbreviatis albis. Thorax rufus punctis plurimis impressis fuscis, antice maculis duabus, magnis fuscis rufo punctatis. Scutellum flavo rufoque variegatum maculis tribus fuscis, posticis marginalibus. Elytra fusca postice litura rufa. Alae albidae. Subtus ater lineis duabus macularum albidarum, quae tamen anum haud attingunt. Margo abdominis praeterea albidus.
- biguttata*. 168. *C. ouatus niger margine vndeque albo, elytris puncto albo.*
- coeruleus*. 169. *C. ouatus coeruleus immaculatus.* Stoll. Cimic. tab. 31. fig. 221.
- morio*. 170. *C. ouatus ater, plantis rufis.* Stoll. Cimic. tab. 32. fig. 2. 3.
- trifinis*. 171. *C. ouatus ater, clypeo orbiculato, thorace retuso.*
- spinipes*. 172. *C. ouatus ater, pedibus piceis, tibiis spinonissimis.*
- aethiops*. 173. *C. ouatus ater, thorace striga media impressa, tibiis spinosissimis nigris.*
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
 Statura et magnitudo omnino *C. oleracei* et omnino distinctus a *C. spinipes*. Corpus supra atrum antennis piceis. Striga medio thoracis impressa. Alae albidae. Pedes nigri femoribus compressis testaceis tibialisque spinosissimis.

174. C. ouatus fuscus, thoracis lineola, scutello abdomini- *lugens.*
nisque margine albis.
175. C. subrotundus griseus, capite scutellique basi nigro *melanoce-*
aeneis. *phalus.*
176. C. oualis antice attenuatus exalbidus fusco striatus *acumina-*
tus. antennis apice rufis.

**** Oblongi.

177. C. oblongus fuscus, femoribus posticis arcuato cla- *Phasia-*
uatis vndentatis, abdominis basi subtus gibbis. *nus.*
178. C. oblongus fuscus, femoribus posticis arcuatatis den- *bellicosus.*
tatis, abdomine quadrispinoso.
179. C. oblongus fuscus, antennarum vltimo articulo *Melca-*
tibiisque anticis flavis, femoribus omnibus serratis. *gris.*

Habitat in China Dr. Pflug.

Magnus. Autennae nigrae articulo vltimo flavo. Cor-
pus totum fuscum, immaculatum solo antennarum
primo articulo tibiisque quatuor anticis flavis. Fe-
mora omnia denticulis plurimis paruis serrata, po-
stica praeterea denticulis duobus longioribus acutis
dentata.

180. C. oblongus, elytris fuscis flavo striatis, abdominis *Gallus.*
disco rubro, femoribus posticis serratis.

181. C. oblongus niger, abdomine fusco: margine flavo, *faber.*
femoribus anticis apice bidentatis.

Habitat in Poulican tor Mus. Dom. Banks.

Magnus. Antennae quadriarticulatae, filiformes, ni-
grae. Caput, thorax, elytra, alae atra, immaculata.
Corpus subtus fuscum abdominis margine flavo et
ante marginem puncta tria aut quatuor atra. Pedes
atri femoribus anticis apice spinis duabus, vltima
maiori.

182. C. oblongus niger subtus rubro punctatus, femori- *harpa-*
bus dentatis. *gon.*

183. C. oblongus, abdomine rubro bidentato, elytris fu- *indus.*
scis pallido striatis.

Habitat Cajennae.

184. C. oblongus rufus nigro maculatus, alis exalbidis: *militaris.*
striga bascos atra.

- equestris.* 185. *C. oblongus rubro nigroque maculatus, thorace ante posticeque atro, alis atris albo maculatis.*
Pectus atrum, immaculatum. Margo alarum albicat.
- civitis.* 186. *C. oblongus rubro nigroque varius, thorace lunulis duabus nigris, alis fuscis albo maculatis.*
Habitat Tranquebariae Dom. Romanus.
*Affinis videtur *C. equestri*, attamen distinctus. Differt thorace haud antice posticeque nigro sed lunulis duabus longitudinalibus nigris. Color minus vividus. Alae fuscae lineolis duabus transversis baseos puncto-que fere medio albis margine concolore. Pectus fu- scum rubro maculatum. Abdomen fusco rubroque maculatum vtrinque linea punctorum nigrorum. Pedes fuscui.*
- crudelis.* 187. *C. rubro nigroque varius, alis exalbidis, antennis pedibusque nigris.*
- saxatilis.]* 188. *C. oblongus niger thoracis margine laterali lineaque media rubris, elytris maculis tribus rubris, alis imma- culatis Linn. Syst. Nat. 2. 727. 91.*
Cimex saxatilis Scop. carn. 571.
Habitat in Europa australiori Dom. de Slanbusch.
Corpus subtus rubro nigroque varium. Pedes nigri.
- Hyoscy- 189. *C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis imma- mi.**
- familiaris 190. *C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis: pun- eto baseos albo.**
Habitat et in India orientali Dom. Lund.
- rufstratus. 191. *C. oblongus rufus, scutello vitta marginali flava.**
- malaba- 192. *C. oblongus fuscescens, thorace scutelloque punctis ricus.**
- aulicus. 193. *C. oblongus rubro nigroque varius, elytris fascia atra, alis atris: lineola baseos alba.* S. 107. Sp. 148.*
- varicor- 194. *C. oblongus variegatus, capite pedibusque rufis, nis.**
- Habitat in India orientali Dom. Vahl.*
Corpus magnum. Caput cum rostro rufum. Anten- narum primus articulus rufus, secundus niger, ter- tius albus apice fuscus. Thorax planus pallide fuscus margine pallido. Elytra nigra margine exteriori palli-

pallido. Alae atrae. Abdomen ferrugineum segmentorum marginibus nigris. Pedes rufi.

195. C. oblongus pallens, thorace elytrisque fuscis: *pallens*.
margini pallido.
196. C. oblongus thorace testaceo antice nigro: margine cingula-albo, elytris puncto nigro. *108. Sp. 150.* *tus.*
197. C. oblongus rufus, antennis, thoracis basi fascia elytrorum alisque nigris. *superstitiosus.*
198. C. oblongus rufus, elytris nigris: fascia alba. *albofasciatus.*
199. C. oblongus glaucus, capite atro, thorace antice *ruficollis*.
rufo.
200. C. oblongus niger thoracis margine elytrorumque *scabrosus*.
fasciis dñabus rufescientibus.
201. C. oblongus thorace nigro: basi margine punctisque *leprosus*.
duobus rubris, elytris atris immaculatis.
202. C. oblongus niger, capite elytrisque rubris, alis *leucurus*.
atris basi apiceque albis.

Habitat in Insula Amsteraam Mus. Dom. Banks.

Magnitudo C. Koenigii. Caput rubrum, antennis rostroque nigris. Thorax niger margine a basi ad medium rubro. Scutellum nigrum. Elytra rufa. Alae atrae puncto baseos inter elytra margineque postico albis. Corpus nigrum abdominis lateribus sanguineis. Pedes nigri.

203. C. oblongus testaceus, elytris puncto nigro, alis atris. *Koenigii.*
Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 5.

204. C. oblongus sanguineus, thorace fascia abbreviata, *Slanbuschii*.
scutello, elytris puncto alisque atris.

Habitat in China Dom. de Slanbusch.

Statura et magnitudo C. Koenigii. Antennae atrae ultimo articulo cinereo. Caput sanguineum, immaculatum. Thorax sanguineus fascia lata margines haud attingens atra. Scutellum atrum. Elytra laevia, sanguinea puncto medio atro. Alae atrae, immacula-

culatae. Subtus sanguineus fasciis lateralibus abbreviatis atris. Pedes fuscii femoribus sanguineis.

Variat interdum fascia thoracis in medio interrupta.

aegyptius 205. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris: puncto nigro.

mendicus: 206. C. oblongus rubro fuscoque varius, alis atris; apice lineolaque baseos albis.

seruus. 207. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris apice albis, alis nigris apice albidis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Parua statuta C. mendici. Antennae nigrae. Caput rufum linea longitudinali nigra. Thorax rufus fasciis duabus nigris subabbreuiatis punctis duobus dorsalibus vinctis. Elytra rufa linea magna postice dilatata nigra. Margo posticus totus albus. Alae nigræ margine postico albido. Pectus rufum nigro maculatum. Abdomen fuscum margine rubro. Pedes nigri.

famelicus 208. C. oblongus supra ater, thorace elytrisque punctis duobus flavescentibus, alis lineola baseos alba. Stoll. Cimic. 2. tab. 8. fig. 56. ?

4 gutta-tus. 209. C. oblongus elytris rufis: fascia nigra, alis punctis duobus albis.

punctato-guttatus. 210. C. oblongus niger, elytris rufis: puncto medio atro, alis atris: punctis duobus albis.

2 gutta-tus. 211. C. oblongus, elytris rufis: striga vndata nigra, alis nigris: puncto medio albo.

sanguino-lentus. 212. C. oblongus sanguineus, antennis elytris pedibusque fuscis.

6 punctata-tus. 213. C. oblongus, thorace elytris rufis: maculis duabus nigris.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Magnitudo et statura praecedentium. Caput atrum. Thorax laevis, rufus punctis duobus nigris. Scutellum nigrum. Elytra rufa maculis duabus nigris, altera versus suturam, altera versus apicem. Alae fuscae. Corpus fuscum linea laterali rubra. Pedes fuscii femoribus rubris.

214. C. oblongus rufus, thoracis maculis duabus, antennis alis pedibusque fuscis.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Statura et summa affinitas C. sanguinolenti, a quo tamē manifeste differt colore minus laeto, maculis duabus thoracis fuscis scutelloque rubro.

215. C. oblongus rufus antennis alisque nigris: saturis *saturalis*. omnibus albis.

216. C. oblongus supra rufus, alis albidis: macula magna *rubicino-fusca*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus maior. Caput rufum. Rostrum nigrum basi rufum. Antennae desunt. Thorax rufus margine postico flauo. Alae albidae macula magna nigra in medio. Pectus atrum striis vtrinque tribus flauis. Abdomen rubrum basi nigrum lateribus ramen rubris. Pedes atri.

217. C. oblongus rufus, antennis pectore ano pedibus- *excavatus* que atris, scutello canaliculato.

218. C. oblongus sanguineus, thoracis lineis scutello alis *furcatus*. ano pedibusque atris.

Habitat in Guinea Dom. Lund.

Magnus. Caput sanguineum margine baseos rostro antennisque atris. Thorax rufus lineis duabus ante marginem anticum coeuntibus atris. Scutellum nigrum in quibusdam punctis duobus rubris. Elytra sanguinea, immaculata. Alae atrae immaculatae. Corpus sanguineum pectore nigro maculato. Pedes atri. Anus ater puncto vtrinque paruo sanguineo.

219. C. oblongus rufus, antennis tibiisque fuscis. *carnifex*.

220. C. oblongus rufus antennis alis pedibusque nigris. *augur*. Stoll. Cimic. 2. tab. 18. fig. 124.

221. C. oblongus supra rufus, thorace scutelloque punctis *maculans*. duobus nigris.

222. C. oblongus rubro nigroque varius elytrisque *xu-apterus*: bris: punctis duobus nigris, alis nullis.

Stoll. Cimic. 2. tab. 15. fig. 103.

223. C. oblongus flavescentia, scutello elytris alisque fu- *scis*, elytris apice cinereis.

- nugax.* 224. C. oblongus fuscus, abdominis marginis maculato, tibiis anticus femoribusque posticis basi pallidis.
- calcaratus.* 225. C. oblongus fuscus, abdome supra sanguineo, femoribus posticis sexdentatis.
- lineola.* 226. C. oblongus supra obscure griseus, scutello linea dorsali albida.
- Habitat in Insula St. Crucis Americae.
- Paruus.* Antennae fuscescentes articulo medio flavo. Caput, thorax, elytra obscure grisea, immaculata. Scutellum griseum linea media albida. Alae obscuriores. Subtus flavescentes. Pedes flavescentes apice nigri.
- Pini.* 227. C. oblongus ater, elytris fuscis: macula rhombaea atra.
- sylaticus* 228. C. oblongus ater, elytris fuscis.
- Rolandri* 229. C. oblongus ater, alis macula rhombaea flavo.
- Forsteri.* 230. C. oblongus ater, scutelli apice, thoracis elytrorumque margine sanguineis.
- sordidus.* 231. C. oblongus niger, thorace postice, elytris pedibusque griseis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
- Medius.* Antennarum articuli basi cinerei apice nigri. Rostrum cinereum basi apiceque nigrum. Caput thorax, corpus nigra. Thorax postice griseus. Elytra obscure grisea. Alae obscurae vndis aliquot albidis. Pedes grisei.
- clanimus.* 232. C. oblongus ater, thoracis elytrorumque margine sanguineo, femoribus anticus incrassatis dentatis.
- pustula-* 233. C. oblongus niger, thorace elytrisque maculis duabus rufis.
- tus.*
- Vrticae.* 234. C. oblongus niger, elytris griseis, alis albis: puncto nigro.
- lynceus.* 235. C. oblongus niger, elytris griseis, apice macula nigra: puncto albo.
- sylvestris.* 236. C. oblongus niger, elytris fuscis apice nigro punctatis alis nigris: puncto baseos apicisque albo.
- lunatus.* 237. C. oblongus niger, thorace maculato, elytris lunula marginali flavo.

Habi-

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Antennae nigrae articulo ultimo ferrugineo. Caput pubescens, nigrum oculis prominulis cylindricis. Thorax punctatus, niger maculis tribus baseos flavis. Scutellum nigrum. Elytra nigra lunula magna flava, cuius cuncta marginem exteriorem attingunt, et in medio puncto atro coarctata. Corpus fuscum abdominis medio flavo maculato. Pedes flavo ferrugineoque varii.

238. C. oblongus, elytris fuscis; basi punctisque duobus podagris albis, femoribus anticis exaltissimis bidentatis. *crafficornis*.
239. C. oblongus griseus nigro punctatus, antennis clavatis. *succinctus*.
240. C. oblongus niger, elytris cinereis, aliis albis. *arenarius*
241. C. oblongis thoracis elytrorumque margine femororumque basi rotatis. *nigritus*.
242. C. oblongus supra ferrugineo fuscus, corpore elytrorumque margine flavis. *tunicatus*.
243. C. oblongus rufus, antennis pectore elytris tibiisque nigris. *pubicornis*.
244. C. oblongus niger, pedibus antennisque flavis. *Coryli*.
245. C. oblongus niger, thorace elytrisque flavescentibus, scutello macula disci nigra. *nemoralis*.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnino C. campestris at aliis. Caput, pedes nigra. Abdomen nigrum lateribus flavescentibus. Thorax et elytra flavescentia apud rufescencia, immaculata. Scutellum flavesiens macula magna disci triangulari nigra. Alae nigrae. Pedes nigri femoribus flavescentibus.

246. C. oblongus flavesiens, elytris macula ferruginea. *campestris*.
247. C. oblongus flavesiens, elytris viridibus. *pratinensis*.
248. C. oblongus supra obscurae griseus, elytris apice puncto rubro, femoribus posticis elongatis nigris. *floralis*.

Habitat in Hafniae floribus. Dr. Pileg.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax obscurae grisea antennis pallidis. Elytra concolora pun-

cto apicis rufo. Corpus fuscum ano rufescens. Pedes pallidi femoribus posticis elongatis nigris.

- punctata* 249. C. oblongus viridis, thorace bipunctato, elytris pallidioribus: puncto apicis flavo.

- inquinatus* 250. C. oblongus flauescens, elytris nigris albo variis. Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Medius. Caput flauescens antennis nigris. Thorax flauescens lateribus margineque postico nigris. Elytra nigra, basi apiceque albo nigroque variis. Corpus flauescens margine nigro. Pedes nigri.

- nassatus* 251. C. oblongus viridis, antennis pedibusque flauescen-

tibus.

Habitat Hafniae in Tilia Dom. Lund.

Parvus totus viridis, immaculatus, antennis pedibusque solis flauescentibus.

- Tiliae*. 252. C. oblongus virescens; fasciis tribus fuscis; media angulata. G. Dr. M. 301. Sp. 218.

- Populi*. 253. C. oblongus albo fuscoque nebulosus.

- guttatus*. 254. C. oblongus niger, scutello maculisque tribus elytrorum flavis.

Thorax flauo maculatus.

- leucocephalus*. 255. C. oblongus niger, capite pedibusque fulvis.

- transversalis*. 256. C. oblongus viridis, thorace lineola interrupta, elytris macula fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura praecedentium at duplo minor. Corpus viride. Antennarum ultimus articulus fuscus. Thorax viridis lineola transversa in medio interrupta fusca. Abdomen viride dorso atro. Elytra viridia macula magna versus apicem suturaque fuscis. Pedes virides.

- sanguineus*. 257. C. oblongus sanguineus, capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuscis.

- tripustulatus*. 258. C. oblongus niger, scutello maculisque tribus elytrorum coccineis,

259. C. oblongus niger, elytris alisque apice puncto nigro. ^{vec} trigutta-
tus.
260. C. oblongus niger, elytris striatis, alis postice flavo saltato-
maculatis. ^{vec} rius.
261. C. oblongus ater, antennis apice capillaribus. ater.
262. C. oblongus ater, rostro femoribusque sanguineis, tyrannus.
antennis apice capillaribus.
263. C. oblongus ater, capite scutello maculisque duabus Schach.
elytrorum coccineis, antennis apice capillaribus.
264. C. oblongus ater, elytris testaceis: strigis duabus bifascia-
albis, antennis apice capillaribus. ^{vec} tus.
265. C. oblongus niger, elytris flavo lineatis apice fascia umbra-
alba, antennis apice capillaribus. ^{vec} tilis.
- Cimex umbratilis oblongus niger, elytris albo macula-*
tis. Linn. Syst. Nat. 2. 728. 9. Fn. Sv. 951.
- Habitat in Suecia Dom. de Paykull.
- Medius. Antennae nigrae apice setaceae. Caput, tho-
rax, scutellum, corpus nigra, intumulata. Elytra ni-
gra lineolis aliquot flavis abbreviatis exarata apice
fascia nigra. Pedes picci.
266. C. oblongus niger, capite thorace pedibusque rufis, flavicollis. ^{vec}
antennis apice capillaribus.
267. C. oblongus niger, antennis apice capillaribus, ely- ^{vec} tris fasciis tribus rufis. ^{vec} tus.
268. C. oblongus, elytris fusco ferrugineis apice coccineis: olinaceus.
puncto atro, antennis apice capillaribus.
269. C. oblongus ater, elytris fusco pallidis apiceque seticornis. ^{vec}
puncto coccineo, antennis apice capillaribus.
270. C. oblongus flavescent, elytris apice coccineis an- ^{vec} capillaris.
tennis nigris apice capillaribus.
271. C. oblongus niger, scutello elytrorumque apicibus gothicus.
coccineis, antennis apice capillaribus.

tricolor. 272. *C. oblongus ater*, elytris apice macula coccinea, antennis apice capillaribus.

Habitat in Hispaniae Vrta Dom. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas *C. gothici* at totus ater elytrorum solis apicibus macula magna coccinea. Alae nigrae macula marginali transuersa pallida. Pedes nigri.

spissicornis. 273. *C. oblongus niger*, pedibus flauis, antennis incrassatis apice capillaribus.

agilis. 274. *C. oblongus thorace atro-* margine postico flauo, elytris fuscis basi apiceque pallidis.

Cinex quadri flauo maculatus Degeer.

varius. 275. *C. oblongus flavescentis*, capite scutelli margine atris. Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Paruus. Caput atrum antennis basi pallidis. Thorax flavescentis margine postico nigro punctoque laterali apicis rufo. Scutellum flauum margine nigro. Elytra flauo fuscoque varia punto obsoleto rufo apicis. Corpus vti et pedes flavescentia.

**** *Antennis setaceis.*

laevigatus. 276. *C. oblongus exalbidus*: lateribus albidis.

lateralis. 277. *C. oblongus niger*: lateribus albidis.

holstatis. 278. *C. oblongus exalbidus*, thorace lineis duabus, elytris interne fuscis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Antennae setaceae exalbidae. Thorax lineis duabus dorsalibus fuscis. Elytra interne fuscata, externe albida. Corpus exalbidum.

pabulinus. 279. *C. oblongus viridis* immaculatus, alis hyalinis.

virens. 280. *C. oblongus viridis*, plantis antennarumque apicibus rufis.

pallens. 281. *C. oblongus pallidus* capite corporeaque atris. Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Paruus.

Parvus. Caput atrum, antennis pallidis. Thorax, scutellum, elytra, pedes pallida, immaculata. Corpus atrum.

282. C. oblongus elytris ferrugineis latere albidis, antennis nigris, linea thoracis alba. dolabra-tus.
283. C. oblongus, capite thorace elytrisque nigris, scutello fulvo. calens.
284. C. oblongus, thorace elytrisque atris, linea flavo fusciam elytrorum formante. Gronouii.

285. C. oblongus griseus immaculatus. ferus.

286. C. oblongus griseus, capite thoraceque linea nigra, vagans. pedibus testaceis.

Habitat in Suecia.

Statura omnino C. feri. Caput et thorax grisea linea longitudinali nigra. Scutellum nigrum punctis duobus parvis rufis. Elytra grisea interdum punctis aliquot obsoletis nigris. Alae exalbidae. Pedes testacei.

287. C. oblongus fuscus, capite thoraceque lineis tribus, cingulata-elytris margine omni albo. tus.

Habitat in India orientali Doin. de Slanbusch.

Statura et affinitas C. marginelli. Antennae nigrae. Caput nigrum punctis duobus sub antennis, linea media orbitaque oculorum pallide rufescens. Thorax fuscus lineis tribus albidis lateralibus obliquis abbreviatis. Elytra obscure rufa sive fusa margine omni lineaque media obsoleta albis. Corpus subitus nigrum vtrinque linea alba.

288. C. oblongus niger, thoracis lineis tribus, elytris margine omni albis punctoque apicis coccinco. striatus.

289. C. oblongus niger, elytris flavo fuscoque striatis apice pedibusque rufis.

290. C. oblongus fulvo maculatus, pedibus rufis: femoribus crassis dentatis.

291. C. oblongus supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis posticis albo fuscoque varitis.

292. C. corpore elongato fusco flavoque vario, femori- bus posticis elongatis dentatis.

filiformis. 293. C. antennis setaceis ferrugineis, corpore linearis pallide virescenti.

***** *Linearis, corpore angusto.*

fossalum. 294. C. linearis supra fuscus, thoracis scutellique marginibus lineaque dorsali flauis.

lacustris. 295. C. linearis niger, pedibus anticis breuissimis.
Stoll. Cimic. 2. tab 9. fig. 63.

stagnorum. 296. C. linearis teretiusculus niger, thorace medio punctis duobus globosis.

riundo- 297. C. linearis niger albo punctatus, abdomine fuluo-
rum.

pallipes. 298. C. linearis niger, pedibus pallidis, pectore bispinoso.

culicifor- 299. C. thorace multispinoso griseus, elytris lituris nigris,
mis. corpore elongato.

angusta- 300. C. elongatus supra griseus subtus flauescens, anten-
tus. nis pedibusque subtestaceis.

Habitat in China Dr. Pflug.

Statura omnino C. culiciformis at subtus totus flauescens,
subtus griseus.

filum. 301. C. linearis fuscus, alis abbreviatis, pedibus longissimis.

longipes. 302. C. linearis ater, thoracis margine elytrorumque fa-
scia sanguinea.

curstans. 303. C. linearis supra fuscus subtus cinerascens, pedibus longissimis, ano bidentato.

tipula- 304. C. linearis exalbidus, pedibus omnibus longissimis,
rius. femoribus clavatis, antennis bicaudatis.

vagabun- 305. C. linearis, elytris aliquo fusco alboque variis, pe-
dibus longissimis cinereo annulatis.

clavipes. 306. C. linearis cinereus, femoribus clavatis, antennis biclavatis.

170. REDVVIUS. *Os rostro arcuato.*

Antennae supra oculos inseruntur.

1. R. niger, thoracis margine elytrorumque fascia obsoleta flexuosa rufis. *gigas.* ✓
 2. R. antennis apice capillaribus, corpore subuilloso fuscō. *personatus.* ✓
 3. R. niger, thorace abdominisque basi oliuaceis. *barbicornis.*
Cimex barbicornis Drury. Inf. 3. tab. 45. fig. 1.
 4. R. rufus, thorace maculis quatuor, clytris tribus nigris. *maculatus.*
 5. R. glaber niger, elytris fuscis nigro maculatis: mārgine rufo. *stridulus.* ✓
- Habitat Monspeliae Dom. Broussonet Mus. Dom. Banks primo vere agilis, antennas continuo motitans, thoracis attritu stridens.
- Paruus. Antennae nigrae, triarticulatae. Thorax niger, nitidus striga transuersa, valde impressa. Scutellum triangulum, fuscum. Elytra intus fuscō cinerea punctis tribus atris extus rufa. Alae fuscae macula atra. Corpus nigrum abdominis segmento 2. 3. 4. rufis. Pedes nigri anterioribus incrassatis.
6. R. ater, thorace oliuaceo, femoribus anticis rufis. *nitidulus.*
 7. R. ater, thorace elytrorumque apice villosis cinereis, pilipes. pedibus hirtis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
Caput atrum postice attenuatum. Thorax villosus, cireus. Elytra cinerea basi atra. Alae albae. Corpus atrum. Pedes hirti, atri femoribus anticis tibiarumque basi cinereis.
 8. R. ruber, elytris nigris basi fasciaque rubris. *longipes.*
 9. R. supra rufus, alis nigris, abdomine atro: mārgine rufo. *marginalis.*
 10. R. ater, elytris griseis nigro venosis, abdominis mārgine pedibusque posticis rufis.
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Magnus. Caput atrum, immaculatum, postice attenuatum. Thorax ater maculis tribus griseis marginalibus minoribus. Elytra grisea venis nigris. Alae obscurae. Abdomen atrum margine sanguineo. Pedes antici nigri, postici quatuor sanguinei.

apustula- 11. R. supra niger, elytris puncto apicis rufo.
tus. Abdominis margo rufo maculatus.

santus. 12. R. flauescens, thoracis cruce impressa, elytris abdominalisque medio nigris.

Habitat in India Dr. Pflug.

Medius. Caput cum antennis flauescens oculis nigris. Thorax flauescens fascia media lineaque dorsali antica a fascia ad apicem ducta impressis nigris. Scutellum flauescens. Elytra et alae nigra, immaculata. Abdomen nigrum margine flauescente nigro maculato. Pedes flauescentes.

ornula- 13. R. anteunis apice capillaribus, corpore nigro subtus fanguineo maculato.

cruentus. 14. R. rufus, capite pectore abdominalisque striis macularibus rufis.

Schaeff. Icon. r. tab. 5. fig. 9. 10.

Habitat Monspeliae Dr. Broussier.

Statura et magnitudo R. annulati. Caput nigrum gulari striisque basi rubris. Antennae nigrae. Thorax rufus lobo antico nigro punctis duobus magnis rubris. Elytra rufa; immaculata. Alae obscurae. Pedes nigrum. Abdomen rufum lineis tribus punctorum nigrorum margineque nigro vario. Pedes rufi puncto femorum, genubus tarisque rufis.

annulus. 15. R. rufescens, antennis pedibusque flavo nigroque annulatis.

bicolor. 16. R. ater, thorace postice elytris abdominalisque margine obscure pallidis.

litura. 17. R. obscure fuscus antennarum apice elytrorumque litura media albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus. Antennae nigrae apice albae. Caput nigrum, immaculatum. Thorax fuscus cruce media impressa. Elytra fusca venis lituraque media, quae fere fasciam constituit albis. Corpus et pedes fuscus.

18. R.

18. R; testaceo nigroque varius, thorace antice testaceo: *attelaboides.*
dentibus duobus nigris.
19. R. ater thorace postice scutello, elytrorum margine pilicornis:
abdomine femoribusque basi rufis.
- Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.
Medius. Antennae hirtae, nigrae. Caput atrum, nitidum tuberculo verticis magno elevato stemmatibus duobus. Thorax antice ater, postice rufus. Scutellum rufum, apice emarginatum. Alae omnes atrae margine usque ad medium rufo. Pedes atrum. Abdomen basi rufum apice nigrum. Pedes atti, nitidi femoribus basi rufis.
20. R. fuscus, capite abdominis margine pedibusque oli- *quadri-*
uaceis, thorace antice quadridentato. *dens.*

21. R. elytrorum basi antennis pedibusque rubris, tibiis *nigripes*:
anticis hirsutissimis.
22. R. thorace subspinoso ater immaculatus, tibiis cylin- *hirtipes*:
dricis hirsutissimis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis, at totus ater immaculatus. Thorax utrinque spina brevi, obtusa. Tibiae quatuor anticae cylindricae, obtuse, hirtae.

23. R. niger, thorace elytrisque obscure ferrugineis, scutello lineola media alba. *haemorrhoidalis.*

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura praecedentium. Corpus nigrum abdominis margine albo vario anno sanguineo. Thorax obscure ferrugineus margine postico ab apice ad scutellum albo. Scutellum nigrum linea media alba. Elytra obscure ferruginea, immaculata. Femora rufa. Tibiae nigrae.

24. R. thorace subspinosa atra, elytris lineola, abdominis *lineola!*
margine femorumque articulatione sanguineis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentium. Caput, thorax, scutellum atra, immaculata. Elytra atra lineola sanguinea versus apicem. Alae atrae. Abdomen nigrum margine annoque sanguineis. Pedes atri seniorum articulatione sanguinea. Tibiae anticae incuruac, hirtae.

- collaris.* 25. R. ater, elytris postice albis, capite postice attenuato cylindrico.
- varius.* 26. R. rufo nigroque varius, abdominis margine dente medio erecto obtuso.
- sexguttatus.* 27. R. thorace subspinoso niger, elytris maculis tribus albis.
- quadriguttatus.* 28. R. thorace testaceo, elytris alisque atris: maculis quatuor laete flavis.
- punctatum.* 29. R. thorace testaceo, elytris alisque nigris: macula media flava.
- 2 punctata.* 30. R. niger, elytris pallidis: puncto atro, ab domine rufo; ano atro.
Habitat in India orientali.
Parvus. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum nigruin basi album in primis in medio. Elytra pallida puncto magna atro. Alae pallidae macula magna nigra. Abdomen rufum ano atro. Pedes nigri anticis brevibus, compressis.
- hamatus.* 31. R. niger, elytris basi pallidis, alis macula communis rufa, pectore spinoso.
- iracundus.* 32. R. niger, thorace abdominalisque marginibus rubro maculatis, elytris rufis.
- fuscipes.* 33. R. rufus, thoracis fascia, elytrorum margine interiori pedibusque fuscis.
Habitat in India orientali Dom. Lund.
Statura R. iracundi at paullo minor. Rostrum basi rufum apice nigrum. Caput postice attenuatum. Thorax rufus fascia lata fusca. Elytra rufa margine interiori fusca. Alae nigricantes. Scutellum basi rufum apice nigrum. Corpus rufum nigro maculatum. Pedes fulvi femoribus basi parum rufis.
- bifidus.* 34. R. ater, elytris fascia rufa, scutello spina erecta apice bifida.
Habitat in China Dr. Pflug.
Magnus. Caput, thorax, scutellum, corpus atra, immaculata. Caput postice attenuatum, cylindricum. Scutellum in medio spina elongata, erecta, apice bifida. Elytra nigra fascia lata rufa in medio. Abdominis mar-

margo valde eleuatus, carinatus. Pedes atri tibiis anticus ante apicem parum rufis.

35. R. thorace scutelloque acute spinosis, elytris puncto *bigutta*.
albo. Stoll. Cimic. 2. tab. 11. fig. 64. *tus.*

36. R. niger, elytris ferrugineis, rostro antennis tibiisque *ferratus*.
flavis, scutello cristato serrato.

Stoll. Cimic. 2. tab. 1. fig. 6.

37. R. fusens, antennarum annulis tibiis abdominisque *albipes*. ✓
punctis lateralibus albis.

38. R. thorace elytrisque obscure ferrugineis, abdomine *teffellatus*.
atro: margine albo vario.

Habitat Monspeliac Dr. Broussonet Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Capit nigrum rubro punctatum. Antennae nigrae. Thorax lobo antico nigro testaceo maculato, postico obscure ferrugineo, margine postico acuto albido. Scutellum nigrum linea dorsali alba. Elytra obscure ferruginea, immaculata. Alae obscurae. Corpus subtus fulcum abdome atro nitido margine albo vario. Pedes rufi femoribus intus nigris.

39. R. corpore villoso griseo, abdominis margine nigro *aegyptius*
variegato.

40. R. niger, capite thoraceque spinosis. *diadema.*

41. R. thorace nigro postice spinis quatuor flavis, scutello apice recurvo spinoso. 5 *spinofus*

42. R. niger elytris apice alisque medio puncto albo, scutello apice recurvo spinoso.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Medius. Caput et thorax atra, immaculata, inermia. Scutellum apice recurvum, acutum, subspinosum. Elytra nigra apice macula magna alba. Alae fuscae puncto medio albo. Abdomen atrum punctis marginalibus albis. Pedes atri.

43. R. capite thoraceque nigris, elytris flavescentibus: *fasciatus*. fascia, alis apice nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus magis elongatus. Caput atrum, immaculatum spinis duabus pone antennas erectis, subulatis. Thorax ater, immaculatus. Elytra flavescentia fascia lata

nigra. Alae flauescentes apice nigrae. Abdomen rufum ano nigro. Pedes antici flavi, secundi flavi femoribus basi nigris, postici nigri femoribus annulo rufo.

maurus. 44. R. ferrugineus, abdominis margine nigro maculato, thorace antice subspinoso.

Acan-
tharis. 45. R. thorace spinoso, abdome spinis ciliato.

guttula. 46. R. ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo.

Habitat in Germania Dr. Heisse.

Medius. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Scutellum atrum. Elytra rubra puncto paruo atro ad futuram. Alae nigrae puncto magno marginali albo. Abdomen atrum, immaculatum. Pedes rufi femoribus anticis incrassatis, vnidentatis.

elongatus. 47. R. elongatus rufus, antennis pedibusque nigris.

171. PVLEX. *Rostrum* vagina quinque articulata, seta vnica.

Laminae duae ouatae basin rotstri tegentes.

Antennae moniliformes.

irritans. 1. P. rostro corpore breuiore.

penetrans 2. P. rostro corporis longitudine.

172. APHIS. *Rostrum* vagina quinque articulata, seta vnica.

Labium fornicatum.

Antennae setaceae.

longiro- 1. A. cinereus, rostro corpore triplo longiore.

stris. Habitat Dresdae sub arborum corticibus formicarum laruis visitans.

Medius.

- Medius. Rostrum longissimum, cylindricum, quo lar-
uarum succuni haurit.
2. A. *Lychnidis diricæ.* *Lychnidis*
3. A. *Salicis Capreæ.* *Capreæ.*
4. A. *Sambuci nigrae.* *Sambuci.*
5. A. *Solidaginis Virgaureæ.* *Solida-* ✓
ginis.
6. A. *Pruni Cerasi.* *Cerasi.* ✓
7. A. *Ribis rubri.* *Ribis.*
8. A. *Arundinis Epigeiri.* *Arundi-*
nis.
9. A. *Populi nigrae.* *barforia.*
10. A. *Gallii Aparines.* *Aparines*
11. A. *Aceris campestris.* *Aceris.* ✓
12. A. *Rumicis Lapathi.* *Rumicis.* ✓
13. A. *Pastinacæ satiuæ.* Linn. Syst. Nat. 2. 734. 3. Fn. *Pastina-*
Su. 977. *caæ.* ✓
- Habitat in *Pastinaca satiuæ.* ✓
14. A. *Pruni domesticæ.* *Pruni.*
15. A. *Cardui Acanthoidis.* *Cardui.*
16. A. *flavescens, abdomine viridi, antennis pedibusque Achilleæ.*
albidis.
17. A. *plantarum aquaticarum.* Linn. Syst. Nat. 2. 734. 10. *Nym-*
Fn. Su. 983. *pheæ.* ✓
- Habitat in *Nymphaeis, Potamogeton.*
18. A. *Corni sanguineæ.* *Corni.* ✓
19. A. *Artemisiae Absinthii.* Linn. SyR. Nat. 2. 735. 19. *Absinthii.*
Fn. Su. 991.
- Habitat in *Artemisia Absinthio.*
20. A.

- Millefolii.* 20. A. fusca abdōmine virescente, antennis pedibus corniculisque nigris.
- Euonymi.* 21. A. Euonymi europaei.
- Auenae.* 22. A. Auenae satiuae.
- Fraxini.* 23. A. Fraxini excelsioris.
- Fagi.* 24. A. Fagi syluaticae lunata. Linn. Syst. Nat. 2. 735. 23.
Fn. Su. 994.
Reaum. Inf. 3. tab. 26. fig. 1.
Geoff. Inf. 1. 497. 2.
- Habitat in Fago syluatica.
- Betulae.* 25. A. Betulae albae.
Costa alae anticae virescens.
- Alni.* 26. A. Betulae Alni.
- Populi.* 27. A. Populi tremulae.
- Viburni.* 28. A. Viburni Opuli.
- Mali.* 29. A. Pyri mali.
- Rosae.* 30. A. Rosae.
- Atriplicis* 31. A. Atriplicis hortensis.
- Picridis.* 32. A. Picridis hieracioides.
- Aegopodii.* 33. A. Aegopodii podagrariae.
- Dauci.* 34. A. Dauci Carotae.
- Vrticae.* 35. A. Vrticae dioicæ.
- Tanaceti.* 36. A. Tanaceti vulgaris.
- Vlmi.* 37. A. Vlmi campestris.
- Papaveris.* 38. A. Papaveris somni feri.
- Tiliae.* 39. A. Tiliae europeac.

40. A. Iuniperi communis.	<i>Iuniperi.</i>
41. A. Brassicae oleraceae.	<i>Brassicae.</i>
42. A. Quercus Roboris.	<i>Roboris.</i>
43. A. Quercus Roboris.	<i>Quercus.</i>
44. A. Pini sylvestris ramulorum.	<i>Pini.</i>
45. A. Pini sylvestris foliorum.	<i>Pineti.</i>
46. A. Salicis fragilis et viminalis.	<i>Salicis.</i>
47. A. Pistaciae Lentisci.	<i>Pistaciae.</i>
48. A. Romicis Acetosae.	<i>Aceto/ae.</i>
49. A. Ligustici scotici.	<i>Ligustici.</i>
50. A. Pruni Padi.	<i>Padi.</i>
51. A. Viciae Craccae.	<i>Viciae.</i>
52. A. Lactucae oleraceae.	<i>Lactucae.</i>
53. A. Sonchi oleraceae.	<i>Sonchi.</i>
54. A. Vitis viniferae.	<i>Vitis.</i>

173. CHERMES. *Rostrum* vagina pectorali.*Setae* tres inflexae.*Antennae* cylindricae.

1. C. Airae flexuosa.	<i>Graminis</i>
2. C. Vimi campestris.	<i>Vimi.</i>
3. C. Pyri communis.	<i>Pyri.</i>
4. C. Ceraustii viscosi.	<i>Ceraustii.</i>
5. C. Buxi semper virentis.	<i>Buxi.</i>
6. C. Fagi syluaticae.	<i>Fagi.</i>
7. C.	

- Sorbi.* 7. C. Sorbi aucupariae.
Amygdali. 8. C. Amygdali persicae.
Calthae. 9. C. Calthae palustris.
Vrticae. 10. C. Vrticae dioicae.
Betulae. 11. C. Betulae albae.
Alni. 12. C. Betulae Alni.
Abietis. 13. C. Pini Abietis.
Salicis. 14. C. Salicis viminalis et fragilis.
Fraxini. 15. C. Fraxini excelsioris.
Aceris. 16. C. Aceris platanoidis.
Ficus. 17. C. Ficus Caricae.

174. COCCVS. *Rostrum* vagina setisque pe-
ctoralibus.

Antennae filiformes.

- Hesperi-* 1. C. hybernaculorum.
dum.
Anoni- 2. C. indarum arborum.
dum.
capensis. 3. C. ouatus subtomentosus conico gibbus, apice opercula-
to. Linn. Syst. Nat. 2. 740. 3. Amoen. Acad. 6.
401. 47.
 Habitat in Gnaphalio muricato Cap. Bon. Spei.
Adoni- 4. C. Adonidum.
dum.
Quercus. 5. C. Quercus Roboris.
Ilicis. 6. C. Quercus cocciferae.

7. C.

7. C. Ficus religiosae et indicae.	<i>Ficus.</i>
<i>Coccus Lacca</i> Rerr. Act. Engl. 1781. 374. fig. a. b.	
Habitat in Indiae orientalis. Ficu religiosa et indica Gummi Lacca proponens.	
Corpus rubrum. Antennae ramosae. Cauda bifida.	
8. C. Vlmi campestris.	<i>Vlmi.</i>
9. C. Coryli auellanae.	<i>Coryli.</i>
10. C. Betulae albae.	<i>Betulae.</i>
11. C. Carpini Betuli.	<i>Carpini.</i>
12. C. Tiliae europeae.	<i>Tiliae.</i>
13. C. Ruscii.	<i>Rusci.</i>
14. C. Myricae querci foliae. Linn. Syst. Nat. 2. 741. 13. Habitat in Myrica quercifolia Cap. Bon. Spei.	<i>Myricae.</i>
15. C. Salicis capreae.	<i>Salicum.</i>
16. C. radicis Hieracii Pilosellae.	<i>Pilosellae.</i>
17. C. radicis Vuæ vrsi.	<i>Arbuti.</i>
18. C. radicum Phalaridis.	<i>Phalari- dis.</i>
19. C. Crataegi oxyacanthae.	<i>Crataegi.</i>
20. C. Serratulae arvensis.	<i>Serratu- lae.</i>
21. C. Vitis viniferae.	<i>Vitis.</i>
22. C. Zosteræ marinae.	<i>Zosteræ.</i>
23. C. radicis Sileranthi perennis.	<i>polonicus.</i>
24. C. Cacti coccinelliferi.	<i>Cacti.</i>

175. THRIPS. *Rostrum* obsoletum intra os
absconditum.

Antennae filiformes.

physapus. 1. T. elytris glaucis, corpore atro.

juniperi- 2. T. elytris niueis, corpore fusco.

na.

Vlmi. 3. T. nigra, alis niueis ciliatis, ano acuminato.

minutissi- 4. T. elytris corporeque glaucis, oculis fuscis.

ma.

Vrticae. 5. T. flava, elytris albidis.

fasciata. 6. T. elytris albo nigroque fasciatis, corpore fusco.

CLASSIS VIII.

ANTLIATA.

176. OESTRVS. *Haustellum retractum intra labia connata poro pertusa.*

Antennae setariae.

1. O. griseus, facie alba nigro punctata. *buccatus.*
2. O. thorace flavo: fascia nigra, alis albis fusco fasciatis. *Bouis.*
3. O. alis immaculatis, thorace flavo: fascia nigra, abdomine fulvo apice nigro. *Tarandi.*
4. O. alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro: pilis flavis. *Equi.*
 - α. *Oestrus nasalis* Sp. Inf. 2. 399. 4.
 - β. *Oestrus haemorrhoidalis* Sp. Inf. 2. 399. 5.
 - α. et β. merae varietates nullo inodo specie sed tantum loco diuersae.
5. O. alis subpunctatis, abdomine nigro alboque versi- *Ouis.*
colore.
Praecedentibus paullo minor.

177. TIPVLA. *Haustellum absque vagina.*

*Palpi duo porrecti, filiformes
ad basin proboscidis.*

Antennae filiformes.

* *Alis patentibus.*

1. T. antennis pectinatis, alis macula nigra, abdomine basi pectinato rufo, medio flavo fasciato, apice atro. *pedini-*
cornis.
2. T. alis hyalinis: riuulis maculaque nivea. *riuojs.*

- sinuata.* 3. T. alis albis: margine sinuato maculisque fuscis, corpore cinereo, pedibus ferrugineis.
- maculata.* 4. T. alis fusco venosis: margine maculisque quatuor fuscis, abdomine supra flauescente.
- crocata.* 5. T. alis macula fusca, abdomine atro: fasciis fuluis.
- hortorum* 6. T. alis hyalinis: maculis sparsis obsoletis.
- oleracea.* 7. T. alis hyalinis: costa marginali fusca.
- tricolor.* 8. T. alis albidis: margine exteriori neruoque apice bistris, do fuscis.
- triangulalis.* 9. T. alis dimidiato fuscis: macula triangulare alba.
- variega-* 10. T. nigra, abdominis basi lateribusque rubris flauo ma-
ta. culatis.
- contami-* 11. T. atra, alis albis: fasciis duabus punctoque nigris.
nata.
- lunata.* 12. T. alis cinerascentibus: lunula marginali alba, corpo-
re flauescente.
- turcica.* 13. T. alis venosis: lunula marginali alba, corpore cine-
reo, abdomine linea dorsali nigra.
- Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
- Statura omnino T. lunatae. Corpus cinereum linea
dorsali lata abdominis nigra. Pedes nigri femori-
bus testaceis. Alae nigro venosae lunula margin-
li alba.
- pratenis.* 14. T. thorace variegato, abdomine fuscō: lateribus flauo
maculatis, fronte fulua.
- dorsalis.* 15. T. flauescens, dorso fuscō, alis hyalinis: macula mar-
ginali nigra.
- plumbea.* 16. T. fuscō cinerea, alis albis: costa neruisque nigris.
- cornicina.* 17. T. alis hyalinis: puncto marginali fuscō, abdomine
flauo: lincis tribus fuscis.

18. T. alis glaucis: puncto marginali corporeque atris, *atrata*.
abdominis segniente primo pedibusque rufis.
19. T. alis fuscis, corpore atro. *nigra.*
20. T. nigra, femoribus testaceis tarsisque posticis albis. *albimana*
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
Media. Caput atrum ore testaceo. Thorax ater, nitidus, immaculatus. Abdomen nigrum macula una altera obsoleta apicis ferruginea. Pedes elongati nigri femoribus testaceis tarsisque posticis albis.
21. T. fusca, tarsis albo annulatis medio ouatis incrassatis. *clavipes.*
22. T. alis hyalinis: maculis duabus fuscis, abdominis bimaculato ferrugineo, antennis pluinosis. *bimaculata.*
23. T. alis fusco variegatis, femoribus annulo albo. *annulata.*
24. T. alis albidis: maculis plurimis ocellaribus nigrican- *ocellaris.*
tibus.
25. T. alis albidis: punctis tribus fuscis, corpore cinereo *cinerea.*
immaculato.
26. T. alis albidis: fasciis quatuor fuscis flexuosis, abdo- *fasciata.*
mine flauente.
27. T. testacea, capite lineaque thoracis dorsali nigris, *melanocer-*
alis hyalinis: strigis tribus fuscis. *phala.*
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Perua. Caput valde porrectum cum antennis nigrum.
Thorax gibbus, testaceus linea dorsali nigra. Abdomen cylindricum, testaceum linea dorsali baseos nigra. Alae hyalinae strigis tribus abbreviatis fuscis.
Pedes testacei genubus fuscis.
28. T. alis albis: punctis tribus marginalibus fuscis, tho- *6 punctata-*
race compressio fuluo: linea dorsali nigra. *ta.*
29. T. fusca, alis obscuris cinereo maculatis maculisque *flavipes.*
tribus costalibus fuscis, pedibus flaucentibus: geniculis fuscis,

Habitat Kiliae.

Media. Caput et thorax fusca, immaculata. Halteres flavi annulo fuso ante apicem. Abdomen fuscum segmentorum marginibus flauis. Pedes elongati flavescentes geniculis fuscis. Alae obscurae maculis cinereis sparsis maculisque tribus distinctis fuscis in margine crassiori.

- tripunctata.* 30. T. alis hyalinis: punctis tribus marginalibus fuscis, corpore flauo.

- ✓ *flavescens* 31. T. alis immaculatis, corpore flauo.

- ✓ ~~Regula~~ *vegetationis.* 32. T. alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo fuso.

- pilipes.* 33. T. cinerea, alis striatis fuscescentibus, tibiis anticus pilosis.

Habitat Kiliae.

Media. Corpus cinereum thorace substriato. Abdomen planum, cinereum ano rufo. Alae fuscescentes nigro striatae punctoque postico fuso, distincto. Pedes flavescentes tibiis anticus pilosis.

- morio.* 34. T. alis albis: punto marginali fuso, atra pedibus pallidis.

Habitat Kiliae.

Paura. Corpus atrum, immaculatum. Alae albae puncto marginali fuso. Pedes pallidi, immaculati.

- replicata.* 35. T. alis hyalinis: margine tenuiori recurvato, corpore fuso, antennis simplicibus.

- monoptera.* 36. T. nigra pedibus palpisque pallidis.

** *Alis incumbentibus.*

- ✓ *plumosa.* 37. T. thorace virescente, aliis albis: punto fuso, antennis plumosis.

- ✓ *motitrix.* 38. T. pedibus anticus maximis motatoriis: annulo albo.

- pilicornis.* 39. T. pedibus anticus maximis motatoriis nigricans thorace lineato, aliis albis immaculatis.

Habi-

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura omnino T. fasciculatae at paullo maior. Antennae magnae fasciculato plumosae. Thorax obscure cinerascens, nigro lineatus. Abdomen nigrum. Alae albae omnino immaculatae. Pedes omnes nigri.

40. T. pedibus anticis maximis motatoriis nigra, abdōminis lateribus ferrugineo maculatis. *fasciculata.* ✓
41. T. ferruginea, alis albis immaculatis, pedibus anticis tendens. longissimi pallidis. ✓
42. T. pedibus anticis longissimis motatoriis nigris; annulis albis. ✓
43. T. pedibus anticis motatoriis omnibus pallidis, alis *flexilis.* fascia fuscescente.
44. T. pedibus anticis maximis motatoriis apice albis. *vibratoria.* ✓
45. T. pedibus anticis elongatis fusca, abdōmine flauescente, alis albo nigroque variis. *varia.*

Habitat Kiliae.

Media inter congeneres. Caput et thorax fusca immaculata. Abdomen flavum. Alae albo fuscoque valde variegatae. Pedes flauescentes, antici parum elongati.

46. T. atra, pedibus rufis, alis medio nigris basi flauescientibus. *rufipes.* Linin. Syst. Nat. 2. 979. 62. Fn. Su. 1778. ✓

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Descriptio Faunae suecicae omnino concurrit, at magnitudo T. plumosae.

47. T. nigra, abdōminis segmentis apice albis, alis punctato fusco. *striatica.* ✓
48. T. pallida pilosa, pedibus nigro punctatis. *pallida.*
49. T. fusca, thoracis linea laterali pedibusque albidis *plumosa.* *plumosa.*

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Summa affinitas *T. pallidae*, at pedes omnino immaculati. Antennae flabellatae. Alae ciliatae albidae.

- flabelli-* 50. *T. pallido*, abdome nigro annulato, alis maculatis.
cornis.
cincta. 51. *T. livida*, alis maculis tribus marginalibus nigris, abdome nigro albo annulato.
- Arundi-* 52. *T. albida*, antennis villosis, oculis atris.
neti.
- litoralis.* 53. *T. virescens*, alis immaculatis, pedibus anticis longissimis.
- monilis.* 54. *T. pedibus albis*: annulis nouem nigris, alis albo cinereoque variis.
- Zonata.* 55. *T. pallida*, alis fasciis duabus punctisque tribus fuscis, femoribus angulo fusco.
- macroce-* 56. *T. virescens*, oculis thoracisque tergo nigris.
phala.
- viridula.* 57. *T. viridis*, antennis verticillato pilosis, pedibus pallidis.
- genicula-* 58. *T. subfuscus flavescentia*, thorace lineis, abdome dorso nigris, alis albis immaculatis.
- Habitat Kiliae Dom. Daldorf.
- Corpus paruum flavescentia. Caput flavescentia. Thorax supra lineis tribus niger, lateribus marginalibus anticum haud attingentibus. Abdominis dorsum nigrum. Alae albae, immaculatae. Pedes pallescentes geniculatis nigris.
- pallipes.* 59. *T. glabra fusca*, alis hyalinis immaculatis, pedibus pallescentibus.
- Habitat Kiliae.
- Parua. Corpus totum fuscum, immaculatum. Alae hyalinae, nitidae. Pedes pallescentes.
- pusilla.* 60. *T. viridis*, thoracis tergo maculis tribus nigris, antennis maris plumosis.
- brevicornis.* 61. *T. nigra glabra*, alis margine nigricantibus, abdome fuscum, tibiis anticis spinosum.

62. T. alis hyalinis: margine exteriori nigro. *hortulana.* ✓
 63. T. nigra glabra, alis albis: puncto nigro, antennis *Iohannis:* breuibus, pedibus nigris. *Iohannis:* ✓
 64. T. nigra glabra, alis hyalinis: puncto nigro, femoribus ferrugineis. *Pomona.* ✓
 65. T. atra glabra, thorace rufo. *ruficollis.*

66. T. atra glabra, abdomine basi rufo, antennis incrassatis pilosis. *Chrysanthemi.*

Habitat in Hispaniae Chrysanthemo coronario Dom. Vahl.

Statura omnino et magnitudo T. Thomae. Caput et thorax nigra, glabra, immaculata. Abdomen cylindricum basi rufum, apice nigrum. Alae obscurae. Pedes nigri. Antennae singulares vix huius generis articulo primo maiori, cylindrico, crassiori, piloso, secundo breuiori subulato.

Aliam simillimam itidem e Hispania misit Dom. Vahl, at abdomine nigro toto, forte mera varietas sexus.

67. T. atra glabra, alis nigris, abdominis lateribus linea Thomeae crocea. Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 6. 7. ✓

68. T. atra oblonga hirta, alis costa nigricante. *febrilis.* ✓

69. T. atra hirta, pedibus ferrugineis, posticis elongatis. *spurcipes.* ✓

70. T. abdomine cylindrico atro, alis fusco hyalinis, ano forcipata: appendiculato. ✓

71. T. cinerea, alis albis: margine villoso. *juniperina.* ✓

72. T. hirsuta, alis deflexis ouatis ciliatis albo nigroque tessellatis. *hirta.* ✓

73. T. alis deflexis cinereis ouato lanceolatis ciliatis. *phalaenoides.* ✓

74. T. atra, alis incumbentibus subciliatis. *Priscaria-vire.* ✓

75. T. cinerea, pedibus pallidis, alis maculis duabus nigricantibus. *culicifrons.* ✓

- paluſtris.* 76. T. pallida, capite atro, abdomen rufescente.
longicor- 77. T. antennis corpore incarnato longioribus.
nis.
sericea. 78. T. nigra, dorso atro, thoracis lateribus caluis, hal-
teribus flauis.
pulicaris. 79. T. nigra, thoracis lateribus, scutello abdome neque
pennicor- 80. T. antennis bipectinatis, corpore atro, halteribus
nis. albis.

178. BIBIO. *Hauſtellum* fetis tribus vaginaque
vniualui.

Palpi breuiffimi.

Antennae basi connatae acumi-
natae.

- filata.* 1. B. antennis subclauatis nigra, abdominis segmento se-
cundo lateribus pellucido, femoribus posticis serratis.
illucens. 2. B. abdominis nigri segmento secundo lateribus pellu-
cidis, plantis albis.
bilineata. 3. B. atra, thorace lineis duabus albis, tibiis basi ferru-
giueis.
aenea. 4. B. nigra tomentosa, abdome aeneo.
plebeja. 5. B. cinereo hirta, abdome conico, segmentis margi-
ne albis.
margina- 6. B. atra, abdome conico, segmentis margine albis, alis
ta. maculatis.
nobilita- 7. B. ferrugineo hirta, abdome conico fuluo, ano atro.
ta.
lugubris. 8. B. hirta atra, ore cinereo, tibiis testaceis.
Habitat Kiliae.
Statura omnino B. anilis at tota hirta atra. Os cinereo
pilosum. Alae albidae, immaculae. Pedes testa-
ci femoribus nigris.

9. B. villosa albo canescens, alis hyalinis. *anilis.*
10. B. fusca, alis nigris albo variegatis, scutello piceo. *nigrita.*
11. B. hirta fusca, abdomine vtrinque maculis duabus al- *Lar.*
bis, alis nigris macula marginali apiceque albis.
12. B. hirta atra, alis nigris apice hyalinis. *Morio.*
13. B. hirta atra albo fasciata, alis nigris: margine tenuio- *Maura.*
re sinuato hyalino.
14. B. hirta atra, alis nigris apice albis: punctis duobus *Aethiops.*
ano argenteo.
15. B. hirta fusca, abdomine albo maculato: lateribus ser- *capucina.*
rugineis, alis albo nigroque variis.
16. B. fusca, abdomine atro: segmento primo basi, vlti- *Satyrus.*
mis lateribus albis.
- Habitat et in China.
17. B. hirta flauescens, alis hyalinis: costa fusca. *Hotten-*
totta.
18. B. fusca, abdomine albo strigoso, alis basi fuscis: pun- *Sylanus.*
cto albo.
19. B. hirta atra, abdomine segmentorum marginibus al- *Sabaeus.*
bidis, alis albis basi exteriore nigris.
Aliam simillimam ex Hispania misit Dom. Vahl, at seg-
mentorum marginibus lateribus tantum flavis.
20. B. hirta flauescens, alis fuscis, femoribus testaceis. *Sphinx.*
Habitat in India orientali:
Statura et summa affinitas B. lucifer at duplo fere ma-
ior. Corpus supra subtusque totum hirtum, flau-
escens. Alae fuscae margine tenuiori pallidiori. Fe-
mora omnia testacea. Tibiae posticae supra testa-
ceae.
21. B. hirta flauescens, alis fuscis basi ferrugineis. *Lucifer.*
22. B. hirta fusca, alis hyalinis: macula marginali bascos *Troglodyta.*
argentea.

179. STRATIOMYS. *Haustellum* feta vnica
absque vagina.*Palpi* breues, capitati.*Antennae* acuminatae,
basi connatae.

- testacea.* 1. S. scutello bidentato testacea, abdominis primo segmento fuscescente.

Habitat in America meridionali.

Magna glabra. Caput testaceum oculis nigris. Thorax sublineatus, testaceus scutello bidentato nitido immaculato. Abdomen testaceum, nitidum primo segmento basi fuscescente. Pedes testacei. Alae testaceo colore tinctae.

- chamaeleon.* 2. S. scutello bidentato luteo, abdomine nigro: fasciis lateralibus luteis.

- splendens.* 3. S. scutello bidentato aureo tomentosus, abdomine fasciis nigris.

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Statura et magnitudo omnino S. chamaeleontis. Antennae nigrae. Corpus tomentoso aureo splendens abdominis segmentis basi nigris.

4. S. scutello bidentato, thorace rufo vtrinque spinoso.

5. S. scutello bidentato nigro, abdomine atro: maculis duabus lateralibus apiceque flavis.

Habitat in Insula St. Crucis Americae meridionalis Dom. Lund.

Magna. Antennae flavae. Os pube aurea. Oculi magni nigri. Thorax fuscus tomento aureo villosus. Scutellum bidentatum, atrum. Abdomen atrum maculis duabus lateralibus flavis. Anus flavicat. Pedes testacei femoribus nigris.

- microleon* 6. S. scutello bidentato, abdomine atro: strigis lateralibus albis.

- frigata.* 7. S. scutello bidentato, abdomine atro: subtus strigis albis.
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

8. S.

8. S. scutello bidentato, abdomine supra atro : segmento- *pallipes.*
rum marginibus utrinque albidis.

9. S. scutello bidentato tomentoso grisea, abdomine basi *mutabilis*
nigra, alarum costa ferruginea.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Antennae porrectae, nigrae, basi ferrugineae.

Caput et thorax tomentoso grisea proboscide atra.
Scutellum bidentatum basi pallidum. Abdomen nig-
rum certo situ tomento griseo splendens apice sub-
ferrugineae. Alae albidae costa lata ferruginea. Pe-
des grisei femoribus atris.

10. S. scutello bidentato atra, abdomine supra strigis dua- *fasciata.*
bus albis, subtus argenteo.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae porre-
ctae, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Ab-
domen atrum supra strigis duabus in medio interru-
ptis albis, subtus argenteum, nitidulum. Halterum
clava argentea. Alae albidae costa lata fusca. Pedes
pallescentes femoribus nigris.

11. S. scutello bidentato atra, abdomine subtus rufo. *tigrina.* ✓

12. S. scutello bidentato nigro, abdomine viridi nigro an- *hydroleon* ✓
gulato.

13. S. scutello bidentato viridis, abdomine flauescente: *viridula.* ~
macula apicis atra.

14. S. scutello bidentato, corpore viridi, thorace lineis *trilineata* ✓
abdomine fasciis nigris.

15. S. scutello bidentato flavo, corpore nigro flavo varie- *hypoleon.* ✓
gato. Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 15.

16. S. scutello quadridentato nigra, abdomine albo lineato. *quadrilini-
mata.*

Habitat in Sierra Leon. Dr. Pflug.
Statura et magnitudo S. elanipes. Antennae pilosae ni-
grae apice albae. Caput nigrum orbita oculorum
alba. Thorax niger tomento violaceo. Scutellum
quadridentatum nigrum dentibus flavis. Abdomen
nigrum lineis quatuor longitudinibus albis exte-
ribus, marginalibus. Alae obscurae. Pedes nigri.

- clauipes.* 17. S. scutello sexdentato atra, abdomine ferrugineo.
sexdenta- 18. S. scutello sexdentato, thorace aeneo, abdomine nigro.
ta.
margi- 19. S. scutello inermi nigra, abdominis margine tibiisque
nata. albidis.
mutica. 20. S. scutello inermi atra, abdomine niveo apice atro.
Musca viginosa antennis clauatis mucronatis, abdomi-
 nis dorso albo: segmentis duobus penultimis: striga
 alba. Linn. Synt. Nat. 2. 982. 22.

180. RHAGIO. *Haustellum* fetis tribus abs-
 que vagina.

Palpi duo basi setarum exte-
 riorum inserti.

Antennae filiformes.

- scolopa-* 1. R. cinereus, abdomine flavescente trifariam nigro pun-
ceus. ctato, alis nebulosis.
tringa- 2. R. cinereus, abdomine flavescente trifariam nigro pun-
rius. ctato, alis immaculatis, thorace vnicolore.
vermilio. 3. R. cinereus, abdomine trifariam nigro punctato, alis
 immaculatis, thorace maculato.
lineatus. 4. R. thorace lineato, abdomine nigro, alis hyalinis: ma-
 cula apiceque fuscis.
fuscatus. 5. R. thorace cinereo nigro lineato, abdomine fuscō, alis
 macula marginali nigra: puncto cinereo.
Tipula fuscata Spec. Inf. 410, 57.
Musca fuscata nigricans, alis antice albo nigroque va-
 riis. Fn. Su. 2310.
 Habitat in Suecia.
fasciatus. 6. R. testaceus, abdomine nigro fasciato, alis hyalinis:
 macula apicis fusca.
tipulifor- 7. R. fuscus alis albis apice nigris.
mis.

8. R. thorace ferrugineo, abdome atro: maculis latera- *flavipes*.
libus flavis.

9. R. abdome nigro segmentorum marginalibus albis, *macula-*
alis fusco hyalinis: maculis duabus nigris. *tus*.

10. R. nigricans, thorace cinereo: lineis duabus nigris, *punctatus* ✓
alis hyalinis: maculis marginalibus nigris.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parnus. Caput nigrum antennis filiformibus. Tho-
rax cinereus lineis duabus dorsalibus abbreviatis ni-
gris. Abdomen planum, nigrum abdominis segmen-
tis margine parum pallidis. Alae hyalinae margine
crassiori in medio maculis aliquot nigris. Pedes ni-
gri femoribus testaceis.

11. R. testaceus, maculis abdominalis lateralibus nigris, an- *longicor-*
- *ennis longissimus*.

12. R. testaceus, abdome nigro fasciato, alis hyalinis ni- *cinctus*.
gro maculatis.

Habitat Kilise Dom. Daldorf.

Statura omnino praecedentium. Caput globosum, te-
staceum antennis filiformibus nigris corpore duplo
breuioribus. Thorax testaceus, immaculatus. Ab-
domen testaceum segmentis basi nigris. Pedes testa-
cei geniculis nigris. Alae hyalinae maculis plurimis
paruis sparsis nigris.

13. R. cinereus, alis albis: macula marginali fusca. *diadema*. ✓
Varietatem e Dania duplo maiorem accepi vix di-
stinctam.

14. R. ater immaculatus, alis hyalinis: macula marginali *atratus*. ✓
nigra.

15. R. ater, abdominalis incisuris tibiis tarsisque albis. *colomba-*
schen sis.
Bibio sanguinarius Pall. Itin. I. App. 23.

Oestrus Grill. Itin.

Habitat in Seruia, Bannatu in initio veris et sub fine
aestatis copiosissime proueniens, obruit pecora et in-
trat partes nobilissimas venenatoque mortu intra 4-5
horas ea enecat. Arrectur sumo.

Culi-

Culice pipiente duplo minor. Corpus nigrum. Abdomen incisuris albidis. Femora nigra tibialis tarsisque albidis.

181. SYRPHVS. *Haustellum* setis quatuor absque vagina.

Palpi duo basi setarum exteriorum inserti.

Antennae breues subclauatae, setariae.

* *Antennis seta plumosa.*

✓ *bombylans.* 1. S. antennis plumatis tomentosus niger, abdomine postice rufo.

Conops pocopyges Pod. Mus. Graec.

✓ *mystacea.* 2. S. antennis plumatis tomentosus niger, thorace abdminisque apice flavis.

mystans. 3. S. antennis plumatis tomentosus, thorace fuluo, abdmine virescente.

✓ *tapporum* 4. S. antennis plumatis tomentosus niger, scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis interruptis.

✓ *apiarius.* 5. S. antennis plumatis tomentosus, thorace antice flavo, abduminis apice albo, alis apice ferrugineis.

inanis. 6. S. antennis plumatis nudus, abdomine ferrugineo pellicido.

✓ *erassus.* 7. S. antennis plumatis nudus niger femoribus posticis vñidentatis rufis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Magnitudo et statura S. obesi. Caput crassum, obscurum. Thorax niger, immaculatus, squamia halterum alba apice nigra. Abdomen nigrum, nitidulum singulo segmento annulo impresso. Alae albae basi puncto que transuerso in medio nigris. Femora et tibiae rufa apice nigra. Tarsi nigri. Femora postica subtus vñidentata.

8. S.

8. S. antennis plumatis nudus, thorace flavo lineato, ab- *vacuus*.
domine flavo pellucido: cingulis nigris.

9. S. antennis plumatis nudus, alis maculis duabus fuscis, *obesus*.
corpore aeneo.

** *Antennis seta nuda.*

10. S. antennis setariis nudus, thorace nigro albo macula- *pinguis*.
to, abdomine testaceo: fascia alba.

11. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineis qua- *pendulus*.
tuor, abdomine fasciis tribus flavis.

12. S. antennis setariis tomentosus, thorace nigro fascia- *floreus*.
to, abdomine flavo: segmentorum marginibus linea-
que dorsali atris.

13. S. antennis setariis tomentosus, abdomine ferrugineo: *subcoleo-*
dorso nigro, alis crassioribus. *ptratus*.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 6.

14. S. antennis setariis tomentosus, abdomine atro: *cin-*
gulis tribus albis; primo segmento lateribus luteo.

15. S. antennis setariis tomentosus niger, scutello abdo- *agrorum*.
minisque lateribus ferrugineis.

Habitat in America Dom. Lund.

Statura et magnitudo S. arbustorum. Frons cinereo to-
mentosa linea media antennisque nigra. Thorax
tomentosus niger, scutello magno ferrugineo, imma-
culato. Abdomen ferrugineum linea longitudinali
atra, quae tertium segmentum totum occupat. Mar-
ginis segmentorum in hac linea dorsali atra albidi.
Alae hyalinæ. Pedes nigri geniculis nigris.

16. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineato, abdo- *aruorum*.
mine nigro: cingulis tribus flavis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas S. nemorum at distinctus.
Thorax flavescentis lineis quatuor longitudinalibus
nigris. Scutellum subaeneum margine flavescente.
Abdomen nigrum cingulis tribus flavis. Pedes pal-
lidi, postici obscurores. Alae albae,

- hortorum* 17. S. antennis setariis tomentosus, thorace subfasciato, abdome fasciis tribus albis, pedibus posticis incrassatis ferruginalis.
- arbuscio-* 19. S. antennis setariis tomentosus, abdome nigro: seg-
rum. mento primo secundoque latere ferrugineis.
- pratorum* 19. S. antennis setariis tomentosus niger, thorace fasciis punctisque duobus, abdome maculis vtrinque tri-
bus flauis.
Femora posticae unidentatae.
- fruteto-* 20. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineis duabus
rum. flauis, abdome ferrugineo: linea dorsali interru-
ta nigra.
- ericeto-* 21. S. antennis setariis subtomentosus, thorace aeneo:
rum. lateribus flauis, abdome fulvo: striis tribus atris.
- tenax.* 22. S. antennis setariis tomentosus, thorace griseo, abdo-
mine fusco, tibiis posticis compresso gibbis.
- trilinea-* 23. S. antennis setariis tomentosus, thorace pallido: li-
tus. neis nigris, abdome atro: fascia baseos interrupta
ferruginea.
- quadrili-* 24. S. antennis setariis, thorace flavescente: lineis qua-
neatus. tuor aeneis, abdome ferrugineo apice nigro: stri-
ga alba.
Habitat Tranquebariae Dom. Lund.
Magnus. Frons flava antennis ferrugineis seta nuda.
Thorax flavescentis lineis quatuor aeneis nitidis. Ab-
dominis segmentum primum et secundum rufum mar-
gine nigro, tertium nigrum stria albida. Alae albae,
maculatae. Pedes ferruginei tibiis nigris.
- quinqueli-* 25. S. antennis setariis tomentosus, thorace quinqueli-
neatus. neato, abdome nigro: segmentis basi albis.
- intrica-* 26. S. antennis setariis tomentosus lutescens, abdome
rius. nigro apice genubusque albis.
- oestraceus* 27. S. antennis setariis nigra, scutello albido, abdominis
apice lutescente.

28. S. antennis setariis, thorace tomentoso flavescente, *afiliforme*
abdomine atro: segmento primo secundoque albi-
cantibus.
29. S. antennis setariis tomentosus, thorace griseo, abdo- *lucorum*.
mine atro: segmento primo toto albo.
30. S. antennis setariis tomentosus fuscus, fronte squa, *fallax*.
abdominis apice tomentoso, fulvo, squama halterum
laetea.
31. S. antennis setariis tomentosus niger, abdominis vlti- *syluarum*.
mo segmento tomentoso flavo.
32. S. antennis setariis elongatis nudus ater, alis cyaneis, *magritae*.
33. S. antennis setariis tomentosus cinereus, thorace fa- *clauipes*.
scia nigra, abdominis apice fulvo, femoribus posticis
arcuatis.
34. S. antennis setariis elongatis niger, thorace lateribus *bicolorius*.
punctis abdomeisque cingulis duobus flavis.
35. S. antennis setariis elongatis niger, thorace maculis *arcuatus*.
laferalibus, abdome cingulis quatuor arcuatis flavis.
36. S. antennis setariis tomentosus abdome atro: seg- *cingula-*
mento primo basi, reliquis punctis albis. *tus*.
37. S. antennis setariis tomentosus niger, fronte thoracis *Zonatus*.
antico quoque cinereis, abdominis primo segmento
albido.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statuta et magnitudo omnino praecedentis. Caput ci-
nereum vertice nigra. Thorax antice cinereus po-
stice niger. Abdominis primum segmentum maius
albido subpellucidum apice nigrum. Annus cinereo
tomentosus. Alae atbae basi maculaque media fusca.
Pedes nigri postici compreli.

38. S. antennis setariis tomentosus, thorace cinereo fascia *errans*.
scutelloque nigris, abdome nigro: lateribus basi
flavis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput tomentosum album vertice parum nigricante. Thorax tomentosus, cinereus fascia media lata nigra. Scutellum nigrum. Abdomen magis glabrum, nigrum segmento primo secundoque lateribus flavis. Alae albae basi obscuriores. Pedes nigri geniculis albis femoribusque posticis basi testaceis.

- ✓ *mutabilis.* 39. S. antennis setariis elongatiis tomentosus, thorace immaculato, abdomine nigro griseoque mutabili.
- deuius.* 40. S. antennis setariis tomentosus, thorace coeruleocente, abdomine obscure violaceo.
- ~~*leucopus.*~~ 41. S. antennis subclauatis niger, plantis albis.
- ✓ *signis.* 42. S. antennis setariis nudus, thorace aeneo, abdomine ferrugineo apice nigro.
- ✓ *femora-* 43. S. antennis setariis tomentosus, thorace subaeneo, fe-
tus.
- , *dentipes.* 44. S. antennis setariis nudus, thorace quadrilineato, ab-
domine clavato, femoribus posticis incrassatis den-
tatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo S. femorati. Caput magnum glo-
bosum, nigrum labio villoso albo. Thorax niger
lineis quatuor integris albis. Scutellum nigrum mar-
gine albido. Abdomen elongatum segmento primo
plano attenuato nigro maculis duabus oblongis dar-
salibus hyalinis secundo cylindrico nigro basi palli-
do, tertio ouato, crassiori, purpurascenti atro, nitido.
Pedes fusci femoribus posticis incrassatis apice
dente valido acuto armatis.

- ✓ *conopseus* 45. S. antennis setariis nudus niger, thorace lineis latera-
libus, abdomine fasciis tribus flavis.
- ✓ *ichneu-* 46. S. antennis setariis elongatis cylindricis niger, fron-
moneus. te thoracis postico pedibusque ferrugineis.
- ✓ *sphegeus.* 47. S. antennis setariis elongatis niger, pedibus rufis.

48. S. antennis setariis nudus ater, alis nigris: margine *cylindri-*
tenuiori albo maculato. *cus.*
49. S. antennis setariis nudus, thorace aeneo, abdomine *elongatus* ✓
clavato nigro: fasciis duabus flavis.
50. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomi- *podagri-* ✓
ne cingulis sex flavis.
51. S. antennis setariis tomentosus, thorace variegato, ab- *crabroni-*
domine flavo: segmento primo secundoque apice *fornitus*.
fuscis.
52. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomi- *diophtal-* ✓
ne cingulis sex flatis, femoribus posticis dentatis. *mus.*
53. S. antennis setariis nudus, thorace maculato, abdomi- *vespifor-* ✓
ne cingulis sex flavis.
54. S. antennis setariis nudus, thorace lineis lateralibus, *festivus*. ✓
abdomine cingulis quatuor flavis interruptis.
55. S. antennis setariis tomentosus, thorace lineato, abdo- *ruficornis* ✓
mine aeneo, alis maculatis.
56. S. antennis setariis tomentosus obscure aeneus, anten- *flavicor-* ✓
nis tibiisque flavescentibus. *nis.*
57. S. antennis setariis tomentosus niger, abdomine atro *sepulchra-* ✓
nitidulo. *lis.*
58. S. antennis setariis niger immaculatus, alis albis: ma- *lugubris*. ✓
cula fusca.
59. S. antennis setariis nigro aeneus, abdomine depresso *coemitor-* ✓
atro nitido, alis nigricantibus. *riorum.*

Musca coemitoriorum antennis setariis nigra, abdomi-
ne supra glabro subuiolaceo. Sp. Inf. 2. 446. 39.

Habitat in Europa.

Statura omnino F. metallini et paullo major. Caput
nigro aeneum, nitidum antennarum clava flava. Tho-
rax nigro aeneus. Abdomen depresso, planum,
atrum obscure nitidum. Alae nigricantes. Pedes
nigri.

- ✓ *metallinus*. 60. S. antennis setariis nigro aeneus nitens, antennis nigris.
- ✓ *glaucus*. 61. S. antennis setariis subtomentosus niger, abdomine basi pellucido, cingulisque duobus albidis interruptis.
- ✓ *noctilucus*. 62. S. antennis setariis subtomentosus ater, abdominis primo segmento maculis duabus pellucidis.
- ✓ *gibbosus*. 63. S. antennis setariis tomentosus fuscus, abdomine subgloboso atro: cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis.
- Nemotelus* Schaeff. Icon. tab. 200. fig. 1.
- globosus*. 64. S. antennis setariis subtomentosus, thorace antice ferrugineo, abdomine subgloboso pallido apice nigro.
- ✓ *orbicularis*. 65. S. antennis setariis nudus ater abdomine apice albo.
Habitat Kiliae.
- Parvus. Caput parvum, globosum, atrum. Thorax nudus, ater, nitidus. Squamae halterum magnae buccatae, albae. Abdomen globosum, atrum apice pallidum. Alae albae, immaculatae. Pedes pallidi.
- ✓ *Ribesii*. 66. S. antennis setariis nudiusculus, thorace immaculato, abdomine cingulis quatuor flavis: primo interrupto.
- ✓ *Pyraustri*. 67. S. antennis setariis nudiusculus niger, thorace immaculato: abdomine bis tribus lunulis albis recurvatis.
- ✓ *Mentha-stri*. 68. S. antennis setariis nudus niger, thorace maculato, abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis.
- ✓ *Thyma-stri*. 69. S. antennis setariis tomentosus, thorace subaeneo, abdomine atro: fasciis tribus albidis; secunda interrupta.
- Salviae*. 70. S. antennis setariis nudus flavus, thoracis dorso segmentorumque marginibus abdominis nigris.
Habitat in Sierra Leon. Africae Dr. Pflug.
- Statura omnino S. mellini at paullo maior. Os flauum antennis fulvis fronteque inter oculos nigra. Thorax flauus dorso nigro, qui color ad marginem antennam extenditur. Scutellum flauum. Abdomen planum,

num, flauum, nitidum segmentorum marginibus omnibus atris. Pedes flavi.

71. *S. antennis setariis nudus, thorace aeneo nigro, abdome atro: maculis duabus flavis.* *Rosarum.*

Habitat Hafniac Dom. Lund. in floribus.

Statura *S. mellini* at omnino aliis et distinctus. Caput atrum, nitidum. Thorax aeneo ater, nitidus, immaculatus. Abdomen planum, serum macularum flauarum pari. Interdumi posticae maculae adhuc duas aliae, minores. Pedes nigri tibiis quatuor anticus flavis. Alae albae macula magna obsoleta fusca ad marginem.

72. *S. antennis setariis nudus, thorace subaeneo immaculato, abdome maculis octo lutescentibus.* *mellinus.*

Huius plures sunt aut species, aut varietates.

73. *S. antennis setariis nudus, thorace lineis abdomine scriptus. que linearī fasciis flavis.* *scriptus.*

74. *S. antennis setariis tomentosus, abdome flavo: segmentorum marginibus nigris: fascia flava.* *nettareus.*

Habitat in Daniae floribus Dom. Lund.

Statira omnino *S. scripti* at paullo maior. Caput cinereum antennis flavescentibus. Thorax subtomentosus, aeneus lineis quatuor albidis. Scutellum flavesens. Alae albae. Abdominis segmenta basi flava apice nigra fascia flava. Primum segmentum et linea media nigra. Pedes flavi.

75. *S. antennis setariis tomentosus, thorace aeneo, abdome elongato atro: punctis quatuor albis.* *albimus.*

76. *S. antennis setariis nudus ater, alis basi nigris.* *dimidiatus.*

77. *S. antennis setariis nudus, abdome vtrinque maculato, femoribus posticis clavatis dentatis.* *pipiens.*

182. MVSCA. *Haustellum* seta vnicā absque vagina.

Palpi duo porrecti extrorsum crassiores.

Antennae breues clauatae seta instructae.

* *Antennis seta plumata.*

manis. 1. M. antennis plumatis fusca, abdomine pellucido: cingulis tribus nigris.

Conops trifasciatus. Pod. Mus. Graec.

ieiuna. 2. M. antennis plumatis cinerea, abdomine pellucido: ~~cingulis~~ tribus nigris, pedibus pallidis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Statura fere praecedentis. Caput et thorax cinerea, immaculata. Antennae valle plumatae, subferrugineae. Abdomen albo pellucidum cingulis tribus nigris. Pedes pallidi.

pellucens. 3. M. antennis plumatis nigra, abdominis segmento primo pellucido albo.

meridiana. 4. M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte aurea, alis basi ferrugineis.

carnaria. 5. M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitido tessellato.

lardaria. 6. M. antennis plumatis nigra, thorace abdomeque tessellatis.

rutilans. 7. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdome ~~tessellato~~, ano rufo.

maculata 8. M. antennis plumatis cinerea, thorace abdomeque maculis numerosis atris.

Musca maculata antennis plumatis pilosa nigra, thorace nigro lineato, abdome atro maculato, ano bipunctato. Linn. Syst. Nat. 2, 990. 70. huc pertinere videtur.

Musca

Musca maculata Scop. Carn. 870.

Habitat in Europae floribus.

Muscae domesticae paullo maior. Caput cinereum proboscide antennisque atris. Thorax cinereus maculatus longitudinalibus posticaque semiscutellari atris. Abdomen ovatum, cinereum, nitidulum maculis plurimis punctisque duobus ultimi segmenti atris. Subtus in medio lineae duae nigrae. Alae albidae, immaculatae. Pedes nigri.]

9. M. antennis plumatis thorace lineato, abdomine testellato subtus basi pallido.
10. M. antennis plumatis atra, thoracis lateribus Euties americanana nigro punctatis.
11. M. antennis plumatis pilosa, thorace cinereo aeneo, retusa. abdomine subaureo, ano retuso.
12. M. antennis plumatis pilosa viridi nitens pedibus Caesar. nigris.
13. M. antennis plumatis, thorace cupreo nitido, abdome cornicina. viridi aeneo, pedibus nigris.
14. M. antennis plumatis nitens, thorace coeruleo, abdome viridi. cadauerina.
15. M. antennis plumatis viridi rufens, abdomine globo patrida. cyaneo.
16. M. antennis plumatis pilosa, thorace coerulecente, stygia. abdome obscure aeneo, pedibus ferrugineis.
17. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdomine viridi aeneo, pedibus nigris. mortuorum.
18. M. antennis plumatis, thorace aeneo albo punctato, leonina. abdomine coeruleo, ano bipunctato.
19. M. antennis plumatis, thorace nigro, abdomine coeruleo nitente, fronte fulua. vomitoria.
20. M. antennis plumatis thorace abdomineque cyaneis, cyanea. pedibus nigris.

- macella-* 21. M. antennis plumatis, thorace cupreo nigro lineato,
ria. abdomine aeneo, pedibus nigris.
- vulpina.* 22. M. antennis plumatis, thorace lineato, abdomine sub-
ferrugineo nigro maculato.
- coruina.* 23. M. antennis plumatis nigra, abdomine testaceo: linea
dorsali nigra.
- testacea.* 24. M. antennis plumatis cinerea, scutello abdomine pe-
dibusque testaceis.
- pallida.* 25. M. antennis plumatis pallide testacea, ano plantisque
nigris.
- Habitat Hafniae Dom. Lund.
Statura et magnitudo M. testaceae pilis nigris hirta.
Thorax et abdomen pallide testacea. Ultimum ab-
dominis segmentum fuscum. Pedes pallidi apice nigri.
- matans.* 26. M. antennis plumatis testacea, alis punctis duobus ni-
gris: posteriore transuersa.
- Habitat Cajanuae Dom. v. Rohr.
Statura omnino praecedentium. Corpus pilosum to-
tum testaceum, mox obscurius, inox pallidius.
Alae obscurae punctis duobus nigris posteriore trans-
uersa.
- augur.* 27. M. antennis plumatis cinerea, abdomine coerule-
scente: lateribus testaceo diaphanis.
- canina.* 28. M. antennis plumatis setaria cinerea, thorace pun-
ctis, abdomine strigis nigris.
- pleteja.* 29. M. antennis plumatis nigra, pedibus rufis.
- rustica.* 30. M. antennis plumatis grisea, femoribus rufis.
- elata.* 31. M. antennis plumatis setaria pallide testacea, alis pun-
ctis duobus costaque fuscis.
- lupulina.* 32. M. antennis plumatis setaria nigricans, abdomine pe-
dibusque posticis testaceis.

Habitat in Selandia Dom. de Sehestedt.

Parua. Antennae testaceae seta nigra plumata. Thorax niger cinereo nitidulus. Abdomen testaceum, immaculatum. Pedes anteriores nigri, postici testacei. Alae pallide testaceae.

33. M. antennis plunatis fusco ferruginea, abdomine nigro: segmentorum marginibus pallidis.

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Minuta. Caput obscurum orbita oculorum parum argento nitente. Thorax obscure rufus, immaculatus. Abdomen nigrum, nitidum segmentorum marginibus albidis. Alae magnae, hyalinae, immaculatae. Pedes testacei.

** *Antennis seta nigra.*

34. M. antennis setariis nigra, abdominis lateribus testaceo diaphanis.

35. M. antennis setariis pilosa, thorace fusco, abdomini lurida. ne atro: lateribus basi testaceis.

36. M. antennis setariis rufa, abdomine fasciis duabus vifasciata aureis.

37. M. antennis setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis. grossa.

38. M. antennis setariis pilosissima atra, ore albicante. hystrix.

39. M. antennis setariis pilosa atra nitens, alatum basi tremula. squama halteribusque ferrugineis.

40. M. antennis setariis, thorace sublineato, abdomine rotunda- subrotundo ferrugineo: linea longitudinali punctata. rum nigrorum.

41. M. antennis setariis nigricans, scutelli apice subtestaceo, abdomine tessellato. laruarum

42. M. antennis setariis nigra, abdomine cinereo nigro radicum. fasciato.

43. M. antennis setariis nigra, abdomine cylindrico: seg- brasic- mento secundo tertioque rufis. ria.

Variat rarius ab domine ferrugineo linea dorsali baseos nigra.

- tompressa* 44. M. antennis setariis pilosa nigra, thorace lineato, ab domine cylindrico rufo; linea dorsali nigra, femoribus rufis.

Habitat in Hispaniae domibus Dom. Vahl.

Affinis certe M. brassicariae, attamen distincta videtur. Antennae nigrae. Frons vtrinque linea argentea, nitida. Thorax niger lineis tribus argenteis nitidulis. Alae albidae basi parum fluorescentes. Abdomen compresso cylindricum, rufum segmentorum marginibus argento nitidulis linea dorsali nigra. Pedes nigri femoribus rufis.

- lateralis.* 45. M. antennis setariis nigra, abdominis lateribus basi sanguineis.

- canicula-* 46. M. antennis setariis nigricans abdominis segmento se-
cundo tertioque latere diaphanis.

- pluialis.* 47. M. antennis setariis cinerea, thorace maculis quin-
que nigris, abdomine inaculis obsoletis.

- subfultans* 48. M. antennis setariis tota atra, alis hyalinis, femori-
bus posticis saltatoriis.

- tigrina.* 49. M. antennis setariis pilosa cinerea, femoribus apice
tibiisque ferrugineis.

- chorea.* 50. M. antennis setariis atra, alis albis.

- labiata.* 51. M. antennis setariis pilosa nigricans, labio argenteo
nitidissimo, alis albis immaculatis.

Habitat in arboretis Hafnienibus saltatrix Dr. Pflug.

Magnitudo et statura M. roralis. Corpus totum pilo-
sum, nigricans, subtegellatum. Labium villosum,
argenteum, nitidissimum. Alae albae immaculatae
squamis halterum fornicata niuea. Pedes nigri.

- roralis.* 52. M. antennis setariis aterrima, alis apice subalbican-
tibus.

- fenesialis* 53. M. antennis setariis glabra atra, ab domine supra ru-
goso; strigis albis, alis fuscis.

54. M. antennis setariis pilosa obscura, abdomine cincto: punctis quatuor fuscis. *meditata* ^{and. Pleson} *bunda.*
55. M. antennis setariis cinerea alarum costa pilis brevis. *serrata.* Simillimam at duplo minorem e Succia misit Dom. de Paykull.
56. M. antennis setariis pilosa atra, abdomine maculis quatuor apicis cinereis. *maculata.*
Habitat Kiliae.
Paullo maior M. cellaris. Caput atrum ore albo, nitidulo. Thorax pilosus, ater, nitidus, immaculatus scutello eleuato. Squamae halterum magnae, albae. Abdomen oblongum, atrum vltimis duobus segmentis vtrinque macula cinerea. Pedes atri. Aliae albidae, immaculatae.
57. M. antennis setariis nigra, abdomine pallidiore, oculis ferrugineis. *cellaris.*
58. M. antennis setariis atra, abdomine cinerascente, alis meteorica basi subflavis.
59. M. antennis setariis nigra, halteribus plantis postiis *Frit.* abdomineque virescenti pallidis.
60. M. antennis setariis atra nitens, antennis pedibusque *Leprae.* albis, oculis rufo inauratis. Linn. Syst. Nat. 2. 994-91.
Habitat in Elephantiasi Nigritarum Americae.
Corpus Pediculo minus.
61. M. antennis setariis atra, alis albis: costa nigra. *putris.*
62. M. antennis setariis glauco aenea, thorace viridi, ab domine oblongo cupreo, halteribus nudis. *cupraria.* Schaeff. Icon. tab. 209. fig. 32.?
63. M. antennis setariis nitida, thorace aeneo, abdomine aurata, obtuso aureo.
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.
Affinis M. cuprariae at latior magisque obtusa. Caput nigrum. Thorax viridi aeneus, nitidus. Abdomen obtusum, planum, aureum. Alas obscurae.

polita. 64. M. antennis setariis nitida, thorace coeruleo, abdome aeneo, halteribus nudis.

viduata. 65. M. antennis setariis nigro aenea, abdomine aeneo, squamis halterum ciliatis.

pubera. 66. M. antennis setariis nigra, abdominalis ultimo segmento incurvato; pube vtrinque reflexa.

fasciata. 67. M. antennis setariis testacea, abdomine nigro, alis apice fuscis: fascia alba, pedibus elongatis.

petronella. 68. M. antennis setariis livida, fronte rubra, pedibus elongatis testaceis: geniculis nigris.

elongata. 69. M. antennis setariis testacea, pedibus elongatis: tibiis posticis nigris; plantis albis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Statura M. petronellæ at paullo maior. Corpus totum testaceum oculis solis magnis fuscis. Alae hyalinae. Pedes testacei tibiis posticis nigris, plantis alis, vngibus fuscis.

longipes. 70. M. antennis setariis atra, alis fuscis basi fascia punctisque albis, pedibus elongatis testaceis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura praecedentis. Caput magnum, globosum, atrum antennis setariis. Thorax niger, immaculatus. Abdomen elongatum, cylindricum, atrum, nitidum, apice incurvum, humatum. Alae incuinantes fuscae basi fascia media punctisque tribus posticis albis. Pedes elongati, anticus nigris. Postici quatuor testacei ante apicem albi.

annulata. 71. M. antennis setariis nigra, alis hyalinis: fascia fusca, pedibus elongatis nigris; femoribus posticis annulis duabus albis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis. Caput nigrum orbita oculorum parum testacea. Thorax niger, coeruleo nitens, immaculatus. Abdomen petiolatum videtur nobis deest. Alae albae fascia pone medium lituraque apicis.

- apicis fuscis. Pedes elongati nigri, antici ante apicem albi, postici femoribus annulis duobus albis.
72. M. antennis setariis atra, tibiis pallidis, vertice pro-^{Pedago} ~~erifata~~ minulo.
73. M. antennis setariis nigra, pedibus elongatis luteis, ^{corrige-} femoribus annulo nigro. ^{lata.}
74. M. antennis setariis atra, pedibus elongatis pallidis, ^{cursitans.} alis incumbentibus albis.
75. M. antennis setariis atra, alis incumbentibus albis: ^{cimicoi-} fasciis duabus nigris. ^{des.}
76. M. antennis setariis aeneo viridis, cauda vncinata, ^{vngulata.} pedibus elongatis liuidis.
77. M. antennis setariis aeneo viridis, cauda vncinata, ^{nobilitata} alis macula nigra apice alba.
- Schaeff. Icon. tab. 206. fig. 5.
78. M. antennis setariis aeneo viridis, abdomine nigro ^{equestris.} fasciato, cauda vncinata, alis maculatis.
79. M. antennis setariis pilosa, thorace fusco lineato, ab- ^{notata.} domine aeneo, alis fusco nebulosis: puncto atro.
80. M. antennis setariis pilosa nigra, alis fuscis: fasciis ^{arrogans} tribus albis.
81. M. antennis setariis elongatis pilosa aeneo nitens, ab- ^{longicor-} domine obscuriore. ^{nis.}
82. M. antennis setariis aenea, abdomine nigro fasciato, ^{rostrata.} ore corneo prominulo atro.
83. M. antennis setariis pallida, abdomine fasciis quatuor ^{4fasciata} atris, alis albis.
84. M. antennis setariis, thorace aeneo, abdomine cine- ^{diaphana} reo: primo secundoque segmento lateribus diaphanis.
85. M. antennis setariis pilosa grisea, abdomine cinereo ^{luteo} segmentorum marginibus nigricantibus, ^{Gassianus} Hab.

Habitat in Europa haud infrequens.

Magnitudo [M. scybalariae. Caput pallidum antennis testaceis seta nuda. Thorax valde pilosus obscure griseus punctis aliquot indistinctis fuscis. Abdomen pilosum, cinereum, nitidulum segmentorum marginibus atris, subtus magis obscurum. Pedes testacei apice nigri. Alae obscurae.

cucularia 86. M. antennis setariis thorace griseo, abdomine ferrugineo, alis punctis tribus.

scybalaria 87. M. antennis setariis rufo ferruginea, alis puncto obscuriore.

stercora- 88. M. antennis setariis grisea hirta, alis puncto obscuria.

marginalis 89. M. antennis setariis obscure plumbea, alis reticulata: costa atra.

fimetaria. 90. M. antennis subplumatis ltuens glabra, alis puncto obscuriore.

rufifrons. 91. M. antennis setariis cinerea, capite ferrugineo: punctis duobus nigris, alarum costa nigra.

reticulata 92. M. antennis setariis pilosa cinerea, alis obsolete reticulatis: costa albo nigroque punctata.

pennipes. 93. M. antennis setariis pilosa, abdomine rufo, alis nigris: macula ferruginea margineque postico albo.

lugens. 94. M. antennis setariis, thorace flavo lineato, abdome cyaneo, alis nigris: fasciis duabus albis extus bifidis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Dr. Pflug.

Statura M. parietinae at triplo maior. Caput ferrugineum lineis duabus verticalibus nigris. Thorax niger lineis duabus dorsalibus flavis. Abdomen rotundatum, cyaneum macula baseos flava. Alae magnæ nigrae macula magna baseos alba. Pone hunc fasciae duae ad marginem exteriorem bifidae et praeter ea puncta duo marginis interioris, altero inter fascias altero versus apicem. Corpus subtus et pedes flava.

95. M. antennis setariis pilosa testacea, abdomine fuso: *clauata.* ✓
segmentis basi pallidis stylo ani clauato.

Habitat Kiliae.

Parua. Caput testaceum ore pallidiore. Thorax pilosus testaceus. Abdomen fuscum segmentis basi pallidis. Ani stylus exsertus, apice capitatus, testaceus. Pedes testacei. Alae magnae, exalbidae, immaculatae.

96. M. antennis setariis cinerea, alis fuscis albo puncta- *parietina.* ✓
tis maculatisque, fronte testacea.

97. M. antennis setariis nigra, alis punctis lineolisque *discoidea.*
marginalibus albis, capite pedibusque testaceis.

Habitat in Hafniae floribus Dom. de Sehestedt.

Magna in hac familia. Caput testaceum oculis nigris.
Thorax et abdomen nigra, immaculata. Alae atque
punctis bascos lineolisque marginalibus abbreviatis
albis. Pedes testacei.

98. M. antennis setariis cinerea, abdomini nigro fascia- *umbra-* ✓
to, alis fuscis albo maculatis. *rum.*

99. M. antennis setariis, alis hyalinis apice nigris, capite *vibrans:* ✓
rubro.

100. M. antennis setariis, alis apice punto lateralni nigra, *cynipsea.* ✓
abdomine cylindrico.

101. M. antennis setariis atra, alis nigris apice albis. ~ *grossifica-* ✓
tionis.

102. M. antennis setariis flavescentia, abdomine atro, alis *combina-* ✓
punctis duobus nigris. *ta.*

103. M. antennis setariis fusco cinerea, capite rufo: pun- *erythro-*
cto verticali atro. *cephala.*

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Parua. Caput rufum punto magno in medio verticis
atro. Thorax obscure cinereus, immaculatus. Ab-
domen fusco griseum, nitidum. Alae albae punto
lineolaque transuersa nigris. Pedes nigri.

- stylata.* 104. M. antennis setariis cinerea, abdomen atro, alis albis: punctis duobus arcuque apicis fuscis.
- arcuata.* 105. M. antennis setariis testacea, alis maculis duabus arcuque apicis nigris.
- umbella-* 106. M. antennis setariis cinerea, ~~alio~~ pedibusque ferru-
tarum. ~~alio~~ gineis, alis maculatis.
- gramini-* 107. M. antennis setariis cinerea, alis fuscis: maculis al-
num. bis obsoletis.
- dorsalis.* 108. M. antennis setariis, alis punctatis, thorace cinereo, abdomen rufo: linea dorsali nigra.
- seminaria-* 109. M. antennis setariis, alis atris cinereo punctatis, ab-
tionis. domine basi subtus flauo.
- picta.* 110. M. antennis setariis fusca, alis atris: maculis vtrin-
que duabus oppositis, punctisque duobus interme-
diis albis.
- flava.* 111. M. antennis setariis flava, antennis apice puncto
nigro.
- 4 puncta-* 112. M. antennis setariis flava, abdomen punctis nigris
ta. quatuor.
- aestuans.* 113. M. antennis setariis, alis vnguiculatis aibis: puncto
centrali nigricante.
- lineata.* 114. M. antennis setariis subtus flava supra nigra, lineis
thoracis scutelloque flavis.
- Serratu-* 115. M. antennis setariis, alis albis, thorace virescente,
lae. abdome cinereo: lineis quatuor punctorum ni-
grorum.
- germina-* 116. M. antennis setariis, alis albis: margine maculisque
tionis. nigris.
- Vrticae.* 117. M. antennis setariis nigra, alis albis: puncto termi-
nali fasciisque tribus distinctis fuscis.
Corpus nigrum fronte ferruginea.

118. M. antennis setariis, alis albis: fasciis quatuor distin- *Dauci.* ✓
Etis nigris, scutello pedibusque testaceis.

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Magnitudo M. Vrticae at minor. Caput nobis deest.
Thorax cinereus scutello pallide testaceo. Abdomen
nigro stylo elongato. Alae albae fasciis quatuor,
quarum prima obsoletior, quarta apicis. Pedes te-
stacei.

119. M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis inae- *Cerasi.* ✓
qualibus; posticis externis connexis.

120. M. antennis setariis nigra, alis albis: fascia flexuosa *Cardui.* ✓
fusca.

121. M. antennis setariis atra, alis albis: fasciis tribus ab- *Syngene.* ✓
breuiatis maculaque apicis nigris. fiae.

122. M. antennis setariis flava, alis albis: fasciis quatuor *Tussilagi-* ✓
fuscis. nis.

123. M. antennis setariis, alis albis: fasciis quatuor con- *solfittialis* ✓
nexis nigris, scutello flavo.

124. M. antennis setariis atra, capite pedibusque flavis, *Lychnidis* ✓
alis nigris: limbo albo striato.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Media. Caput flavidum oculis nigris. Thorax et ab-
domen glabra, atra, immaculata. Pedes flavi. Alae
nigrae limbo omni lineolis abbreviatis albis.

125. M. antennis setariis ferruginea, scutello flavo, alis *Onopori-* ✓
variegatis. m. Horrelii. Lin. dinis.

126. M. antennis setariis, alis fuscis albo variis: marginie *Hieracii.*
crassiori maculis tribus nigris; pupilla alba.

127. M. antennis setariis flava, thoracis dorso, abdomi- *minuta.*
neque triges nigris.

Habitat in Kiliae floribus Dom. Daldorf.

Minuta. Corpus totum flavidum. Thorax supra niger.
Abdomen triges duabus punctisque duobus ultimi
segmenti nigris.

183. TABANVS. *Haustellum* vagina vniuersali
setisque quinque.

Palpi duo clauato acumi-
nati.

Antennae emarginato acu-
minatæ.

vofstratus. 1. T. oculis fuscescentibus, haustello longitudine cor-
poris.

haustel- 2. T. oculis fuscescentibus, abdomine atro: margine ful-
latus. uo pubescente, haustello corpore dimidio breviore.

Tabanus mauritanus oculis nigricantibus, abdominis
segmento secundo macula nigra, rostro corpore
aequante. Linn. Syst. Nat. 2. 999. 3.?

bouinus. 3. T. oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis
trigonis longitudinalibus.

lineatus. 4. T. oculis virescentibus, thorace lineato, abdomine
obscure coerulecente, antennis rufis.

autumnæ- 5. T. alis hyalinis, abdomine fusco ordine triplici albido
lis.

*fasciatu*s. 6. T. oculis viridibus, corpore brunneo, alis fascia
fusca.

calens. 7. T. oculis viridibus, abdominis dorso linea alba, ante-
nis rubris.

farandi- 8. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine luteis,
nus. pedibus rufis.

feruens. 9. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, capite thoraceque fuscis.

exae- 10. T. oculis viridibus, abdominis segmentis margine al-
stuans. bis, tibiis candidis.

11. T. oculis fasciatis, alis albis: costa fusca, antennis *ruficornis* rufis.

Tabanus americanus Forst. nou. sp. Cent. I. 100.

12. T. oculis fasciatis niger, abdominis primo segmento *pellucens*: coerulescente, tibiis candidis. *atratus*.

13. T. abdomine coerulescente; alis atris.

14. T. oculis fascia purpurea, corpore cinereo. *Bromius*. ✓

15. T. oculis antice fusco viridibus, abdomine *Cajen-* atro: segmento secundo tertioque fuluis, reliquis *nensis* margine albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parvus. Antennae fuluae. Os cinereum proboscide nigra. Oculi virescentes margine antico late fusco. Thorax obscurus, fuluo pubescens. Abdomen atrum segmentis 2. 3. fuluis immaculatis, reliquis margine albis. Alae albidae immaculatae. Pedes nigri femoribus quatuor posticis rufis.

16. T. oculis fusco cinereus, abdomine obscuro basi pal- *italicus*. lido pellucido.

17. T. oculis — — — corpore limido, antennis *mexica-* viridibus, alis virescentibus: punctis anastomosan- nus. tibus.

18. T. oculis glaucis cinereus, fronte punctis duobus *ruficulus*. atris. ✓

19. T. oculis antice viridibus: fasciis tribus fuluis, ab- *paganus*. domine vtrinque ferrugineo maculato.

20. T. oculis testaceis tomentoso cinereus, alis albis ni- *punctatus* gro. punctatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo T. rustici. Corpus totum cine- reo tomentosum. Femora viridia. Tibiae albae. Alae albae, punctis plurimis anostomosantibus fusco costaque subferruginea.

inanis.

21. T. oculis: fuscis tomentoso cinereus, abdomine pellucido apice fuso.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Praecedenti nimis affinis. Corpus totum cinereo villosum abdomine inani pellucido apice fuso. Alae albidiae immaculatae costa subferruginea. Femora apice virescentia.

occidentalis.

22. T. oculis fasciis binis fuscis, corpore fuso, abdomine lineis tribus fuluis.

tropicus.

23. T. oculis fasciis tribus purpurascensibus, abdominis lateribus ferrugineis.

borealis.

24. T. oculis fuscis tribus purpurascensibus, abdomine atro, segmentorum marginibus albidis.

antarcti-

- cus.* 25. T. oculis fasciis quaternis fuscis, tibiis albis.

pluviialis.

26. T. alis fasciis quaternis vndatis, alis fuso punctatis.

longicor-

- nis.* 27. T. oculis maculatis, alis dimidiato fuscis: macula alba, antennis longioribus.

friatus.

28. T. oculis — — — — cinereus, abdomine fuso: lineis tribus abbreviatis albis.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Medius. Os albidum antennis rufescentibus. Thorax cinereus, sublineatus. Abdomen fuscum lineis tribus albis lateribus a basi ad medium ductis, media a medio versus apicem. Pedes obscure cinerei tibiis posticis pallidis.

bidentatus.

29. T. oculis — — — — ferrugineis, abdomine utrinque maculis duabus flavis, scutello bidentato.

bispinosus

30. T. oculis — — — — fuscus, abdomine ferrugineo basi nigro, scutello bispinoso.

coecutiens

31. T. oculis viridibus nigro punctatis, alis maculatis.

moerens.

32. T. oculis nigris albido nigroque varius, alis albis: costa fasciaque nigris.

Habi-

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo omnino T. coccidentis. Antennae nigrae basi albidae. Caput albidum lineolis duabus sub antennis punctisque duobus verticalibus glabris atris. Thorax albus, nigro lineatus. Abdomen griseum primo segmento flavescente arcu nigro, 2. 3. maculis duabus baseos nigris, reliquis immaculatis. Alae albae costa fasciaque lata in medio nigra et in hac punctum album. Pedes nigri tibiis testaceis.

33. T. oculis corporeque nigris, alis fuscis; macula alba. lugubris. ✓

184. RHINGIA. *Haustellum* vagina vniualui os obtegente setisque quatuor.

Palpi filiformes.

Antennae breues, setariae.

1. R. thorace sublineato, rostro abdomine pedibusque rostrata. testaceis. ✓

2. R. thorace lineato, abdomine nigro; maculis latera- lineata. libus flavis. ✓

Habitat Hafniae Dom. Lund.

Statura omnino Syrphi at labium elongatum, corneum proboscidin inuoluens, flavum, apice emarginatum, nigrum. Antennae breues clavatae, nigrae clava ferruginea seta nigra. Abdomen nigrum. Thorax niger lineis quatuor albis scutelloque testaceo. Abdomen nigrum utrinque maculis tribus ultimoque segmento flanis. Alae albidae. Pedes flavi femori- bus cingulo albo.

185. ASILVS. *Haustellum rectum biuale basi gibbum.*

Antennae filiformes.

grossus. 1. A. hirsutus niger, thorace abdominisque basi cinereis.

maurus. 2. A. subferrugineus, pectoris lateribus thoracisque dorso lineis tribus nigris.

Alginis. 3. A. corpore toto ferrugineo.

barbarus. 4. A. fronte thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis apice margineque tenuiori nigris.

Femora nigra.

erabroni- 5. A. abdomine tomentoso antice segmentis tribus nigris, *formes.* postice fiauo inflexo.

ephip- 6. A. hirsutus ater, thorace basi albo. *pium.*

gibbosus. 7. A. hirsutus niger, abdomine postice albo.

barbatus. 8. A. hirsutus niger, barba abdomine postice tibiisque posticis albis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. gibbosus. Caput atrum pilis densis longioribus circa os albis. Thorax ater, immaculatus. Scutellum hirsutissimum, atrum. Abdomen breue, hirtum primis duobus segmentis atris, reliquis albis. Pedes pilosi atri tibiis posticis albis.

fasciatus. 9. A. hirtus niger, abdomine basi fasciis duabus niveis.

aestuans. 10. A. cinereus, ultimis abdominis tribus segmentis albis.

ater. 11. A. hirsutus ater, barba albida.

diadema. 12. A. ater, alis nigris, fronte alba.

calidus. 13. A. hirtus gileus, thorace fusco, abdomine nigro segmentorum marginibus albis.

Habitat Cajennæ Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput hirsutie densa gilua. Antennae nigrae. Thorax supra fuscus, immaculatus, subtus hirsutie gilua. Abdomen breve atrum segmentorum marginibus albis. Alae albidae. Femora obscura siue fusca. Tibiae hirtae testaceae. Tarsi nigri.

14. A. hirsutus niger, thorace postice cinereo, abdomine fuscus.
ne supra hirsuto fuluo. ✓
15. A. hirsutus ater, abdomine violaceo. violaceus.
16. A. niger, abdomine supra fuluo. fulius. ✓
17. A. hirtus, thorace cinereo pubescente, abdomine punctatus atro: punctis tribus marginalibus albis maculisque duabus dorsalibus rufis.
18. A. halteribus abdominalis incisuris fuscis, femoribus marginatis nigris. ✓
19. A. corpore cinereo immaculato. plumbecus.
20. A. thorace cinereo nigro lineato, abdomine pedibus. brunneus.
que brunneis nigro maculatis.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Statura et magnitudo A. forcipati. Caput albidum rostro atro antennisque brunneis. Thorax pilosus, cinereus lineis tribus nigris lateralibus abbreviatis. Abdomen cylindricum, obtusum, brunneum segmentis macula baseos obscuriore. Alae albae. Pedes brunnei apice nigri.
21. A. hirtus cinereus ano pedibusque nigris. forcipatus. ✓
22. A. hirtus niger, tibiis rufis, alis fusca basi albidis. germanicus. ✓
23. A. fuscus, abdomine cinereo: fascia apiceque nigris, rufipes.
tibiis rufis.
24. A. cinereus, abdominalis segmentis macula quadrata macula-
atra, pedibus piceis: plautis nigris. tus.

- marginalis.* 25. A. cinereo fuscus, pedibus rufis apice nigris, alis marginato atro.
- annulatus.* 26. A. cinereus, abdomine apice nigro, femoribus testaceis: annulo nigro.
- stylatus.* 27. A. hirtus cinereus, thorace abdomineque nigro maculatis, tibiis rufis, ano stylato.
- nigripes.* 28. A. hirtus niger, thorace lineis quatuor, abdomine cingulis tribus albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino A. stylati at paullo minor et aliis. Caput pilosum, albidum rostro antennisque setariis nigris. Thorax hirtus niger lineis quatuor albis. Abdomen apice acutissimum, atrum cingulis tribus baseos albis. Alae hyalinae. Pedes atri.

- cingulatus.* 29. A. cinereus, tibiis rufis nigro annulatis.
- ✓ *tipuloides* 30. A. cinereus nudus, pedibus ferrugineis: plantis nigris.
- teutonus.* 31. A. niger, thorace fugaci auro maculato, abdomine vtrinque maculis quinque albis.
Pedes rufi apicibus nigris.

- cajennen-* 32. A. ater thoracis linea dorsali alba nigro bilineata, capite scutelloque albis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. teutoni. Caput hirtum, album rostro, antennis verticeque albis. Thorax niger, cinereo nitens linea lata dorsali alba et in hac lineae duae nigrae, sub alis albo maculatus. Scutellum album, immaculatum. Abdomen cylindricum, atrum, segmento primo secundoque margine albo. Alae obscurae. Pedes atri, immaculati. Halteres clava alba.

- lineatus.* 33. A. testaceus, thorace abdomineque nigro lineatis, alis fuscis: macula media testacea.

CLAS. VIII. ANTLIATA. Conops. 361

34. A. cinereus, abdomine atro: segmentorum marginibus albis. *cinctus.* ✓
35. A. fuscus, alis abdomineque cyaneis. *cyaneus.*
36. A. ater nudus, pedibus halteribusque ferrugineis. *oclandicus.* ✓
37. A. thorace nigro flavo maculato, abdomine atro: fasciis rufis. *conopoides.*
38. A. ater, thoracis dorso cinereo atro lineato, abdome linearis. *linearis.*

Habitat in Daniae Insulis Dr. Pflug.

Parvus. Caput atrum labio tomento argenteo nitidulo tecto. Thorax ater, nitidus dorso cinereo lineis quatuor atris, lateralibus abbreviatis. Abdomen elongatum lineare, atrum, nitidum segmentorum marginibus flavis. Alae hyalinae, immaculatae halteribus flavis. Pedes flavi.

39. A. ater glaber, femoribus posticis longitudine abdominali caliciformis. ✓

186. CONOPS. *Haustellum* vagina vniuersali abbreuiata setaque vnicata.
 Proboscis porrecta, ultra basin geniculata.
 Antennae clavatae acuminatae.

1. C. nigricans, occipite vesiculari, abdomine flavescente basi nigra. *vesicularis.*
2. C. atra, abdominis incisuris thoracisque punctis duobus anticis flavis. *aculeata.* ✓
- Schaeff. Icon. tab. 228. fig. 8.
3. C. atra, abdomine basi ferrugineo segmentorumque rufipes. marginibus albis, pedibus ferrugineis.

- ✓ *macrocephala*. 4. C. nigra, abdomine segmentis quatuor margine flauis, antennis pedibusque rufis.
- ✓ *flavipes*. 5. C. nigra glabra, abdomine cylindrico: segmentis tribus margine flauis.

187. STOMOXYS. *Haustellum* vagina vniuersal-
ui conuoluta basi ge-
niculata setisque dua-
bus vaginantibus;

Antennae setariae.

- morio*. 1. S. atra, thorace antice ferrugineo piloso, alis atris albo maculatis.
- parasita*. 2. S. antennis plumatis grisea, abdomine supra fusco: maculis baseos testaceo diaphanis.
- ✓ *fiberita*. 3. S. antennis plumatis grisea pilosa, abdominis lateribus pallido diaphanis.
- ✓ *calcitrans* 4. S. antennis subplumatis grisea, pedibus atris.
- ✓ *irritans*. 5. S. cinerea subpilosa, abdomine nigro maculato.
- pungens*. 6. S. cinereus, femoribus nigris.

Habitat in Europa pecorum dorso inhians Dr. Heisse.

Statura omnino C. irritantis at triplex minor. Corpus totum parum pilosum; obscure cinereum, alis albi- dis, immaculatis.

Variat interdum abdomine obscuriore.

188. MYOPA. *Haustellum basi medioque geniculatum: vagina biualui; valuulis aequalibus.*

Antennae clauato acuminatae.

1. M. ferruginea, abdome cylindrico incurvo, fronte ferruginea. lutescente. Schaeff. Icon. tab. 261. fig. 3. ✓
2. M. ferruginea, thoracis dorso nigro. testacea. ✓
3. M. abdome cylindrico incurvo, corpore atro. atra. ✓
4. M. testacea, abdome humoso albo fasciato. cincta.
5. M. ferruginea, abdome humoso griseo, facie vesiculae albae, alis nebulosis. buccata. ✓

189. CVLEX. *Vagina exserta, vniuersaliter flexilis, setis quinque.*

Palpi duo triarticulati.

Antennae filiformes.

1. C. cinereus, abdome annulis fuscis octo. pipiens.
2. C. fuscus, abdome pedibusque albo annulatis, alis annulatus maculatis.

Habitat Hafniæ in fenestræ captus die XVIII. Octobr.

Statura et magnitudo C. pipientis. Rostrum porrectum longitudine dimidii corporis. Caput et thorax fuscæ, immaculata. Abdomen fuscum segmentorum marginibus albis. Primum segmentum linea dorsali alba. Pedes fusti albo annulati. Alæ hyalinæ maculis tribus aut quatuor fuscis.

3. C. fuscus, thorace sublineato. bifurcatus.
4. C. flavius, alis hyalinis: costa flavescente. lutescens.
5. C.

haemor- 5. C. fuscus, abdominis margine apice rufo ciliato.
rhoidalis. Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Gigas in hoc genere. Antennae densissime verticillato pilosae, fuscae, primo articulo nudo, coeruleo nitido. Rostrum inter antennas porrectum vagina bivalui valuulis obtusis. Seta acuta. Caput fuscum vertice coeruleo, nitidulo. Thorax eleuatus, fuscus margine antico punctoque ante alas, coeruleis, nitidulis. Abdomen fuscum apice planum, margine valde rufo ciliatum. Pedes coerulei, nitidi, femoribus subtus testaceis. Alae albae costa fusca.

pulicaris. 6. C. fuscus, alis albis: maculis tribus obscuris.

reptans. 7. C. niger, alis hyalinis, pedibus nigris: annulo albo.

morio. 8. C. ater, alis albis, femoribus posticis clauatis serratis.

equinus. 9. C. abdome fuscō, fronte alba.

190. EMPIS. *Haustellum* et proboscis inflexa.

Haustellum vagina vniualui setisque tribus.

Palpi breues, filiformes.

Antennae setariae.

borealis. 1. E. nigra, alis subrotundis fuscō ferrugineis.

margina- 2. E. nigra, alis albis: marginalibus nigris.
ta. Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Corpus paruum, nigrum. Alae magnae albae margine anteriori et postico late nigro.

pennipes. 3. E. nigra, pedibus posticis elongatis pennatis.

forcipata. 4. E. cinerea, alis oblongis: macula costali nigra, cauda appendiculata.

aura. 5. E. nigra tarsis anticis incrassato ouatis.

6. E. liuida, thorace lineato, alis basi pedibusque ferrugineis. ✓
7. E. nigricans, alis costa fusca, pedibus atris: posticis ciliata. quatuor pennatis.

Habitat in Europa.

Statura et magnitudo omnino E. liuidae. Caput paruum nigrum rostro testaceo. Thorax pilosus, nigricans, immaculatus. Abdomen conicum, nigrum, cinereo subpubescens. Alae obscurae costa fuscescente. Pedes atri femoribus tibiisque quatuor posticis vtrinque ciliatis pennatis.

8. E. cinerea, thorace immaculato, pedibus pallidis, alis cinerea. ✓ apice fuscescentibus.
9. E. cinerea, rostro, abdominis lateribus pedibusque testaceis, alis maculatis.

10. E. testacea, linea dorsali nigra, alis reticulatis. stercorea. ✓

11. E. atra, pedibus testaceis, alis albis. minuta.

Habitat gregatim in Daniae Agaricis Dom. Lund.

Minuta. Corpus totum atrum, immaculatum pedibus solis testaceis.

191. BOMBYLIVS. *Haustellum* longissimum,
rectum, setaceum,
biualue.

Antennae subulatae, basi connatae.

1. B. alis dimidiato nigris sanguinis sinuatis. maior.
2. B. alis dimidiato nigris aequalibus. aequalis.
3. B. alis fusco punctatis, corpore flavescente postice mediis. albo.

4. B.

capensis. 4. B. alis nigro maculatis, corpore cinerascente postice nigro.

minor. 5. B. alis immaculatis, corpore flauescente hirto, pedibus testaceis.

minimus. 6. B. alis basi fusciscentibus, corpore flauescente hirto, rostro pedibusque nigris.

Habitat in Germania.

Corpus B. minor duplo minus totum pilis densis flauescientibus hirtum. Rostrum, antennae, pedes nigrantes. Alae albidae apice parum fusciscentes.

cupreus. 7. B. nudiusculus niger, thoracis lobo antico fuluo, abdome cupreo: linea dorsali punctorum fuluorum.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Medius. Antennae elongatae basi connatae, nigrae. Rostrum antennis breuius, porrectum, setaceum. Thorax niger lateribus, cupro nitidulis loboque antico tomentoso fuluo. Abdomen cupreum certo situ viridi aeneo nitidulo punctorumque fuluorum linea dorsali. Pedes nigri femoribus subtus pallidis. Alae obscurae.

ater. 8. B. alis basi seminigris ater, abdomine albo maculato.

Schaeff. Icon. tab. 79. fig. 6..

maculatus. 9. B. alis basi nigris ater, thorace antice abdomineque postice albis.

fuscus. 10. B. ater immaculatus, alis fuscis.

griseus. 11. B. alis albis basi fuscis hirtus, thorace nigro albo lineato, abdomine griseo.

Habitat in Hispaniae floribus compositis Dom. Vahl.

Statura omnino B. virescens. Corpus pilis griseis at minus densis hirtum. Thorax niger lineis duabus dorsalibus albis. Alae albae basi ad marginem crassiorem fuscae punctisque duobus in medio nigris.

virescens. 12. B. aliis albis immaculatis, corpore hirto virescente, rostro abbreviato.

Habi-

Habitat in Hispaniae floribus Dom. Vahl.

Rostrum breve vix longitudine capitis. Corpus totum pilis densis virescentibus tectum.

13. B. alis dimidiato punctisque nigris, thorace fusco basi pygmaeus.

14. B. alis albis hirtus cinerascens, capite pedibus atris, *vermiculata*.

Habitat in Barbariae floribus compositis Dom. Vahl.

Reliquis duplo minor pilis erectis sparsis tectus. Rostrum porrectum, atrum. Thorax cinerascens immaculatus. Alae albae, immaculatae. Abdomen subrotundum, cinerascens maris macula magna dorsali ferruginea, feminae immaculatum.

192. HIPPOBOSCA. *Haustellum* breve, cylindricum, rectum, bivalve valuulis aequalibus.

Antennae filiformes.

1. H. alis obtusis, thorace albo variegato, pedibus tetradactylis. *equina.*

2. H. alis obtusis, thorace unicolor. *auicularia*

3. H. alis subulatis, pedibus hexadactylis. *Htrundi-*

4. H. alis nullis. *ouina.*

193. PYCNOGONVM. *Haustellum* tubulosum canonicum absque setis.

Palpi duo ad basin haustelli.

Balanus. 1. P. palpis duobus, corpore ouato.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 18. fig. 7.

grossipes. 2. P. palpis quaternis, corpore filiformi, pedibus longissimis.

194. PEDICVLVS. *Haustellum* retractile, recuruum.

Antennae — — — —

humanus. 1. P. abdomine lobato cinereo.

pubis. 2. P. abdomine postice emarginato, pedibus chiliformibus.

ricinoidis. 3. P. abdomine orbiculato: linea alba, scutello trilobo, rostro albo.

Cameli. 4. P. capite porrecto acuminato ferrugineus, abdomine ouato.

Cerui. 5. P. Cérui.

Ouis. 6. P. Ouis Arietis. Linn. Syst. Nat. 2. 1017. 8. Fn. Su. 1945.
Red. Exper. tab. 22. fig. 1.

Bufali. 7. P. flauescens, striis fuscis obscuris, abdomine tuberculatis decem conicis marginalibus.

Bouis. 8. P. abdomine lineis transuersis octo ferrugineis.

Vituli. 9. P. abdomine acuminato plumbeo.

Equi. 10. P. Equi Caballi.

II. P.

- 11. P. capite porrecto obtuso, abdomine ouato fusco *ajini*.
striato.
 - 12. P. oblongus, abdomine fuscus: lineis duabus flane- *Vulturis*.
scentibus.
 - 13. P. capite sagittato postice vtrinque mucronato. *Tinnunculi.*
 - 14. P. abdomine marginato: segmentis vtrinque punctis *Buteonis*.
duobus impressis.
 - 15. P. abdomine ouato albo: margine pedibusque rubris. *Strigis.*
 - 16. P. abdomine ouato: margine striato. *Corvi.*
 - 17. P. abdomine ouato pallido: maculis lateralibus ni- *Cornicis*.
gris, pupilla alba.
 - 18. P. thorace angustato, abdomine ouato pallido dia- *Infausti*.
phano.
 - 19. P. capite obtuso fuscus: punctis quatuor nigris. *Picae.*
 - 20. P. albus, abdomine linea dorsali fuscus. *Orioli.*
 - 21. P. abdomine oblongo albido fuscus fasciato. *Cuculli.*
 - 22. P. capite emarginato, abdomine ouato: margine ni- *Cygni*.
gro striato.
 - 23. P. filiformis pallidus: margine nigro punctato. *Anseris.*
 - 24. P. albidus, capite flauescente, corpore elongato. *Mergi.*
 - 25. P. elongatus filiformis fuscus, pedibus pallidis. *Procellaria-*
vire.
 - 26. P. ouatus pallidus, thorace lineis duabus fuscis. *Vagellii.*
- Habitat in Procellaria glaciali Dom. Mohr.
Magnus, ouatus totus pallidus, thorace solo lineis duas
bus postice coeuntibus nigris.
- 27. P. capite obtuso albus, abdominis lateribus nigris. *Dione-*
deae.
 - 28. P. capite trigono, abdomine ouato pallido, dorso
longitudinaliter nigricante. *Sternac.*

370 CLAS. VIII. ANTLIATA. Pediculus.

- Plataleae* 29. P. Plataleae Leucorodiae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 22.
 Red. Exp. tab. 4.
 Habitat in Leucorodiis.
- Ardeae.* 30. P. Ardeae cinereae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 23.
 Red. Exp. tab. 6.
 Habitat in Ardeis.
- Gruis.* 31. P. abdomine subclauato pallido : spiraculis niveis.
- Ciconiae.* 32. P. elongatis filiformis, abdomine albo : lateribus nigro punctatis.
- Charadrii* 33. P. Charadrii pluuialis. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 26.
 Red. Exp. tab. 9.
 Habitat in Charadriis.
- Fulicae.* 34. P. Fulicae atrae. Linn. Syst. Nat. 2. 1019. 27.
 Red. Exp. tab. 4.
 Habitat in Fulica atra.
- Recurvirostrae.* 35. P. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato.
- Haematoptopi.* 36. P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine ouato : incisuris pallidis.
- Pauonis.* 37. P. capite globose maximo, corpore pallido fuscoque striato.
- Meleagridis.* 38. P. capite trigono obtuso , abdomine ouato griseo.
- Gallinae.* 39. P. thorace capiteque vtrinque mucronatis.
- Phascani.* 40. P. capite ouato magno , abdomine globose obtuso.
- Caponis.* 41. P. abdominalis margine nigro.
- Tetraonis* 42. R. Tetraonis Tetricis. Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 34. Fn.
 Sv. 1961. Red. Exp. tab. 14.
 Habitat in Tetraonibus.

43. P. *Tetraonis Lagopi.* Linn. Syst. Nat. 2. 1020. 35. Fin. *Lagopi.*
Su. 1962.

Habitat in *Tetraone Lagopo.*

44. P. *corpore filiformi ferrugineo postice clavato.* *Columbae.*
45. P. *pallide fuscus, abdomine albescente: maculis late-* *Emberi-*
ralibus fuscis, capite triangulo. *zæe.*
46. P. *corpore ouato, cauda quadriseta.* *Pari.*
47. P. *capite cordato rufo, abdomine albo basi attenuato.* *Motacil-*
lae.
48. P. *pallescens, abdomine albo nigro maculato.* *Hirundi-*
nis.
49. P. *sanguineus, pedibus albis.* *Gryllo-*
talpæ.
50. P. *filiformis, ferrugineus.* *Apis.*

195. ACARVS. *Haustellum vagina biualui, cy-*
lindrica.

Palpi duo longitudine hau-
stelli.

Antennæ filiformes.

1. A. *orbicularis depresso liuidus: macula baseos ouata* *Elephan-*
nigra. *tinus.*
2. A. *globoso ouatus: macula baseos rotunda, antennis* *Riccinus.*
clauatis.
3. A. *obouatus planus: macula baseos obouata.* *Redunius.*
4. A. *ouatus fuscus, antennis pedibusque pallidis.* *pallipes.*
5. A. *ouatus niger, pedibus ferrugineis: peniculis albis.* *Hispanus.*

Habitat in *Barbaria Dom. Vahl.*

Maior A. *sanguisugo.* Antennæ breues extrorsum cras-
siores. Corpus planum, ouatum, nigrum pedibus
omnibus ferrugineis geniculis albis.

sanguis. 6. A. ouatus planus niger, abdomine ferrugineo, anten-
fugis.

aegyptius 7. A. obouatus niger, margine albo.

vndatus. 8. A. orbiculatus ater, lateribus vndato albis: punc-
tuo nigro.

lipscensis. 9. A. ouatus fuscus: margine incrassato.

Iguanae. 10. A. ouatus planus aureo maculatus, abdominis margi-
ne irato crenato.

cojennensis. 11. A. ouatus planus griseo alboque varius: margine po-
stico elevato striato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. aegyptii. Rostrum porrectum,
planum cum antennis griseum, immaculatum. Cor-
pus rotundatum, planum, griseum linea ante mar-
ginem. duabus dorsalibus abbreviatis atomisque plu-
rimis indistinctis albis. Margo posticus lineis ele-
vatus decem obscurioribus striatus. Pedes octo grisei
immaculati.

lineatus. 12. A. ouatus ferrugineus: lineis duabus vndatis albis.

aureolatus. 13. A. obouatus fuscus: lineis duabus maculaque posti-
ca palmata viridi aureis.

holstatis. 14. A. ouatus planus ferrugineus, thorace fusco.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum
ferrugineum thorace solo fusco. Pedes obscuriores.

indus. 15. A. oualis ferrugineus: macula baseos ouata atra.

america- 16. A. obouatus rubicundus, scutello geniculisque pe-
nus. dum albis.

vibrans. 17. A. subrotundus testaceus immaculatus, pedibus anticis longioribus.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Minutus. Corpus rotundatum, planum, testaceum,
immaculatum. Pedes concolores anticis longioribus.

18. A. pedibus secundi paris longissimis. *craffipes.*
19. A. thorace angulato cruciato, pedibus vnguiculatis corpore longioribus. *Vespertilionis.*
20. A. femoribus tertii paris crassissimis. *passerinus*
21. A. flanus pedibus primi paris longissimis motatoriis. *motatorius.*
22. A. ater, lateribus angulato acutis. *coleoptratus.*
23. A. ruber, pedibus primis longissimis cursoriis, ab domine postice bicorni. *aphidioides.*
24. A. rubicundo hyalinus, abdomine utrinque macula fusca. *telarius.*
25. A. albidus, femoribus capiteque ferrugineis, abdome setoso. *Siro.*
26. A. albus, pedibus rufescens: posticis quatuor seta longissima. *Scabiei.*
27. A. abdome ouato obtuso postice setis quatuor longitudine corporis declinatis. *lattis.*
28. A. pedibus setis duabus, abdominis ouati postico setis quatuor longitudine corporis horizontalibus. *dysenteriae.*
29. A. niger, senorum geniculis subglobosis. *geniculatus.*
30. A. abdome distento rubro: lateribus obscurioribus. *baccareum*
31. A. subrotundus albidus, abdome rufi. *Zosterae.*
32. A. abdome rufi, pedibus posticis longissimis filiformibus. *Muscarum.*
33. A. sanguineus scabriusculus, pedibus anterioribus longitudine corporis. Linn Syst. Nat. 2. 1026. 25.
Habitat in Americae Batatas.
34. A. abdome rubro: utrinque punctis binis coccineis. *Gymnophororum*
Culicoptrato-
35. A. ouatus rufus, ano albicante. *rum.*

- Phalan-* 36. A. ouatus ruber, rostro porrecto, pedibus longioribus.
gi.
- Phaeton-* 37. A. ouatus postice acuminatus, pedibus apice fasciculatis.
rupestris. 38. A. fuscus, linea dorsali bicolore.
longicor- 39. A. ruber, antennis bifidis rostro longioribus.
nis.
- littoralis.* 40. A. ouatus ruber, rostro porrecto subulato.
Fucorum. 41. A. palliatus, lineis duabus flexuosis nigris, pedibus posticis brevissimis incuruis.
- Fungo-* 42. A. fusco rufescens, abdomine subgloboso glabro immaculato.
russ.
- Tremellae* 43. A. subglobosus atro coeruleescens.
salicinus. 44. A. ruber, linea dorsali dupli fusca antice bifurca.
croceus. 45. A. fuluus, thoracis lateribus puncto rufo.
-

A P P E N D I X.



77 — 78. SCARABAEVS sentellatus muticus rufus, capite thoraceque linea carinata elevata.

Habitat in India orientali Dom. Vahl.

Magnitudo Sc. Cephi. Capitis clypeus angulatus, rufus margine lineaque transuersa abbreviata elevata nigris. Thorax rufus antice lineola transuersa elevata tuberculisque duobus. Pectus hirtum. Elytra striata, rufa.

125 — 26. SCARABAEVS exscutellatus, thorae subintegrum aeneo, occipite cornibus duobus areuatis, elytris testaceis.

Habitat — — — — Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino Sc. Tauri. Clypeus rotundatus, niger margine reflexo, integro. In medio striga transuersa, elevata et pone hanc cornua duo elongata, arenata. Thorax denticulis duobus anticis parnis vix distinctis, obscure aeneus margine pallescente postice rotundatus. Elytra striata testacea sutura aenea. Corpus testaceum nigro maculatum. Femora testacea puncto nigro.

3 — 4. TRICHIUS testaceus, capite thoraceque aeneo guttato, nitidulus, abdominis ultimo segmento prominulo bicuspidato.

Habitat in China Dr. Pflug.

Statura Melolonthae, at huins generis. Caput viridi aeneum ore testaceo. Thorax mox testaceus, viridi nitidus, mox omnino aeneus margine testaceo. Scutellum triangulum, viridi aeneum. Elytra striata, testacea. Corpus testaceum, cimereo villosum, ab domi-

dominis ultimo segmento prominulo punctis duobus albis.

pallipes. 18. 19. DERMESTES oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.

Minutus totus ater, nitidus. Thorax laevis. Elytra striata. Antennae et pedes testacei.

lunata. 18. 19. DERMETES oblongus niger, elytris lunula dorsali cinerea.

Habitat in Suecia sub arborum corticibus Dom. de Paykull.

Statura parua praecedentium. Totus niger, obscurus. Coleoptera lunulis duabus connatis communibus in medio dorsi cinereis.

capense. 3 — 4. ANOBIVM ferrugineum, elytris striatis pallidioribus.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.

Statura omnino A. pertinacis at duplo minus et aliud. Corpus totum obscure ferrugineum elytris solis paulo pallidioribus, striatis.

luteum. 3 — 4. SPHAERIDIVM luteum, elytris pubescentibus laeuisibus.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura omnino praecedentium. Corpus totum luteum elytris pubescentibus haud striatis.

haemor- 5 — 6. IPS rufa, elytris nigris apice rufis.

rhoidalis. Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura et summa affinitas I. rufipes, at corpus totum rufum exceptis elytris solis nigris apice rufis.

dentata. 12 — 13. HISPA antennis filiformibus nigra, thoracis margine, elytrorum ferratorum macula baseos fascia que media flavis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino praecedentis. Caput cum antennis nigrum. Thorax niger: lateribus late flavis. Elytra ferrata denticulis duobus porrectis longioribus, sulcata, nigra macula baseos suturam haud attingente fasciaque media flavis. Pectus et abdominis basis flava.

12. 13. HISPA antennis fusiformibus flava, capite thoracis linea dorsali elytrorumque margine sinuato nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax flavis linea dorsali nigra. Elytra sulcata, flava margine sinuato nigro, et in hoc margine pone medium punctum flavum, apice truncata, dentata dente exteriori maiori, validiori angulata. Corpus subtus ferrugineum.

- 5 — 6. OPATHRVM nigrum, elytris striatis: striis punctatis. clathratum.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium at distinctum elytrorum striis punctatis impressis.

51. 2. COCCINELLA coleoptris fuluis: punctis duodecim lunulisque vtrinque duabus connatis albis. 12 guttae.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Corpus medium, rufum. Thorax rufus vtrinque macula magna alba. Elytra rufa puncto ad scutellum lunulisque duabus connatis baseos et versus apicem puncta quinque 3. 2. alba.

- 58 — 9. COCCINELLA. villosa nigra, elytrorum marginibus flavis. villosa.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Corpus magnum pilis brevibus densis villosum. Caput, et thorax obscura. Elytra punctato striata, nigra margine et sutura flavis. Pedes nigri.

- 21 — 2. CASSIDA brunnea albo marginata, elytris nigro maculatis basi vnituberculatis. bituberculata.

Habi-

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Afinis C. tuberculatae at duplo minor. Antennae pallidae apice nigrae. Thorax flavescentia margine pallido. Elytra brunnea punctis duobus nigris, anteriori maiori transuerso. Margo pallidus. Corpus nigrum margine pallido. Pedes pallidi.

taurus. 29 — 30. CASSIDA atra, clytris angulo antico spina truncata.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura omnino C. bicornis at paullo minor. Caput, thorax, corpus atra aeneo paullo nitida. Elytra atra punctis impressis reticulata angulo antico spina valida truncata.

retiformis. 38. 9. CASSIDA nigra, thorace bimaculato, clytris flavis nigro reticulatis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura praecedentium. Corpus, antennae, pedes nigra. Clypeus niger maculis duabus magnis flavescentibus. Elytra flavescentia margine omni strigisque interruptis fore reticulatis nigris.

pallidata. 43. 4. CASSIDA nigra thorace villoso virescente, clytris viridibus: margine lineaque media ferrugineis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. —

Media. Antennae longitudine corporis ut totum corpus nigrae. Thorax subuillosus, minime nitidus, virescente, inmaculatus. Elytra viridia margine exteriori futura dimidiata lineaque disci sanguineis. Pedes atri.

suprea. 45. 6. CASSIDA suprā cuprea, thoracis margine clytris que maculis duabus marginalibus fusis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Media. Corpus cum antennis pedibusque atrum. Thorax obscure cupreus margine rufescente. Elytra punctata viridi cuprea inculps duabus marginalibus rufis apice magis laevia.

28 — 9. CRIOCERIS cyanea, elytris flauis: maculis duas *fucatq.*
bus cyaneis.

Habitat in Insula St. Bartholomaei Americes Dom. de Paykull.

Statura praecedentium. Caput fuscum antennis flauis.
Thorax rotundatus, cyaneus, immaculatus. Elytra
glabra, nitida flava maculis duabus magnis cyaneis.
Corpus cyaneum abdomine flavo. Pedes obscuri fe-
moribus cyaneis.

39. 90. CVRCVLIO longirostris femoribus dentatis fu- *frigidus*,
scus, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis.

Habitat in Amboina Dom. de Paykull.

Medius statura praecedentium. Caput fuscum puncto
ferrugineo ad basin rostri lineaque dorsali albida.
Thorax rotundatus niger linea dorsali punctoque
vno altero ferrugineis. Elytra punctato striata,
subtuberculata, nigra, ferrugineo varia, qui color fa-
scias tres constituit. Pedes pallescentes femoribus
dentatis.

161. 2. C. breui rostris nigro aeneus, rostro plano pedi- *fulviro-*
busque flavescentibus. *stris.*

Habitat in Scania Dom. de Paykull:

Parvus. Rostrum planum, depresso, flavescentis. An-
tennae extrosum crassiores, nigræ, basi flavescen-
tes. Thorax, elytra, corpus aeneo nitidula. Pedes
flavi.

99. 100. ICHNEVMON ater, abdomine compresso: seg- *compre-*
mentorum marginibus flauis, antennis pedibusque *sus.*
luteis.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Affinis I. variegator. Antennæ flavae, articulo primo
ultimo nigris. Caput et thorax atra, immacula-
ta. Abdomen compressum, breve, atrum, segmen-
torum marginibus flavescentibus. Alae albidae. Pe-
des lutei semoribus omnibus basi, posticis totis nigris.

47. 8. PHALAEVA pectinicornis, alis concoloribus stria- *coruaria.*
tis atris apice albis.

Habi-

Habitat in America meridionali Dom. de Paykull.

Media. Statura praecedentium. Antennae nigrae valde pectinatae. Corpus nigrum pectore gulaque ferrugineo hirtis. Alae neruis striatae nigrae omnibus apice albis.

populana. 30 — 1. PYRALIS alis anticis fuscis apice auro argentoque strigosis: macula dorsali alba; puncto fusco.

Habitat in Sueciae Populo Dom. de Paykull.

Affinis *P. Jaquiniana* videtur. Corpus fuscum. Alae anticae basi cinereo fuscae, immaculatae. In medio dorsi macula magna communis triangularis alba puncto medio fusco, apice auro argentoque strigosae punctis costalibus albis.

ferrugatus. 39 — 40. CÍMEX thorace acute spinoso supra griseus capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Medius. Caput nigrum antennis pallidis primo ultimo que articulo nigro. Thorax griseus margine tenuissime flavo spinisque acutis, elongatis nigris. Scutellum obscurum apice flavescentes. Elytra grisea sine pallida punctis numerosis fuscis. Alae albidae arcu apicis fusco. Abdomen ferrugineum. Pedes fusi.







